



& If Muka.



# CATALOGUE/

SYSTÉMATIQUE ET RAISONNÉ
DES CURIOSITÉS

D.E

### LA NATURE ET DE L'ART,

QUI COMPOSENT LE CABINET

DEM. DAVILA,

AVEC Figures en taille douce, de plusieurs motceaux qui n'avoient point encore été gravés.

TOME PREMIER.



A PARIS,

Chez Briasson, rue Saint-Jacques, à la Science:

M. DCC. LXVII.

Avec Approbation & Permission.



### LE PRÉSENT CATALOGUE

se distribue aussi

Amsterdam, chez Changuion.
Rotterdam, chez Beman.
Londres, chez Paul Vaillant..
Basle, chez Schweighauser.

Charlottechurand.

QH 1225 + RSI



# AVERTISSEMENT

## DE M. DAVILA.

JE me crois obligé de prévenir ici le Public, & sur-tout mes Amis & mes Correspondans, des motifs qui m'engagent à vendre un Cabinet que je n'ai cessé d'augmenter jusqu'à ce jour. Les uns pourroient croire que je me suis dégoûté très-légèrement d'un objet qui paroissoit faire mes délices depuis plus de vingt ans : les autres, au nombre desquels sont d'illustres Naturalistes qui n'ont pas peu contribué à l'embeltissement de cette Collection, pourroient regretter de m'avoir cédé quelques morceaux rares & curieux, dont ils ne m'ont peut-être fait l'abandon que par l'espoir de les voir paroître dans un Ouvrage que je me proposois de faire alors sur certaines branches de l'Histoire Naturelle, & pour lequel j'avois déja fait dessiner plus de deux cent morceaux; mais

cet Ouvrage n'a pû avoir lieu, par les mêmes raisons qui m'obligent à me défaire actuellement de mon Cabinet.

Entre plusieurs motifs que je pourrois donner, j'espere que ces deux suffiront: l'un est l'altération de ma santé qui, depuis quelques années, est fort chancelante, & qui exige de la tranquillité: l'autre est la nécessité où je me trouve de repasser au Pérou pour des affaires de famille qui m'y rappellent.

J'avoue sincérement que ce n'est pas sans une peine extrême que j'abandonne l'objet de ma plus vive passion, & que je me vois forcé de priver le Public d'un petit Traité sur les Eponges & les Alcyons, que je lui destinois, & qui devoit être mon premier essai, ayant fait, dans ce genre, comme le prouve le Catalogue, une collection des plus intéressantes. Au défaut de cei Ouvrage, j'espere qu'on me sçaura gré d'avoir présenté le tableau sidéle de tout ce qui compose mon Cabinet.

Malgré les connoissances que l'ésude de plusieurs années m'a pû fournir sur les

différences substances qui s'y trouvent rassemblées, j'ai eu recours, en plus d'une occasion, aux lumieres de nos plus habiles Naturalistes, auxquels je suis redevable de plusieurs remarques neuves & importantes; mais celui à qui je dois le plus, eft M. DE ROMÉ DE LISLE, Auteur de la Lettre sur les Polypes d'eaudouce, qui a fait, de concert avec moi, toute la partie de l'Histoire Naturelle, & une partie de celle des Curiosués de l'Art.

Le peu de tems qui me reste avant mon retour au Pérou, & la peine que j'ai de voir démembrer une Collection qui, par le soin avec lequel je l'ai faite, peut devenir utile aux progrès de l'Histoire Naturelle, m'engagent à prévenir le Public que je me prêterai volontiers aux propositions de ceux qui voudroient faire l'acquisition totale de mon Cabinet : je le laisserai même, dans ce cas, à un prix fort raisonnable, & au dessous de sa valeur intrinséque, qui sera fixée sur l'estimation qu'on en fera faire par des Connoisseurs en ce genre.

#### vj AVERTISSEM. DE M. DAVILA.

On pourra s'adresser, jusqu'au 15 Octobre 1767, à M. DAVILA, rue de Richelieu, près de la Fontaine, ou à M. REMY, Peintre de l'Académie de Saint-Luc, rue Poupée, seconde Porte cochere à gauche, en entrant par la rue Haute-seuille.

Passé ce terme, si personne ne se préfente, on procédera à la Vente publique, qui commencera le lendemain de la Saint-Martin, Jeudi 12 Novembre de la même année, & qui sera continuée sans interruption jusqu'à sa fin.

On distribuera, de quinze jours en quinze jours, une feuille qui indiquera les Articles qui seront vendus dans chaque vacation.





# PRÉFACE.

AVANT que de passer au détail des Substances qui composent notre Cabinet, nous croyons devoir exposer, en peu de mots, l'ordre que nous avons suivi dans leur distribution, & les raisons qui nous ont déterminés à en donner des descriptions plus circonsciées que celles que l'on trouve ordinairement dans les Ouvrages de ce genre.

Vingt ans de soins & de recherches, ayant rendu notre Collection une des plus complettes de l'Europe, sur tout quant au Regne minéral & aux différens Corps que produit la mer, nous avons pensé que les Naturalistes nous sçauroient gré de la leur faire connoître dans un certain détail, avant qu'elle sût dispersée, & que les Curieux seroient bien-aises de se voir indiquer les

morceaux rares que nous possedons, & qu'on chercheroit peut-être inutilement ailleurs.

C'est dans cette vûe que nous avons formé le plan de notre Catalogue, & l'exécution n'étoit pas sans difficulté: car, s'il faut ici donner de chaque substance une idée aussi claire, aussi distincte qu'il est possible; il est également nécessaire de se renfermer dans les bornes prescrites à une espéce d'ouvrage où l'on doit seulement faire connoître les objets, sans chercher à en approfondir la nature & les diverses propriétés.

La disposition méthodique des substances dans ce Catalogue, nous a paru le seul moyen de réunir le double avantage de la clarté & de la précision : car, en rangeant chaque Espéce dans son vrai Genre, en plaçant le Genre dans sa Famille, & celle-ci dans sa Classe; cette simple distribution bien ordonnée, non-seulement jette une grande lumiere sur les objets, mais même elle écarte ces répétitions qu'il est si difficile d'évirer dans un ouvrage de la nature de celui ci.

Mais nous l'avons déja dit; cet ordre, qui constitue notre plan, a luimême ses difficultés: le nombre des productions naturelles est si grand; leur forme est si variée; la chaîne qui les unit entr'elles, si déliée & quelquefois si peu sensible, que l'on est souvent très - embarrassé lorsqu'il s'agit de déterminer les caracteres qui doivent constituer ce qu'on appelle un Genre, & qu'il faut fixer celui auquel on doit rapporter telle ou telle Espèce. Tantôt on se trouve arrêté par des Espéces qui ne conviennent à aucun des Genres établis; tantôt par une autre qui semble appartenir à plusieurs Genres à la fois.

Il est vrai que nous ne manquons pas d'excellens guides qui ont déja tracé la route que nous devions suivre dans ce dédale; mais un Catalogue de vente est bien différent d'un simple Catalogue raisonné, où l'on n'est point gêné par la nécessité souvent rebutante d'assortir des lots: aussi espérons-nous qu'on voudra bien attribuer à cette contrainte quelques irrégularités qui pourront se trouver dans la distribution des Espéces. Nous allons développer le plan que nous avons suivi.

Les Naturalistes s'accordent assez à diviser tous les êtres en trois grandes Classes, connues sous les noms de Regne animal, Regne végétal & Regne minéral. Cette division, quoiqu'incomplette, est suffisante pour notre objet, n'ayant à parler que des substances de ces trois Regnes.

Nous mettons à la tête du premier Regne (que nous diviserons en dix parties) les plus petits animaux connus, ou du moins leurs productions, pour nous élever par dégrès jusqu'à l'Homme. Les Polypiers ou habitations de Polypes forment, en conséquence, notre premiere Partie. Cette Classe, qui est une des plus complettes de notre Cabinet, comprend aussi les Eponges &

les Alcyons, quoique nous ignorions encore à quels Genres d'Animaux on doit rapporter ces productions singulieres. Ellis (1), Wallerius (2), Peyssonel (3), ont été nos guides pour la Partie systématique; Séba (4) & Gualtieri (5) pour la description des Espéces.

La seconde Partie contient les Co-QUILLAGES marins, fluviatiles & terrestres, dont nous faisons trois Sections, & que nous divisons, selon la méthode la plus suivie, en Univalves, Bivalves & Multivalves.

Quoique les sçavantes distributions

<sup>(1)</sup> Essai sur l'Hist. Nat. des Corallines. La Haye; 1756. in-4°. sig.

<sup>(2)</sup> Minéralogie (de la traduction de M. le Baron d'Olbach.) Paris, 1753. 2 vol. in-8°.

<sup>(3)</sup> Traduction d'un art. des Transact. Philos. sur le Corail. Londres; 1756: in-12.

<sup>(4)</sup> Locupletis. Rer. Nat. Thel. Amft. 1734 & fuiv. 4 vol. in-fol. fig.

<sup>(5)</sup> Index Testar. Conchylior. Florentia, 1742. infol. fig.

de Lister (1), Gualtieri (2), Klein (3) & Adanson (4) nous aient été d'un grand secours, nous n'avons pû adopter aucun de ces systèmes, les uns à cause des subdivisions trop nombreuses qui en résultent, & dont ce Catalogue n'est point susceptible; les autres parce qu'ils sont sondés sur la forme propre & individuelle de chaque animal, & qu'ainsi nous n'aurions pû nous y conformer entièrement, puisque nous possedons un très grand nombre de Coquilles dont les animaux ou n'ont point été décrits, ou nous sont même absolument inconnus.

Nous avons donc préféré le plan simple & aisé de M. d'Argenville (5);

<sup>(1)</sup> Historia Conchylior. Londini, 1685-1692. infol. fig.

<sup>(2)</sup> Index Testar. Conchiliorum.

<sup>(3)</sup> Tentamen Methodi Ostracologicæ. Lugd. Batav. 1753, in 4°. fig.

<sup>(4)</sup> Hist. Nat. du Sénégal. Paris, 1757. in-4°. fig.

<sup>(5)</sup> L'Hist. Nat. éclaircie dans la Conchyliologie. Paris, 1757. in-4°. fig.

plan d'ailleurs très-connu, & dès-là plus convenable à notre dessein, qui est moins de faire un traité complet sur cette matiere, que d'indiquer les Espéces & les Variétés dont nous sommes en possession.

Toutefois on ne s'est pas tellement assujetti au plan de cet Auteur, que l'on air négligé d'y faire quelques changemens, & de mettre un peu plus d'ordre dans les Familles; ce qu'on a fait en subdivisant ces Familles en un petit nombre de Genres dont les caracteres sont aisés à saisir: nous avons aussi réuni ou transposé quelques - unes des Familles, lorsqu'il nous a paru qu'il en résultoit plus d'ordre & de liaison dans notre système. C'est aux Naturalistes à juger de ces changemens; mais nous pouvons assurer que nous n'avons eu pour but que l'avantage de simplifier les objets, & de conserver les noms déja reçus, sans vouloir prendre sur nous d'en faire de nouveaux qui n'auroient pas été du goût de tout le monde, & qui dès-là exigeoient des discussions déplacées dans un Catalogue.

On nous reprochera peut - être de nous être trop étendus dans la description de la plûpart des Coquillages qui sont déja connus, & qu'il eût, dira-t'on, suffi de nommer : mais voici nos raisons.

Comme les Coquilles qui ont des noms particuliers, ne font pas la vingtieme partie de celles qui font connues; que d'ailleurs la plûpart de ces noms, quelquefois tirés de fort loin, ne font pas reçus partout, & que plusieurs ont été donnés en même tems à deux ou trois espéces souvent très-différentes, tandis que d'autres espéces ont eu jusqu'à deux ou trois noms à la fois : nous nous serions exposés à n'être point entendus, & nous n'aurions fait qu'augmenter la confusion, si nous nous étions contentés de donner un nom sans déterminer l'espéce à laquelle il convient.

Tel est l'inconvénient que nous nous sommes proposé d'éviter, en faisant de chaque espéce une description plus ou moins concise, selon que l'objet à décrire étoit plus ou moins commun, & en y joignant le nom sous lequel cette espéce est connue, non-seulement en France, mais en Hollande & dans les autres pays. En conséquence, nous avons cru devoir nous étendre un peu plus sur celles des espéces qui n'avoient point de nom.

Mais comme, en fait d'Histoire Naturelle, les descriptions les plus exactes sont insuffisantes pour ceux qui n'ont pas déja quelque connoissance des objets décrits, nous avons eu soin d'indiquer en marge la plûpart des Naturalistes qui nous ont offert la même espèce gravée, en donnant la préférence tantôt à ceux de ces Auteurs où elle étoit le mieux représentée, tantôt à ceux dont les Ouvrages sont le plus connus. C'est aussi par cette raison que nous avons cité quelquesois trois & quatre Auteurs pour un même objet, asin que, si on n'a pas l'un de ces Ou-

vrages, on puisse avoir recours aux au-

La troisieme Partie qui, sous le nom de ZOOPHYTES, comprend les Etoiles de mer & les animaux moux, auxquels on donne le nom de Mollusques, est encore des plus intéressantes, quant à la premiere de ces Familles. Si nous n'avons pas toutes les espéces qui sont décrites dans le bel Ouvrage que M. Linck a publié sur cette matiere (1), nous avons l'avantage d'en posséder plusieurs autres qui lui ont été inconnues, entre lesquelles le fameux Palmier marin tient sans contredit la premiere place, tant par sa rareté, puisque jusqu'à présent c'est le seul qui soit connu en Europe, que par le jour qu'il a répandu sur l'origine des Pierres étoilées & des Entroques depuis le Mémoire de M. Guettard (2).

(2) Voy. les Mem. de l'Acad, K. des Sc. an. 1755, p. 224 & fuiv.

<sup>(1)</sup> De Stellis marinis. Lipsia, 1735. in-fol. sig.
(2) Voy. les Mém. de l'Acad, R. des Sc. an. 1755;

Pour les sept autres Parties du Régne animal, qui sont les Crustacées, les Poissons, les Amphibies, les Insectes, les Oiseaux, les Quadrupedes & l'Homme; la Collection que nous avons de chacune de ces Classes, n'étant pas assez considérable pour qu'on ait pû ranger les individus qui les composent sous aucun Ordre systématique: nous nous sommes contentés de les indiquer, en suivant, le plus exactement qu'il nous a été possible, l'ordre dans lequel nous les aurions placés, si notre Collection eût été plus complette à cet égard.

Quoique cette partie de notre Cabinet laisse beaucoup à désirer, les Curieux y trouveront néanmoins de quoi se satisfaire, par le soin que nous avons toujours eu de nous procurer ce qu'il y avoit de plus rare en chaque genre, dans l'impossibilité où nous étions de tout completter.

Nous avons mis, à la fin du Regne animal, les Bézoards & les autres Cal-

culs qui naissent dans le corps de dissérens animaux & de l'Homme même. La suite que nous en avons est d'autant plus précieuse, qu'elle est le fruit de plus de quarante années de recherches faites par Messeurs Geosfroy de l'Académie Royale des Sciences, & que depuis elle a encore été augmentée d'un bon nombre d'autres que nous avons reçus du Pérou.

Les Végétaux forment la onzieme Partie du Catalogue des Curiosités naturelles. La suite en est peu nombreuse; mais on y verra quelques morceaux rares & une collection très-piquante d'Algues, de Fucus & de Mousses marines. C'est par-là que nous terminons notre premier volume.

Les Terres, les Pierres & les Minéraux ont fourni feuls la matiere du fecond. Au moyen de la diffribution méthodique que nous avons faite de ces différentes fubstances, on s'appercevra aisément qu'il est peu d'Espéces & même de Variétés qui nous

manquent. Nous avons suivi, autant qu'il a été possible, la nomenclature de Wallerius, quoique nous nous soyons souvent écartés du plan général de cet Auteur, pour suivre celui de quelques Naturalistes plus modernes. Nous avons aussi employé les phrases de Linnæus, sur-tout lorsqu'il s'agissoit de Pierres & de Mines de Suéde, dont nous avons reçu une très-belle suite, étiquettée conformément au système de ce célébre Naturaliste.

Le soin que nous avons pris de déterminer avec exactitude les diverses espéces de Cristallisations qui sont si fréquentes dans le Regne minéral, nous donne lieu d'espérer qu'on aura quelque indulgence pour certains articles un peu longs, parce qu'ils peuvent contribuer à faire mieux connoître ces corps dont la figure, constamment réguliere, n'est pas si indisférente que bien des personnes se le sont persuadé: outre qu'elle sussit quelquesois pour les faire reconnoître, elle paroît indiquer une affinité cachée entre ceux de ces corps qui affectent une même Cristallisation.

Ainfi, par exemple, la forme Cubique est particuliérement affectée au Spath vitreux, au Plomb, à la Marcassite, au Sel marin; la Pyramidale au Spath calcaire, au Quartz, au Cristal de Roche, à la mine d'Etain; la Prismatique hexagone au Spath calcaire, à la mine de Plomb verte, à la mine d'Argent rouge; la Rhomboïdale à la Sélénite & au Spath calcaire; l'Octaëdre à l'Alun, au Fer, au Cuivre, aux Pyrites, au Rubis, &c.

M. Linnæus est le premier qui ait envisagé, sous un point de vûe général, toutes ces différentes Cristallisations, & le seul qui en ait déterminé la figure avec assez de justesse, pour les faire reconnoître au premier coup d'œil (1); mais les unes n'ayant point encore été décrites en notre langue,

<sup>(1)</sup> Voyez Linnæi Systema naturæ: ejusd. Amænit. Acad. vol. 1. & Musæum Tessinianum.

& les autres ne l'ayant été que d'une maniere vague & incomplette, nous avons cru devoir y suppléer & ajouter aux Cristaux décrits par Linnæus, la description de plusieurs autres dont il n'a point parlé.

Les Pétrifications occupent la derniere Partie de la Collection d'Hiftoire naturelle; & ce n'est pas la moins intéressante. On y retrouvera le Plan que nous avons suivi dans la distribution des Regnes Animal & Végétal, auxquels, suivant l'opinion la plus commune, les différens corps pétrifiés doivent leur origine. S'il se trouve quelque Naturaliste qui doute encore de la réalité des Pétrifications, ou qui ne leur attribue qu'une origine purement minérale, nous avons plusieurs morceaux dont l'inspection suffira pour le tirer de son erreur. Tels sont, par exemple, du Corail rouge avec de la pyrite; des Cornes d'Ammon, des Nautilites & quantité d'autres Coquilles encore revêtues de leur test & de leur nacre; des

Echinites avec leurs dents ou leurs pointes dans la même matrice; des Entroques étoilées, parfaitement semblables aux tiges du Palmier marin (1); des Crabes pétrissés (2) presque entiers avec leurs pattes & leurs mordans; des Empreintes de Chevrettes (3), de Poissons (4), d'Insectes, caractérisées au point de ne pouvoir les méconnoître; ensin, des Bois, des Feuilles & des Fruits même (5), hors de toute contessation.

Il existe, à la vérité, un grand nombre de Pétrifications dont les Analogues vivans ne nous sont point connus; mais, si l'on ne trouve pas toujours précisément l'Espéce vivante, à laquelle on puisse rapporter telle ou telle Espéce pétrissée, il est aisé du moins de

<sup>(1)</sup> Voyez la planche 1 du troisieme vol. de notre Catalogue.

<sup>(2)</sup> Ibid. pl. 3. lett. G. g.

<sup>(3)</sup> Ibid. lett. I.

<sup>(4)</sup> Ibid. pl. IV.

<sup>(5)</sup> Ibid. pl. VI & VII.

reconnoître le genre qu'on doit lui assigner. Il n'en est pas de même des Pierres figurées (1), appellées Jeux de la Nature : celles-ci n'ont qu'une ressemblance imparfaite & le plus souvent arbitraire avec les objets auxquels on les compare : c'est ce qui met une disférence très-sensible entre les Fossiles propres & les Fossiles accidentels ou Pétrifications, quoique quelques-uns aient affecté de les confondre.

Les Curiosités de l'Art, dont il nous reste à parler, ne sont point étrangeres à un Cabinet d'Histoire Naturelle : on peut même dire qu'elles en font une branche essentielle, puisqu'il est peu de productions de la Nature, auxquelles les Arts ne puissent ajouter un nouveau lustre & un nouveau mérice.

Les différentes Classes qui composent cette partie de notre Collection, sont: 1º. Les Habits, Meubles, Armes &

<sup>(1)</sup> V. le second vol. du Catalogue.

Ustensiles de divers Peuples anciens & modernes, Chinois, Indiens, Amériquains, &c.

- 2°. Les Bijoux, les Vases d'Agate, de Jaspe, de Cristal, d'Albâtre & autres ouvrages curieux en Coquilles, Nacre & Ivoire, avec quelques anciens Laques & quelques Porcelaines de la Chine & du Japon.
- 3°. Les Modèles, les Instrumens de Mathématique, de Physique, &c.
- 4°. Les Pierres gravées Antiques & Modernes, dont plusieurs sont du premier mérite.
- 5°. Plusieurs beaux Bronzes Antiques, Bustes, Bas-reliefs & Médailles. (M. l'Abbé Grimaud, très-versé dans la connoissance des Antiques, nous a beaucoup aidés dans cette partie de notre Ouvrage).
- 6°. Une Collection affez considérable d'Estampes & de Peintures à Gouache, avec quelques Tableaux & Defseins Originaux des Maîtres des trois


Ecoles; des Miniatures, Peintures en émail & autres curiofités semblables. Cette Partie a été faite par M. REMY, Peintre de l'Académie de Saint-Luc, connu par les Catalogues qu'il a donnés de plusieurs beaux Cabinets, &, en dernier lieu, par celui qu'il vient de publier de la riche Collection de Tableaux de feu M. de Julienne.

7°. Enfin notre Bibliothéque, peu nombreuse à la vérité, mais qui contient une suite assez complette des meilleurs Livres qui ont paru sur l'Histoire Naturelle.

Afin de ne rien laisser à désirer de tout ce qui pouvoit contribuer à rendre ce Catalogue utile, on y a joint des Tables Alphabétiques & Synoptiques, avec des Gravures d'un certain nombre de morceaux rares ou nouvellement connus, & sur-tout de ceux qui n'avoient point encore été gravés: nous comptions en donner un plus grand nombre; mais le tems ne nous l'a pas permis : les Planches mêmes ont été EXV PREFACE.

finies trop tard, pour que nous puissions les citer dans le corps de l'Ouvrage. La Table Alphabétique est suivie d'une Explication succincte de ces Planches, avec un renvoi à chacun des articles du Catalogue où il en est parlé.





# TABLE SYNOPTIQUE

DU PREMIER VOLUME.

#### PREMIERE PARTIE.

POLYPIERS,

page 1

#### ORDRE I.

POLYPIERS SOLIDES OU PIERREUX.

Gre 1. Coraux.	5
2. Madrépores.	11
3. Astroites.	2 [
4. Tubipores.	. 24
5. Millepores.	26
6. Rétépores.	30
7. Méandrites.	32
8. Fongipores.	36

#### ORDRE II.

Polypiers moux ou flexibles.

Gre	1.	Faux Coraux.	43
	2.	Lithophytes.	47
	۶.	Corallines.	56

xxviij TABLE	
Gre 4. Escares molles.	
5. Eponges. 6. Alcyons.	5.5
6. Alcyons.	60
	and a second
SECONDE PARTIE.	
Coquilles.	7.1
SECTION.	
Coquilles de Mer.	75
CLASSE I.	
Coquilles de mer, univalves	
FAMILLE L	
Lépas.	
Gre 1. Lépas entiers.	78
2. percés au sommer.	8.8
3. chambrés.	89
4. à appendice en demi-cornet.	91
FAMILLE II	
OREILLES DE MER.	
1. Oreilles de mer, à trous.	93
2. fans trous.	25
·	

	SYNOPTIQUE.	XXIX
	FAMILLE III.	
	TUYAUX DE MER.	
Gre 1.	Tuyaux de mer, simples ou isole	és. 97
. 2.	groupés ou Ver	
	culaires.	102
3.	non testacés.	
	FAMILLE IV.	
	NAUTILES.	
	Nautiles chambrés.	200
21. 24	non chambrés.	107
1	non chambles.	to8
	FAMILLE V.	
	LIMAÇONS.	
Ι.	Limaçons à bouche ronde.	110
2.	à bouche demi-ron	
	dits Nérites.	116
31	à bouche ovale, dits	
	bots.	123
	,	^ <b>~</b> P.
	FAMILLE VI.	
	Buccins.	
1.	Buccins à bouche entiere.	1 3.3.
2.	à bouche échancrée.	136
3.	à petite queue.	143
4.	à longue queue.	155
Ç# "		

#### FAMILLE VII.

#### ROCHERS.

Gre I.:	Rochers fans queue.	159
		-168
3.	aîlés, sans pattes.	179
4.	aîlés, à pattes.	- 988
	FAMILLE VIII.	
	Pour Pres.	
Ι.,	Pourpres à petite queue.	194
i.		202
	FAMILLE IX.	
	TONNES.	
. T.	Tonnes à bouche entiere.	206
		208
3.		216
	FAMILLE X.	
	V I S.	
T ]	Vis lisses.	219
	ftriées.	221
	tuberculeuses.	226
۶۰		
	FAMILLE XI.	
	VOLUTES.	
		4 4 4
Lal	Volutes coniques, ou Cornets.	232

SYNOPTIQUE. XXX
Gre 2. Volutes cylindriques, ou Rouleaux. 252
3. échancrées, ou Olives. 257
3. contantitions, on ourses. 237.
FAMILLE XIL
PORCELAINES.
1. Porcesaines à bouche moins étroite. 264
2. à bouche plus étroite. 267
2. a bodelle plus citotte. 207
CLASSE II.
Coquilles DE MER BIVALVES.
FAMILLE I.
HUITRES.
1. Huitres proprement dites. 280
2. feuilletées. 293
3. épineuses. 298
4. Anomies ou Térébratules. 311
FA'MIL'LE II.
PEIGNES.
1. Peignes à oreilles égales.
2. à oreilles inégales, dits
Pétoncles. 319
6 211
3. lans oreilles.
FAMILLE III.
CAMES.
1. Cames à bases rondes régulieres. 329

3. à bases ovales régulieres. 339 4. à bases ovales irrégulieres. 344  FAMILLE IV.  CŒURS.  1. Cœurs proprement dits. 349 2. Arches. 357 3. Cames tronquées ou Conques de Vénus.  FAMILLE V.  TELLINES.  1. Tellines béantes à une extrémité. 379 2. béantes aux deux bouts. 379 3. Manches de couteau. 378  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 380 2. cylindriques, ou Dattes. 380	Gre 2. Cames à bases rondes irrégulieres.	335
FAMILLE IV.  Coeurs proprement dits.  1. Cœurs proprement dits.  3. Cames tronquées ou Conques de Vénus.  FAMILLE V.  Tellines béantes à une extrémité.  3. Manches de couteau.  FAMILLE VI.  Moules proprement dites,  2. cylindriques, ou Dattes.  386	3. à bases ovales régulieres.	339
C Œ U R S.  1. Cœurs proprement dits. 349 2. Arches. 357 3. Cames tronquées ou Conques de Vénus. 366 FA MILLE V. Tellines. 1. Tellines béantes à une extrémité. 379 2. béantes aux deux bouts. 379 3. Manches de couteau. 378 FA MILLE VI. Moules proprement dites, 389 2. cylindriques, ou Dattes. 389	4. à bases ovales irrégulieres.	344
C Œ U R S.  1. Cœurs proprement dits. 349 2. Arches. 357 3. Cames tronquées ou Conques de Vénus. 366 FA MILLE V. Tellines. 1. Tellines béantes à une extrémité. 379 2. béantes aux deux bouts. 379 3. Manches de couteau. 378 FA MILLE VI. Moules proprement dites, 389 2. cylindriques, ou Dattes. 389	71.25.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.7.	
1. Cœurs proprement dits. 2. Arches. 3. Cames tronquées ou Conques de Vénus. 366  FAMILLE V.  TELLINES. 1. Tellines béantes à une extrémité. 2. béantes aux deux bouts. 378 3. Manches de couteau. 378  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 2. cylindriques, ou Dattes. 389	FAMILLE IV.	
2. Arches. 3. Cames tronquées ou Conques de Vénus. 366  FAMILLE V. TELLINES. 1. Tellines béantes à une extrémité. 376 2. béantes aux deux bouts. 376 3. Manches de couteau. 378  FAMILLE VI. Moules proprement dites, 386 2. cylindriques, ou Dattes. 386	Cours.	
FAMILLE V.  TELLINES.  1. Tellines béantes à une extrémité. 376 2. béantes aux deux bouts. 376 3. Manches de couteau. 378  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 386 2. cylindriques, ou Dattes. 386	1. Caurs proprement dits.	345
FAMILLE V.  TELLINES.  1. Tellines béantes à une extrémité. 376 2. béantes aux deux bouts. 376 3. Manches de couteau. 376  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 386 2. cylindriques, ou Dattes. 386	2. Arches.	357
FAMILLE V.  TELLINES.  1. Tellines béantes à une extrémité. 376 2. béantes aux deux bouts. 376 3. Manches de couteau. 376  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 386 2. cylindriques, ou Dattes. 386	3. Cames tronquées ou Conques de Véni	us.
TELLINES.  1. Tellines béantes à une extrémité. 376 2. béantes aux deux bouts. 376 3. Manches de couteau. 378  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 386 2. cylindriques, ou Dattes. 386		360
r. Tellines béantes à une extrémité. 376 2. béantes aux deux bouts. 376 3. Manches de couteau. 378  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 386 2. cylindriques, ou Dattes. 386	FAMILLE V.	
2. béantes aux deux bouts. 37 3. Manches de couteau. 37 3  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 38 3 2. cylindriques, ou Dattes. 38	TELLINES.	
2. béantes aux deux bouts. 37 3. Manches de couteau. 37 3  FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 38 3 2. cylindriques, ou Dattes. 38	r. Tellines béantes à une extrémité.	370
FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 2. cylindriques, ou Dattes. 386		
FAMILLE VI.  Moules proprement dites, 380 2. cylindriques, ou Dattes. 380		
Moules proprement dites, 380 2. cylindriques, ou Dattes. 380		- 1
1. Moules proprement dites, 380 2. cylindriques, ou Dattes. 380	FAMILLE VI.	
2. cylindriques, ou Dattes. 386	Moules.	
2. cylindriques, ou Dattes. 386	Maules proprement dites.	280
thangulaites ou Fulles -	3. triangulaires, ou Pinnes	

TABLE

# CLASSE III.

Coquilles de MER MULTIVALVES?

marines.

#### FAMILLE I.

OSCABRIONS.

xxxij

.392

388

FAMILLE

SYNOPTIQUE.	xxxiii
FAMILLE II.	
PHOLADES.	
Gre 1. Pholades fextivalves.	396
2. quintivalves.	397
FAMILLE III.	
Tuyaux.	
1. Tuyaux trivalves.	398
2. quintivalves.	399
FAMILLE IV.	
GLANDS DE MER.	401
FAMILLE V.	
Conques anatiferes et Poucepieds.	405
FAMILLE VI.	
Oursins.	
Gre 1. Turbans.	410
2. Cœurs marins.	418
3. Eufs marins.	ibid.
4. Pavois ou Boucliers.	425
5. Gâteaux ou Beignets.	423
	425
SECTIONIL	
Coquilles fluviatiles.	427
Tome I.	

XXXIV	.1,	TA	B	Ł	E
		- 190			

	5	Ł	C	1	l	0	N	I	I	I
16										

Coquilles	TERRESTRES.		436

TROP	SI	E	M	E	PA	R	TI	E.
------	----	---	---	---	----	---	----	----

Zo	0 P	TES.	 	h =		451
						1)"

#### FAMILLE I.

#### ETOILES DE MER.

$G^{re}$	ı.	Etoiles	de	mer,	à rayons fendus	454
-0.	2.				à rayons entiers.	464

#### FAMILLE II,

Mollusques.		11
TATOLLUS OUES.		469

## QUATRIEME PARTIE.

#### CRUSTACÉES.

Gre I.	Crustacées à corps allongé.	471
2.	à corps large.	472
3.	a corps arrondi.	474

## CINQUIEME PARTIE.

The second secon	. (	
Poissons.		475
FOI 3 2 G II 9"	 (	77/3

TABLE SYNOPT	IĆ	ĮUĿ	١,
--------------	----	-----	----

20	R.P.	97	427
Α	Α	Δ	A

S	T	X	I	E	M	E	PA	R	T	I	E	
---	---	---	---	---	---	---	----	---	---	---	---	--

Amphibies. 478

#### SEPTIEME PARTIE.

INSECTES. 484

#### HUITIEME PARTIE.

OISEAUX. 490

#### NEUVIEME PARTIE.

QUADRUPEDES.

492

#### DIXIEME PARTIE.

L'HOMME.

500

#### APPENDICE

Bezoards et Calculs.

50I

## ONZIEME PARTIE.

VÉGÉTAUX.

509

# APPROBATION DE M. ADANSON.

DE l'Académie Royale des Sciences, de la Société Royale de Londres, Cenfeur Royal.

J'Aı lû, par ordre de Monseigneur le Vice-Chancelier, un Ouvrage intitulé: Catalogue systématique & raisonné des Curiosités de la Nature & de l'Art, qui composent le Cabinet de M. DAVILA; & jen'y ai rien trouvé qui puisse en empêcher l'impression.

Ce Cabinet, vraisemblablement le plus riche qu'aucun Particulier ait encore formé, surtout quant à la partie de l'Histoire Naturelle, est d'autant plus précieux qu'il renserme des Suites immenses des productions des trois Regnes de la Nature. Il seroit fâcheux que cette Collection, qui nous est très-connue, & qui est destinée à être misse en vente, sût démembrée & dispersée dans divers petits Cabinets particuliers, étant très-digne de l'attention de quelque Souverain qui en seroit l'acquission, autant par magnificence que pour procurer à ses Peuples des objets de connoissances naturelles, dont l'application bien entendue mene le plus souvent à quelque chose d'utile pour le commerce de la Société. Fait à Paris, ce 13 Mai 1767.

ADANSON.



## CATALOGUE

RAISONNÉ DES CURIOSITÉS

## D'HISTOIRE NATURELLE

DU CABINET

DE M. D'AVILA.

# PREMIERE PARTIE.

POLYPIERS.

Ous rangeions sous cette Classe toutes les productions marines qui ont été prises si longtems pour des plantes, & que les découvertes de MM. Peysfonel, Tremblay, de Réaumur, de Jussieu, Ellis & Donati ont démontré appartenir au Regne animal. On peut voir dans les Traités de ces sçavans Naturalistes les preuves nombreuses qui

POLY-

POLY-

autorisent ce sentiment. Sans entrer dans de plus grands détails à cet égard, nous nous contenterons de dire ici que ces productions si singulieres & si variées sont l'ouvrage & la demeure d'animaux encore peu connus à cause de leur petitesse, auxquels on a donné le nom de Polypes. Ces Polypes que le Comte de Marsigly & quelques autres ont cru être les fleurs de ces prétendues Plantes, ne sont peut-être eux-mêmes que des fourreaux minces & déliés remplis d'animalcules presque imperceptibles (a); mais que le Polype soit pris pour famille ou pour individu, il n'en est pas moins constant que les productions dont nous allons parler font autant de ruches extrêmement peuplées, comme il est aisé de s'en convaincre en les observant au microscope, lorsqu'elles sont encore dans leur élément : on

<sup>(</sup>a) Voyez la Lettre de M. de Romé de l'Isle à M. Bertrand fur les *Polypes d Eau douce*. Paris, *La Combe*, 1766, in-12.

voit alors des milliers de Polypes sortir Polyde toutes les tubules dont elles sont garnies, & y rentrer avec précipitation lorsqu'on les tire hors de l'eau. Les habitations de cette Classe d'Erres animés sont aussi variées dans leur sorme que dans leur tissu. On peut néanmoins les réduire à deux Ordres principaux; dont le premier comprendra les Polypiers de substance solide ou pierreuse; & le second, les Polypiers de substance molle ou flexible. Il auroit peut être été plus exact d'établir nos classifications fur la forme propre & individuelle des animaux qui habitent & construisent ces Polypiers; mais, faute de connoissances assez étendues sur cet objet, nous adoptons les divisions qu'a établi le célebre Wallerius pour les Polypiers fossiles, & celles de M. Ellis pour les Corallines, en y faisant quelques légers changemens qui nous ont paru propres à jetter du jour sur cette partie de l'Histoire Naturelle.

#### POLYPIERS.


Poly-PIRS. Le premier Ordre de cette Classe contient huit Genres, qui sont

- 10. Les Coraux proprement dits.
- 2°. Les Madrépores.
- 3°. Les Astroïtes.
- 4°. Les Tubipores.
- 5°. Les Millepores.
- 6°. Les Rétépores.
- 7°. Les Mæandrites.
- 8°. Les Fongipores.

Le second ordre est composé de six Genres, qui sont

- 1º. Les Faux Coraux.
- 2°. Les Kératophites ou Litophites.
- 3°. Les Corallines.
- 4º. Les Escares molles.
- 5°. Les Éponges.
- 6°. Les Alcyons.





## ORDRE PREMIER.

#### POLIPIERS

DE SUBSTANCE SOLIDE OU PIERREUSE.

## GENRE PREMIER.

CORAUX.

Ce font des Polypiers d'une substance dure & compacte, intérieurement
massive, pleine & solide, sans aucun
trou ni porosité apparente, quoiqu'elle
soit revêtue d'une écorce tartareuse
garnie de tubules & de petits trous. On
enleve aisément cette écorce dans
l'instant que le Corail sort de l'eau;
mais après qu'il a été exposé à l'air un
certain temps, on ne peut la détacher
sans la réduire en poudre. C'est dans
les tubules qui la composent que logent
les animaux du Corail. Tous les Polypiers de ce genre sont ordinairement
branchus, légerement striés, & présen-

A iii

CORAUX. tent aux yeux la figure d'un Arbrisseau dépouillé de ses seuilles : la grosseur de la tige n'excéde guère un pouce, & sa plus grande hauteur est d'un pied ou un peu plus.

ARTICLE I. Un très-bel Arbrisseau de Corail rouge, revêtu en partie de son écorce, portant onze pouces de haut sur huit de large, monté sur un pied de bois des Indes (a). Ce morceau, qui est d'une forme très élégante, est encore remarquable par deux branches qui se sont trouvées cassées dans le tems qu'il étoit dans la mer, lesquelles étant tombées entre les autres branches, s'y trouvent comme collées & recouvertes de la même écorce qui envelope le reste. Cet accident est d'autant plus curieux qu'il peut contribuer à rendre raison de la formation du Corail.

2. Un autre Arbriffeau de même Corail, entierement revêtu de son écorce, ayant sept pouces de haut sur huit de large Il adhére par sa base à une espéce de rocher qui paroît avoir

<sup>(</sup>a) Nous avertissons une fois pour toutes que presque tous les Polypiers des Articles suivans sont pareillement montés sur des pieds de bois des Indes, ou de bois noirci, excepté ceux qui ont un support naturel, ou quelqu'autre support particulier dont nous parletons à leur Article.

été formé d'un assemblage confus de divers CORAUX.

Polypiers.

3. Un magnifique Arbrisseau de Corail rougesanguin, dépouillé de son écorce, & dont les branches s'étendent en éventail. Ce morceau qui est monté sur un pied de bois noir, orné de cartouches de cuivre doré, est un des plus grands que l'on connoisse. Il porte neuf pouces de haut sur un pied de large, & est presque semblable à celui dont parle Séba \*.

4. Un autre d'un rouge plus foncé que le de son Cabiprécédent, à branches dispersées en tout sens, pl. 115, N°. monté sur un pied de cuivre doré en or moulu enrichi de bordures, dentelures & sleurons de même Corail. Ce morceau, haut de cinq pouces & large de neuf, est des plus curieux.

5. Un autre Arbrisseau d'un rouge pâle, mais remarquable par la groffeur extraordinaire de ses trois principales branches, dont une a plus d'un pouce de diametre, & les autres un peu moins. Le tronc a près de trois pouces de diametre dans sa plus grande largeur. Toute la piéce a sept pouces de haut sur neuf & demi de large.

6. Un autre d'un rouge plus foncé que le précédent. Il se partage en deux branches principales d'une belle grosseur. Sa hauteur est de neuf pouces neuf lignes sur neuf pouces de

large.

· A iv

CORAUX.

- 7. Un autre de la plus riche couleur & parfaitement beau. Il a fix pouces de haut sur cinq de large, & est monté sur un pied de laque de même couleur, imitant le Corail.
- 8. Un autre d'un beau rouge foncé. Ce morceau est enrichi de deux grandes huîtres & d'un tube vermiculaire de deux lignes de diamette, lesquels sont recouverts de la substance même du Corail.
- 9. Un magnifique Arbriffeau de vrai Corail blanc, portant huit pouces de haut. Il est en tout semblable au Corail rouge, à la couleur près, ce qui le rend très-rare.
- to. Trois petits morceaux de Corail, rares & des plus curieux; sçavoir, un morceau de Corail en partie rouge & en partie blanc. Un traversé dans toute sa longueur par une branche de l'Espéce des Kératophites, connue sous le nom de Corail noir. Celui-ci est d'un beau noir luisant, & sert de base au Corail rouge qui l'enveloppe. Une interruption qui se trouve naturellement vers le milieu de ce morceau, en laisse voir tout le mécanisme. Et une branche de faux Corail noir, revêtue d'une croute grisâtre & celluleuse qui est elle-même recouverte d'une couche de vrai Corail rouge, dont les fractures laissent appercevoir les couches intérieures.
  - 11. Deux piéces de Corail rouge avec son

écorce, dont une fait partie d'un groupe de CORAUX. différens Polypiers entassés l'un sur l'autre en forme de rocher; tels que des Eponges, des Litophites, des Corallines, des Tubes vermiculaires & quelques petites Anomies. L'autre est aussi chargée de ces Corps étrangers.

12. Deux autres Groupes du même Corail & des mêmes Polypiers, sur chacun desquels on remarque de plus une huître complette. Celle du plus petit est blanche, feuilletée &

peu commune.

13. Seize petits morceaux de Corail, trèsintéressans pour ceux qui en étudient l'Histoire; sçavoir, 1°. Cinq de Corail blanc de différentes nuances, l'un desquels se divise en deux branches de forme applatie & très minces, & un autre fort singulier dont l'extrêmité supérieure s'applatit & s'élargit en forme de feuille. 2°. Un petit échantillon de Corail blanc & rouge. 3°. Un petit pied de Corail rouge qui différe des autres espéces connues, en ce que fes stries sont plus profondes sur-tout vers l'extrêmité des branches. 4°. Un morceau dont les branches sont entrelacées les unes dans les autres, & qui paroît être une variété. 5°. Trois morceaux, dont un de Corail blanc, un de Corail noir, & un de Madrépore branchu, remarquables en ce qu'ils sont revêtus de Corail rouge. 6°. Un autre morceau des plus extraor-

CORAUX. dinaires; c'est une branche de Corail rouge, couverte d'une croute grisâtre, laquelle est elle-même recouverte par une seconde couche de Corail rouge qui a conservé une partie de son écorce. Entre ces deux couches est renfermé un Tube vermiculaire affez confinérable. 7°. Un Galet & trois petites Valves d'Huîtres, dont deux feuilletées, avec des branches de Corail qui y font adhérentes. 8°. Une petite Anomie aussi chargée de Corail.

14. Un petit Bocal très-curieux contenant quelques branches de Corail rouge, chargées de leurs Polypes des mieux confervés dans une liqueur appropriée. On voit très-distinctement leurs bras étendus en forme d'étoiles, & semblables aux pétales d'une petite fleur blanche.

15. Vingt échantillons de Corail numérotés 1=20; où l'on trouve toutes les gradations de fa couleur depuis le rouge le plus pâle jusqu'au rouge le plus foncé. Plus, sept douzaines de grains de même Corail de la grosseur d'un gros pois, dont chaque douzaine aussi numérotée offre une variété de nuances très-suivie. Ces échantillons ont été envoyés de la manufacture de Naples.



#### GENRE SECOND.

#### MADRÉPORES.

OLYPIERS d'une substance dure & MADRÉ pierreuse, moins compacte que la précédente, composés de branches en forme d'Arbrisseau, garnis de tubules, sans écorce, percés d'une foule de trous étoilés, la plûpart très-sensibles & d'une forme réguliere qui est toujours la même dans chaque espéce, quoiqu'elle varie à l'infini dans les espéces différentes; les Madrépores différent des Coraux simples par les pores étoilés dont ils sont pourvus & par le défaut d'écorce. Les Polypes qui les habitent occupent l'extrêmité des cellules.

16. Un très - beau Madrépore blanc de la Méditerranée à rameaux arrondis, lissés, tortueux, entrelassés les uns dans les autres, parsemés de grands trous ou pores, assez éloignés les uns des autres, débordant un peu la super- \*Seba, pl. ficie, étoilés & cannelés en-dedans; connu sous 2. Gualtieri ind. testar. le nom de Corail blanc oculé \*. Ce morceau, No. 3.

Madré-

qui est d'une blancheur parfaite, forme un Arbre de neuf pouces de haut sur autant de large.

17. Un autre Madrépore blanc oculé de la même espéce, à branches plus nombreuses & plus déliées. Il porte onze pouces de haut sur

10 de large.

18. Trois autres Madrépores; fçavoir, un blanc oculé de l'Amérique, à étoiles moins éparfes que le précédent; un, en buisson, couleur lilas, à petites branches rameuses, semées de pores étoilés affez faillants. Le troisième est d'un très beau violet à petites branches chagrinées, un peu applaties & comprimées. Ces branches ont les deux surfaces séparées par une suite de petits trous qui regnent le long des côtés, ce qui leur donne l'apparence de deux piéces appliquées l'une sur l'autre. Ces trois morceaux ne sont pas communs.

19. Un rare & bel Arbisseau de Madrépore blanc étoilé des Indes, à étoiles plus nombreuses, moins profondes, moins faillantes & à moins de rayons que celles des précédens; la surface des branches & du tronc paroît à la loupe comme grainelée. Il est monté sur un support de bois des Indes qui entre à coulisse dans une boëte du même bois & vitrée.

20. Un autre Madrépore branchu étoilé, de la même espéce que le précédent. Il est remarquable en ce qu'il s'est formé sur un gros Lithophite, dont il recouvre deux des principales MADRÉbranches; il est audi chargé de plusieurs huîtres. Les autres branches du Lithophite qui s'étendent en éventail sont recouvertes de l'écorce tartareuse, rouge & celluleuse qui leur est propre.

20 bis. Un Madrépore branchu des Indes Orientales, rare, blanc de lait, à branches fines, nombreuses, chargées de petites tubules étoilées, fort serrées. Sa forme est des plus gracieuses, & il adhère par sa base à un Polypier en sorme de concrétion blanche & branchue de l'espéce

des faux Coraux.

21. Un très-grand Madrépore rameux de la Méditerranée, à étoiles larges & profondes situées aux extrêmités des branches; le reste de sa superficie est simplement strié, sans pores \* Donath sensibles, & tire sur le rougeâtre \*. Cet arbre mer Adriauge qui est d'une beauté surprenante, porte dixneuf pouces de haut sur autant de large.

22. Un autre de la même espéce, grisatre, à branches moins grosses, & portant treize pou-

ces de haut sur dix-sept de large.

23. Un autre des mêmes espéce & couleur, mais d'une nature beaucoup plus compacte, & à branches très grosses. Ce morceau, qui est d'une pesanteur remarquable pour un Madrépore, a 14 pouces de haut sur autant de large.

24. Un autre de même espéce, chargé de

MADRÉ-

branches de Corail rouge, de Tubes vermicus laires, d'Huîtres, d'Anomies, de Corallines & autres Corps marins qui rendent cet article fort curieux. Il a onze pouces de haut sur autant de large.

25. Un autre avec les mêmes accidens, mais

moins large.

26. Un autre semblable de treize pouces de

haut für fept de large.

27. Un très-grand Madrépore abrotanoïde gris-jaunâtre, appellé Bois de Cerf, à rameaux arrondis, pointus, dont toute la superficie est hérissée de Tubules faillantes, étoilées en-dedans. Ce beau morceau porte vingt-cinq pouces de haut sur vingt-trois de large.

23. Un autre Madrépore Bois de Cerf, adhérent naturellement à un grand Millepore, d'un blanc sale, étendu en éventail, dont l'extrêmité des seuilles est prosondément découpée. A cette particularité près, ce groupe ressemble parsaitement, tant pour la grandeur que pour la forme,

\* Descr. de à celui qui est représenté dans Séba \*.

gris-cendré, à grosses branches, se subdivisant vers l'extrêmité en plusieurs rameaux en forme de bouquets. Il porte quinze pouces de haut sur autant de large.

> 30. Deux Madrépores de moyenne grandeur, dont un gris-jaunâtre en forme de bou

quet, à branches minces & pointues, garnies de MADRÉ-Tubules plus faillantes que dans l'espéce précédente, ce qui lui a fait donner le nom d'Epi de Bled; & un en forme de buisson d'un blancbleuâtre, à branches plus grosses & plus rassemblées, également hérissées de longues Tubules. C'est le Madrepora albida digitata de Gualtieri \*.

\* Ind. tellar!

31. Un Madrépore blanc en buisson, de six Nº. 30. pouces & demi de diamètre, d'une forme arrondie très-agréable, à branches minces & petites, partant en grand nombre d'un même tronc d'où elles s'élevent en tout sens. Elles sont chargées de Tubules faillantes, étoilées endedans comme les espéces précédentes.

32. Un autre Madrépore en buisson, à branches plus grosses, & d'un beau blanc de neige, de forme presque ronde & de la plus parfaite conservation. Il a dix pouces de diamètre, & est porté naturellement sur son pied qui est aussi garni de Tubules, mais moins faillantes que celles des branches.

33. Un autre Madrépore en buisson, de couleur grise, ayant près d'un pied de diamètre. Il est pareillement porté sur une base de même nature que le reste.

34. Un beau Madrépore branchu, blanc sale mêlé de rouge, à branches épaisses, tuberculeuses qui s'élevent ensemble de la tige dans

MADRÉ- une direction presque verticale, larges & fourrokes chues aux extrêmités. Leur surface est entiere-

\* Gualtieri ment couverte de petits pores étoilés \*. Il porte ind. rest. N°. neuf pouces & demi de haut sur huit & demi de

large.

35. Un très-beau Madrépore de la même espéce, blanc-fauve, à branches plus nombreufes, dont les principales se subdivisent en d'autres plus petites & comprimées qui s'étendent

\*Idem. N°. en différens sens, & imitent les Choux fleurs \*.

Il a onze pouces de haut sur presque autant de

large.

36. Un autre de même espéce d'un très beau blanc, de forme ovale. Son plus grand diamètre est de neuf pouces & demi, & sa hauteur de

cinq pouces & demi.

37. Un autre d'un blanc jaunâtre, à branches plus larges, plus applaties & plus éparfes, mais du reste semblable au précédent. Il adhére à un autre Madrépore de forme orbiculaire, dont toute la surface est parsemée de petites étoiles, & qui lui sert de base. Ce morceau, des plus agréables, a dix pouces de haut sur quatorze de large.

38. Deux Madrépores de moyenne grandeur, dont un blanc rougeâtre, en forme de buisson, à petites branches qui se subdivisent de tous côtés en d'autres plus petites à plusieurs fourches, & adhérent à une branche de l'es-

péce

péce décrite Art. 27, sous le nom de Bois de MADRÉ-Cerf. L'autre est de même espéce que celui de l'Art. 35.

39. Deux autres de moyenne grandeur, dont un de l'espéce du premier de l'Art. précédent,

& un de celle de l'Art. 3 ;.

40. Un autre Madrépore blanc, en buisson, à branches fort serrées, fourchues & tuberculeuses. Cette espéce paroît tenir le milieu entre celle de l'Art. 35 & la premiere de l'Art. 38.

41. Un Madrépore gris, à rameaux arrondis, fort serrés les uns contre les autres, épais, mousses & noueux aux extrêmités, parfemés de pores étoilés, très-petits. On remarque à sa base \* & sur quelques-unes de ses branches, des \* scha, tom. Madrépores agarics qui s'y font attachés. Ce No. 11. morceau, qui a cinq pouces & demi de haut sur huit de large, est fort grand pour son espéce.

- 42. Deux Madrépores en buisson, dont un de moyenne grandeur, blanc-jaunâtre, à branches sinueuses & tortues qui se joignent par les côtés en façon de treillis. Elles sont hérissées de tubules & chargées de petits rameaux qui forment, en s'élevant, une espéce de coupe à bords évasés; & un de l'espéce du premier de l'Art. 38:
- 43. Deux autres, dont un de l'espéce du premier de l'Article précédent, & un de celle de l'Art. 35.

Tome I.

MADRÉ-PORES.

Lett. c.

44. Un grand & rare Madrépore gris-obscur, à rameaux larges & applatis, femblables aux Cornes de Daim ; leur superficie est hérissée \* séba, tom. de tubules \*. Ce morceau porte un pied de

3 , pl. 113. haut sur dix-huit pouces de large.

> 45. Un autre, blanc-sale, ressemblant à une grande feuille contournée, dont les bords se rapprochent un peu en forme de cornet. On remarque çà & là dans l'intérieur quelques rejettons de la même forme. Ce Madrépore est couvert de tubules fort faillantes, & connu sous le nom de Char de Neptune, il porte vingt-& un pouces de haut sur vingt de large.

> 46. Un autre Char de Neptune de moyenne grandeur.

47. Deux jolis Madrépores de moyenne grandeur, dont un d'Amérique, rare, de forme mince & applatie, semblable à l'Agaric, à surface supérieure couverte de sillons ondu-\* 56ba, pl. leux & étoilés \*, & un de l'espéce de l'Article 110, Nº. 6, précédent, mais de couleur plus blanche.

> 48. Un Madrépore agaric de forme trèsgraciense; différent du précédent en ce que ses feuilles font en grand nombre, & ont nonseulement la surface supérieure, mais encore l'inférieure couverte des mêmes sillons ondu-

\* séba, ibid. leux & étoilés \*. Il porte dix pouces de haut fur neuf de large.

49. Un autre de même espèce, mais de forme MADRÉ. différente.

50. Un Madrépore agaric en forme d'éventail.

51. Un autre à plusieurs feuilles, diversement contournées.

52. Un Madrépore, nommé Calice ou Tasse, fait en forme d'entonnoir, & duquel les surfaces intérieure & extérieure sont légerement cannelées & hérissées de petits trous étoilés peu faillans \*.

53. Cinq petits Madrépores rares & d'ef-Gualtieri, inpéces différentes; sçavoir, un à petites bran-dex testat. ches chargées de rejettons tortus & frisés, disposés en éventail & couverts de petits grains arrondis & inégaux dont ils paroissent hérissés \* " Cualtieri, ind. test. N° ind. Test Un en forme d'If, à tige principale environnée 121. dans toute sa longueur de petites branches alternes & fourchues, forées à l'extrêmité de tubules plus sensibles que dans les autres parties. Un en petit buisson, à branches arrondies, se croisant & s'entrelaçant de maniere à former une espéce de réseau à jour malgré son épaisseur. Elles sont parsemées de petits pores étoilés. Un à feuilles crêpues & fort serrées, parsemées en entier de pores étoilés très-sensibles. Et un en forme d'Agaric, d'une espéce particuliere. La surface supérieure de ses feuilles est criblée çà & là de larges & profondes

étoiles, légerement faillantes, & dont les stries

Madré-

prolongent sur les parties des feuilles qui en font dépourvues. On y remarque aussi quelques gros tubercules striés comme le reste.

54. Trois petits Madrépores; sçavoir, un Agaric à surface extérieure parsemée de pores étoilés peu saillans, assez larges, & dont les stries sont en-dedans, adhérant à un gros gallet qui sert aussi de support à quelques Astroues & à un petit Madrépore, peu dissérent du second de l'Article précédent; un de l'espèce du premier de l'Article 38, sormant un petit bouquet sur un autre Madrépore auquel il adhére; & un de l'espèce du quatrième de l'article précédent.

55. Quatre petits Madrépores; sçavoir, un rate de Curação, à branches peu nombreuses, larges, épaisses, tuberculeuses, dont l'extrêmité est applatie & comprimée. Toute sa superficie est couverte de pores étoilés comme l'espéce de l'Art. 41, dont il paroît être une variété. Un Madrépore agaric, semblable au premier de l'Art. 47. Un Madrépore branchu de l'espéce décrite Art. 41; & un semblable au second de l'Article précédent.

55 (bis). Un Madrépore Agaric blanc, trèsrare, à partie supérieure, revêtue de protubérances cylindriques grosses, étoilées, plus ou moins faillantes, formées de lames très finement dentelées, qui en rendent la surface comme veloutée. La partie inférieure ne différe en rien de celle des autres Madrépores Agarics. Ce morceau curieux nous est arrivé depuis peu des Indes.

## GENRE TROISIÉME.

#### ASTROÏTES.

NOLYPIERS de la nature des précédens, & qui n'en différent que par leur ASTROITESstructure. Ils font composés de tubes parallèles joints ensemble par leurs côtés, & dont la cavité est remplie de plusieurs lames qui partent de leurs parois & vont aboutir à un centre, ce qui forme des étoiles rondes, ovales ou anguleuses plus ou moins grandes & à plus ou moins de rayons. Les Astroïres différent des Madrépores en ce qu'ils ont des pores étoilés joints & parallèles qui n'en font qu'une seule masse, & des Tubipores, en ce que ceux ci ont des tubes fourchus & irréguliers fort faillans & non parallèles. Les Polypes des Astroïtes occupent l'extrêmité des cellules comme dans les Madrépores.

56. Un très-bel Astroïte oblong, à partie supérieure convexe, & inférieure applatie, à Astroïtes. grandes étoiles orbiculaires bordées de petits jets faillants qui se répandent de tous côtés dans \* Seba , pl. les interstices des étoiles \*. Il porte seize pouces de long sur neuf de large.

\* Seba , pl. lieu, & dont les bords ne font point frangés \*.

Ce morceau, d'une beauté finguliere, est de forme orbiculaire applatie, & groupé avec un autre de même espéce & de même forme auquel il tient par une espéce d'étranglement. Ce groupe est encore embelli par un grand Millepore feuillu, étendu en forme d'éventail, & par un Madrépore agaric de l'espéce décrite Art.

47. Le tout porte vingt & un pouces de long fur quatorze de large.

58. Un Astroïte globuleux à pores étoilés, amples, non-arrondis, mais anguleux; les jets \*seba, pl. dont ils sont bordés sont minces & élevés \*. Il adhére à un joli Madrépore en buisson de l'espéce de l'Art. 31, & porte neuf pouces de haut sur sept de large.

59. Deux Astroïtes, dont un en forme de calotte tuberculeuse, parsemée de petits pores \* Scha, pl. étoilés fort nombreux \*, & posée naturelle\*\*\* \* Scha, pl. étoilés fort nombreux \*, & posée naturelle\*\*\*\* \* ment sur une base de même nature & un peu feuilletée. Cet Astroite vient de Curação, où il est connu sous les noms de Téte de More, ou de Perruque à l'Angloisé. L'autre est de même

espéce, mais en forme de rocher, & percé çà ASTROITES. & là de tubes cylindriques très-profonds qui paroissent l'ouvrage de quelques Polypes parafites qui s'y logent.

60. Un autre en forme de monticule creusée par de profonds & larges sillons, inégaux entr'eux. Cet astroïte à petites étoiles, & de même espéce que le précédent, a été trouvé sur la patte d'un ancre de vaisseau dans les Indes Orientales. Il adhére dans toute sa base à une plaque du fer de l'ancre sur laquelle il s'est formé, ce qui le rend fort curieux.

61. Un Astroite mince & feuilleté en forme d'Agaric. La surface supérieure de ses seuilles est parsemée de petits pores étoilés fort nombreux comme l'espéce de l'Article précédent dont il paroît être une variété. Il est de figure arrondie, & porte treize pouces de diamètre.

62. Deux Astroïtes globuleux, rares & d'une belle grandeur, dont un à larges & très prosondes étoiles irrégulieres, dont les bords sont minces & élevés; & un à étoiles arrondies, dont les bords larges & lamelleux sont séparés par de petits intervalles sur lesquels les lames se prolongent \*.

63. Dix Aftroïtes de diverses grandeurs; sçavoir, deux à larges étoiles arrondies de l'espéce de celles de l'Article précédent; trois à étoiles arrondies, mais plus petites & de l'es-

\* Seba ,pl 112. No. 15, Astroites. péce de l'Article 56; un de l'espèce de l'Article 57; un en forme de poire à étoiles irrégulières, de l'espèce de celles de l'Article 58, mais dont les bords sont plus larges; deux de forme globuleuse un peu tuberculée, à très-petites étoiles, de l'espèce de l'Article 59; & un coupé en différens sens pour faire voir le méchanisme des cellules intérieures.

## GENRE QUATRIÉME.

TUBIPORES.

différe en rien des précédens. On ne les en distingue qu'à cause de leurs petits tuyaux fort saillants, quelquesois bisourchus, ramassés en une masse solide en forme de buisson. Ces tuyaux sont étoilés comme ceux des Astroïtes, mais au lieu d'être joints ensemble par leurs côtés, ils sont isolés en partie & ne sont joints que par leur base. L'animal occupe la même place que dans le Genre précédent.

64. Un très-beau Tubipore de la Méditer-

## SOLIDES OU PIERREUX. 25

rance en forme de buisson, à tuyaux longs, Tubipores bifourchus, isolés, & profondément étoilés: ils s'élevent en tout sens d'un centre commun, qui leur sert de base; ce morceau porte cinq pouces de haut sur six de large, & est grand dans son espèce \*.

engagés en partie dans une concrétion pierreuse, qui leur donne une forme orbiculaire \*. \* Seba, pl. Ces tuyaux sortent plus ou moins de la matière pierreuse qui les enveloppe, & sont plus épars que dans l'espèce précédente dont ils sont une variété.

65 (bis). Un autre aussi des Indes, mais rare, à tuyaux plus gros, plus saillans & à étoiles formées de lames minces, déliées, presque perpendiculaires, & disposées à-peu-près comme dans l'Œillet de Mer.



## GENRE CINQUIÉME.

## MILLEPORES.

MILLE-

drépores, des Aftroïtes & des Tubipores, en ce que dans ceux-ci les étoiles fe présentent d'une manière très-distincte, au lieu que les Millepores n'ont que des trous simples non-étoilés, du moins ils ne le paroissent pas à l'œil. Ces Polypiers ont communément la forme d'arbre ou de buisson, rameux ou feuillus comme les Madrépores : leur superficie est couverte de petits trous quelquesois peu sensibles, même à la loupe, qui pénétrent dans l'intérieur, & servent de retraite aux animaux qui les bâtissent.

66. Un rare & beau Millepore de Curação, à feuilles blanchâtres, larges, minces, étendues & piquées de petits trous ronds; il reffemble à un grand choux qui ne feroit pas pommé, ce qui peut le faire appeller Millepore à feuilles de Choux. L'huître extraordinaire

89. Nº 10,

dont parle Séba \* peut donner une idée des feuil- MILLEles de ce Millepore, que nous n'avons trouvé \* Séba, pl. gravé dans aucun Auteur.

67. Un autre de même espéce, mais à feuilles plus épaisses, moins éparpillées & plus serrées, dont les extrémités ont des plis & replis qui imitent la fraise de veau. Il a quinze pouces de haut sur dix-huit de large.

68. Un beau Millepore de Curação, de même hauteur & largeur que le précédent, à grandes feuilles travaillées à jour, profondément dentelées & frangées dans leurs extrémités.

69. Un autre de même espéce, adhérent à une grosse Cérébrite, qui lui sert de support. Ce groupe magnifique est encore embelli par différentes espéces d'Astroites & de Méandrites naissantes qui font au pied. Il porte quinze pouces de haut sur un pied de large.

70 Un autre Millepore de forme très-agréable, à feuilles aplatties, minces, nombreuses & profondément découpées. Il porte treize pouces de large sur huit de haut, & est monté

sur un pied de bois doré.

71. Deux Variétés de cette espéce, dont une à dentelures plus allongées, plus droites, & en forme de petites mains étendues, qui l'ont fait appeller Digitata; l'autre incruste les branches MILLEFO- d'un Lithophyte porté sur un petit pied de bois marbré.

72. Deux autres Variétés de moyenne grandeur, dont une en éventail, à branches applaties, s'entrelaçant en façon de grillage, & une moins évafée, ayant pour base naturelle un groupe d'Astroues & de Corallines,

73. Un autre de même espéce, mais trèsremarquable, en ce qu'il s'est formé sur une
grosse bouteille, dont il revêt la superficie.
Toutes les branches seuillues de ce Millepore
sont adhérentes au goulot de la bouteille, d'où
elles s'étendent en dissérens sens & forment un
bouquet aussi agréable que curieux. Les Polypes ont étendu leur ouvrage tout autour des
bords du goulot, sans en fermer l'orifice ni
pénétrer en-dedans, comme on s'en est assuré
par une ouverture pratiquée au ventre de la
bouteille pour voir dans l'intérieur. Ce morceau intéressant a été pêché à la Barbade.

74. Un beau Millepore en buisson, à branches moins applaties, dont les extrémités se terminent en rameaux bisourchus, arrondis & pointus. Il porte dix pouces de haut sur quinze de large.

75. Un grand Millepore des Indes, rare &z des mieux conservés, à branches chargées de rameaux nombreux & délicats, diversement contournés, s'entrelaçant les uns dans les au-

#### SOLIDES OU PIERREUX.

res, & formant un buisson des plus épais, MILLEPOd'une figure agréable. Ce morceau a quinze RES. pouces de long sur quatorze de large.

75 (bis). Trois jolis Millepores, dont un à branches courtes & rondes, qui se divisent en plusieurs petits rameaux fourchus & comprimés : un à branches applaties, dont les ramifications se partagent comme le bois de Cerf, ce qui lui en a fait donner le nom \*, & un à bran- \* Marssgl ches arrondies, d'un gris verdâtre, granuleu Mer, pl. 33, fes, chargées de petits rameaux très délicats fig. 160. disposés en forme d'éventail \*.

\* Ibid. fig. 163-



### GENRE SIXIÉME.

RETÉPORES ET ESCARRES PIERREUSES.

Rétépores Ces Polypiers qui approchent beaucoup des Millepores pour la forme de leurs trous, n'en différent que parce qu'ils font à feuilles plates & irrégulières en forme de dentelle, d'écorce ou d'éventail. Leur substance est mince, poreuse & percée ou piquée d'une infinité de trous, dont les uns sont à jour & très-sensibles, les autres le sont moins, & les autres sont à peine visibles. C'est dans ces petites cavités que logent les animalcules.

76. Un beau Rétépore de la Méditerranée d'un blanc rougeâtre nommé Manchettes de Neptune; il est à larges feuilles, minces, & délicates, percées à jour de trous ovales com\* Seba, tom. me de la dentelle \*. Ce morceau, qui a quatre 

7, tab. 191, pouces & demi de haut sur six & demi de large, est rare de cette grandeur.

77. Quatre autres Escarres pierreuses ou frondipores de belle grandeur; sçavoir, une à larges feuilles, dont les bords se joignent ensemble Rétéports irrégulièrement de côté & d'autre, & dont les deux superficies sont composées de cellules ovales \*. Une de même espèce groupée avec de \* Ellis Cogros tubes vermiculaires, diversement entor-rall. pl. 30, tillés sur un gallet, qui leur sert de base, & deux Escarres à plusieurs feuilles couchées les unes sur les autres en forme d'Agaric, dont les petits pores sont à peine visibles, même à la loupe \*.

imperat. hift.

78. Huit petites Escarres, tant Rétépores que nat. p. 600. Frondipores; fçavoir, un Frondipore en façon d'écorce ou de croûte piquée de petits points comme de trous d'aiguille, formant plusieurs couches concentriques fur une branche de Fucus. Un dont les petites branches applaties ressemblent aux Cornes de Daim, & lui en ont fait donner le nom; un de l'espèce des deux premiers de l'article précédent; un à trèspetits pores de l'espéce des deux derniers du même article, mais en forme de bouquet. Trois Rétépores dentelles, dont deux de l'espéce & couleur de celui de l'article 76, & le troisiéme des Indes, d'un très-beau blanc à pores moins ouverts \*. Un Rétépore à larges mailles chargées de petits nœuds granulés, imitant un filet, 100, No. 11. & différent de toutes les espéces précédentes.

" Scha, Fl.

79. Six autres Escarres pierreuses, dont une en forme d'écorce incrustant une grosse épon-

## 32 POLYPIERS.

ge; une de l'espéce de la premiere de l'arti-Rétépores cle 77; deux de celle de l'article 76; & deux à larges mailles, comme la derniere de l'article précédent.

#### GENRE SEPTIÉME.

## MÉANDRITES.

DOLYPIERS qui différent des précéMéANDRIdens en ce qu'ils ne sont ni liss, ni
poreux, ni étoilés, mais prosondément
fillonnés de différentes manières : ils
sont ordinairement de forme orbiculaire avec des amfractuosités sur la surface & aux extrémités qui représentent
des Ondes, des Vermisseaux ou un Cerveau humain, ce qui leur a fait aussi
donner le nom de Cérébrites. L'animal
occupe la superficie comme dans les
Madrépores.

80. Une très-grosse Méandrite d'Amérique de forme orbiculaire, à côtes minces, aiguës, sinueuses, & lamelleuses, laissant des intervalles peu larges, au milieu desquels les lames viennent

viennent aboutir \*. Elle porte dix pouces & Méandriden. de diametre, & adhère à un grand Panache TES. de mer.

81. Une grosse Méandrite, à côtes plus éle- N° · 44 · vées que la précédente, d'une forme très-particuliere. Outre les finuofités qui sont propres à ce genre, elle est encore traversée par de larges amfractuosités très - profondes, qui la font ressembler à un groupe de plusieurs Méandrites posées les unes sur les autres.

82. Deux autres Méandrites à côtes minces dont une a la forme du gros Coco de mer des Maldives qui représente deux fesses. Les côtes dont elle est fillonnée sont garnies de lames dentelées & faillantes. L'autre, qui ressemble au sabot d'un cheval, a les côtes moins lamelleuses & un peu plus épaisses \*.

\* Séba , pl. 112. Nº. 7.

83. Une autre de forme orbiculaire, à côtes plus épaisses que les précédentes, laissant de larges intervalles, chargés de lames dentelées. Son diametre est de sept pouces \*.

\* Gualtieti.

84. Trois autres affez grandes & des espéces ibid. N°. 34. ci-deffus décrites.

85. Six autres, dont quatre de moyenne grandeur & deux petites; sçavoir, une en forme de Priapolite, à bandes larges & applaties dont les contours tortueux forment par intervalles des étoiles \*. Cette variété est rare & curieuse. Une de la Vera-Crux, à côtes minces 112. Nº. 6.

\* Séba ; pls

Tome I.

Méandre & de couleur rougeatre; & quatre de l'espéce de l'Arr. 80, dont les deux petites paroissent être une variété.

86. Une magnifique Méandrite orbiculaire, à bandes très-faillantes, plus larges & d'une Aructure plus serrée que les fillons qui les séparent. Ces bandes ont ceci de particulier, qu'au lieu d'aller en s'étrecissant vers le sommet. comme dans les autres espéces, elles sont creusées en gouttieres, s'étrecissent vers la base & forment comme autant de ruisseaux tortueux dont le lit est plus ou moins large. Cette espéce n'est pas commune, celle que nous citons \* Ibid. tab. de Séba \* en approche; mais les bandes en paroissent plus petites & les interstices plus larges que dans la nôtre, qui a sept pouces de dia-

> 87. Une autre de même espéce, de trois pouces & demi de diamètre.

> 88. Une autre de forme oblongue & de même espéce, à bandes encore plus larges. Elle tient le milieu pour la groffeur entre les deux précédentes.

89. Une belle Méandrite de forme sphéroï-

dale applatie, à côtes épaisses par la base, minces & canelées à leur extrêmité, séparées par \* séba, pl. de profonds & larges fillons lamelleux \*. Elle porte onze pouces de diamètre. Cette espéce a beaucoup de ressemblance, par sa partie in-

TIL. No. 5.

mèrre.

férieure, à l'espéce de Fongipore, appellée Œillet de mer; elle est, comme lui, garnie d'un TES. pédicule, & n'en différe qu'en ce que ses calices se joignent ensemble & forment une seule masse, dont la partie supérieure est sillonnée & ondulée. Nous avons cru pouvoir la ranger dans ce genre avec d'autant plus de fondement qu'elle paroît servir de passage aux véritables Champignons de mer, dont nous parlerons dans le fuivant.

90. Une autre de même espéce, de forme ovoide applatie. Elle différe de la précédente en ce que l'extrêmité de ses côtes, au lieu d'être creusée par un petit fillon, est garnie d'une fuite de petites cellules formées par l'extrêmité des lames qui se joignent. Elle est encore remarquable par un grand trou à bords lamelleux en forme d'Umbilic, placé vers le milieu de sa furface supérieure. Ce beau morceau, qui a neuf pouces & demi de long fur fix & demi de large, est dans une boëte vitrée.

91. Une autre de l'espéce de l'Art. 89, mais

plus petite \*.

ind. test. No.

92. Quatre autres jolies Méandrites qui sont ind des variétés des précédentes; sçavoir, une à côtes minces garnies de lames larges & trèsfines; une à plis groffiers & lamelleux, dont les interslices sont très-prosonds \*; & deux de \* sébà. 1/2 forme ovoïde, à bords élevés & repliés, en

MÉANDRY- forme de festons, dont les jointures sont plus TES. ou moins serrées; & les intervalles des plis gar-

\* Séba, tbid. nis de lames plus ou moins larges \*.

Musæum Richter, tab. 24. Litt. C. N°. 2.

:09. Nº. 6.

## GENRE HUITIÉME.

### FONGIPORES.

pierreuse, comme les précédens. Ce qui les disférencie est leur structure lamelleuse ou feuilletée, & plus ou moins semblable à un Champignon terrestre dont la partie inférieure seroit en-deffus. Les espéces en sont fort nombreuses; les unes sont à lames dentelées, les autres à lames unies. Les Polypes habitent les interstices des lames.

93. Un très-beau Fongipore en bouquet; des Indes Crientales, connu fous le nom d'Œillet de mer. Les Oeillets dont ce pied est garni font de forme irrégulière & plissée, à lames faillantes & pointues, & à petites dentelures \*.

94. Trois autres Fongipores en bouquet; sçavoir, un à Oeillets de forme regulière & arrondie, garnis, tant dans le calice que le long

de la tige, de lames à grandes dentelures \*; un Fongipoà Oeillets plus petits, & à dentelures de lames peu sensibles \*; & un à fleurs, de même forme 109. N°. 2. que celles de l'Art. précédent, mais plus peti- No. 1. tes & très-semblables aux véritables Oeillets.

95. Trois autres Variétés; sçavoir, une à trois plis réguliers, comme les bords d'un chapeau; une à huit plis, comme celle représentée dans Séba \*, mais de forme arrondie & plus \* Ibid. pl. 109. N°. 4. ramassée; & une à un seul calice de forme ovale & comprimée, qui tient à un long pédicule. Cette derniere vient de Curação, les deux aurres font des Indes.

96. Trois autres Oeillets de mer, des Indes, dont un en bouquet de forme un peu sinueuse & fort applatie; un de forme ovale & applatie, à lames très-larges & dentelées, adhérant à un gros fucus qui lui fert de pédicule \*. Le dernier approche du précédent, & tient à un lett. A. Caillou avec quelques Aftroïtes \*.

\* Séba, pl. 110, Nº. 6 ,. \* Ibid. pl.

108. N. . A. 97. Trois Fongipores en bouquet, à branches comprimées, des Variétés déja décrites, l'un à grands Oeillets, l'autre à petits \*, & l'autre de moyenne grandeur.

\* Séba , pla 115, Nº 4.

98. Neuf Variétés intéressantes; sçavoir, 1°. des Caryophilloïdes en bouquet \*. 2°. Six \* Rumphius Caryophilloides détachés, dont un lisse à calice herbar. amb profond, un articulé, trois striés\*, & un à ca- 87, N° 31, 154, N° 48, 1546, N° 48, N° 48, N° 48, N° 48, N° 48, N lice, en partie fermé & en partie ouvert. Tous,

RES.

Fongipo- excepté celui-ci, adhérent à de petites branches de Corail rouge. 3°. Un Fongipore rare, de forme ovale comprimée, dont la circonférence est garnie de lames plus ou moins grandes & non dentelées, chaque interstice des grandes lames en contient trois plus petites & moins saillantes. 4°. Deux petits Boutons étoilés, qui sont l'analogue marin des Porpites. 5°. Deux Oeillers des espéces déia décrites.

> 99. Six gros Oeillets, rapportés en forme de bouquet sur une tige, où ils sont placés d'une maniere fort naturelle. Le pied de la tige est garni d'astroïtes & de glands de mer.

> 100. Un très - rare Fongipore, appellé le Chou de mer. Il est du plus beau blanc, à feuilles papiracées, frisées & dentelées, dont les deux surfaces sont couvertes de lames longitudinales. Ce morceau, qui est d'une beauté singuliere & très-grand dans son espèce, porte cinq pouces de haut sur sept de large.

\* \$6ba , pl. 108 , No. 3 &

101. Un de même espéce, mais plus petit \*. 102. Idem.

103. Le grand Bonnet de Neptune, ou la Mitre Polonoise, de forme arrondie & trèsgracieuse. Sa partie convexe est terminée par un gros tubercule en façon de Bouton, d'où partent, en tout sens, des lames minces fort ferrées, dont les dentelures très-saillantes forment, de distance en distance, de petits Tuber- Fongipocules étoilés, qui le distinguent des autres ef- RES. péces. Sa partie concave est garnie de stries granuleuses & pointues \*. Ce rare morceau a cinq pouces de haut fur huit de large.

nq pouces de haut sur huit de large.

1. 6. tab. 88.

1. 104. Un autre de même espéce, mais plus de l'A.cad. des petit, qui en différe d'ailleurs en ce qu'il n'a Scan. 1700, P. 30, pl. 1. point de bouton à son sommet.

\* Rumphius herbar. Amb.

105. Un beau Champignon de mer, de forme arrondie un peu conique, à lames minces, Inrges, légerement dentelées, partant d'une fente profonde qui est au sommet de la partie convexe, & allant aboutir en droite ligne à la circonférence, où elles se replient pour remonter au fommet de la partie concave. Il est plus grand que celui que nous citons \*.

\* Séba, pl. 111. N. 1.

106. Un autre de même espéce & à peu-près de même forme, mais un peu plus grand. Les lames dentelées y font disposées d'une maniere régulière, & forment, vers le sommet, quelques plis & replis semblables à la fraise de veau.

107. Deux champignons de moyenne grandeur, de forme moins convexe, mais d'ailleurs femblables à ceux des Art. 105 & 106. L'un des deux est de plus remarquable par huit petits Champignons naissants qui adhérent à sa partie concave.

108. Deux autres Champignans de même

BES.

Fongipo- grandeur, dont un a sa partie concave enrichie de huit pet ts Chameignone en forme d'œillets; l'autre ne dissére des précédens qu'en ce qu'il est de forme applatie.

109. Deux Champignons de forme oblongue, à partie supérieure convexe & inférieure applatie. L'un est à lames minces, droites & \* séba, pt. légerement dentelées \*; l'autre en différe par 174 : N° · 29 · fes lames finueuses & entrecoupées qui lui don-

nent un œil chatoyant.

110. Un grand Fongipore de l'espéce des Bonnets de Neptune, de forme ovoïde allongée, très-convexe, à sommet traversé d'un fillon peu profond, à lames dentelées, non continues, mais par boucles irrégulières, imitant affez la toison d'un mouton, & à bords fes-

\* séba, pl. tonnés, un peu comprimés vers le milieu \*; 111, No. 1 il porte 16 pouces de long sur 5 & demi de haut, 5 dans sa plus grande largeur, & 3 dans l'étranglement du milieu.

111. Un autre Fongipore de forme oblongue, moins allongée & moins convexe, appellé la grande limace; ses lames sont, comme dans le précédent, interrompues dans leur direction; mais à écailles plus grandes, légèrement dentelées, & formant à la partie supé-

\* séba, pl. rieure un fillon affez profond \*. Ce morceau EII. Nº. 3 porte un pied de long sur quatre pouçes de large.

112. Un autre de même espéce & de for- Fongipome très-allongée, ayant plus de 11 pouces de RES. long sur 3 de large.

113. Un Fongipore de forme ovoïde allongée, différent des précédens, en ce qu'il est couvert de lames écailleuses très-petites, environnées d'autres plus minces, & plus enfoncées, qui partent de dissérens centres. Il a 9 pouces de long sur 4 de large, & ressemble assez, quand il est sur sa base, à un chien accroupi sur ses quatre pattes, dont la queue seroit repliée en-dessous.

114. Un autre petit de même forme à lames minces, écailleuses, droites, sort serrées les unes contre les autres; on voit sur le milieu du dos un fillon fait en pente, garni de lames radiées \*. Ce joli champignon est con- \* Séba, pl. nu sous le nom de Taupe Marine ou de Che-& pl. 112., nille.

115. Un autre de même espéce, mais courbé de façon qu'il ressemble parfaitement à une groffe chenille pliée en deux, dont la tête & la queue se rapprochent.

116. Un Fongipore, de forme oblongue & fort convexe, différent de tous ceux cidessus décrits, en ce qu'au lieu du sillon plus ou moins profond dont ils sont pourvus. celui-ci est garni de lames à grandes denteluFongiro- res & parallèles qui s'étendent dans toute sa longueur, & se prolongent jusqu'aux bords. Celles des côtés sont disposées comme dans l'espéce de l'art. 105.





# ORDRE SECOND.

### POLIPIERS

DE SUBSTANCE MOLLE OU FLEXIBLE.

## GENRE PREMIER.

FAUX CORAUX.

POLYPIERS qui sont en général d'une substance moins dure que les précédens, quoiqu'il s'en rencontre quelques espéces d'une dureté assez considérable. Nous avons cru devoir comprendre dans ce Genre toutes celles qui ne conviennent à aucuns des Genres cidessus décrits; de ce nombre sont les faux Coraux articulés, dont la substance alternativement dure & flexible paroît fervir de passage du premier au second Ordre. Les Polypiers de ce Genre différent des vrais Coraux en ce

FAUX Co- qu'ils font plus cassants & d'une substance cornée ou moins serrée. Ils différent des Madrépores, Millepores, &c. en ce qu'on n'y voit point de pores ni d'étoiles. Il y en a de beaucoup d'espéces qui sont toutes en forme d'Arbrisseau. mais qui différent en grandeur, en couleur & en dureté. Les Polypes habitent

la superficie des branches & du tronc.

117. Trois faux Coraux, dont un rare; en buisson, à branches fines, arrondies, articulées, blanches, & se divisant en petits rameaux qui partent plusieurs ensemble de la même articulation en forme d'étoiles, & font en s'entrelaçant une masse fort toussue. Les deux autres sont à petits rameaux arrondis, courts, non articulés, & adhèrent chacun à un petit coquillage du genre des Sabots, qui est aussi recouvert de la même substance \* séba, pl. blanchâtre \*. Cette circonstance, jointe au ros. N°. 8. défaut de défaut de pores, de cavités, & d'écorce celluleuse, pourroit faire regarder ce faux Corail comme une véritable concrétion, s'il n'avoit d'ailleurs une organisation aussi réguliere que celle des autres Polypiers.

> 118. Trois variétés de faux Coraux de l'Isle de France, à branches fines, arrondies,

granuleuses, qui ne diffèrent que par leur FAUX Cocouleur, elle est blanche dans l'un, rouge RAUX. dans l'autre, & jonquille dans le troisiéme. Plus, deux faux Coraux blanchâtres, dont un à branches articulées, fourchues, granuleuses, & percées d'une petite cavité à l'extrémité; & un à très-petites branches ramassées ensemble en forme de pelotte, de l'espéce des deux derniers de l'article précédent.

119. Cinq autres faux Coraux de même espéce, formant quatre variétés; scavoir, un blanc - sale tirant un peu sur le lilas, à branches applaties & tuberculeuses, dont les extrémités sont sourchues & comprimées; un blanc-jaunâtre à branches arrondies, noueuses & fort serrées, dont les extrémités finissent en boutons, comme certaines Stalagmites; un à branches nombreuses, fines, granuleuses, bifourchues, de couleur blanche; & les deux autres à branches minces, arrondies, tuberculeuses, qui s'étendent en tout sens, & forment une masse orbiculaire \*.

120. Un très-bel arbrisseau de faux Corail blanc articulé, dont les digitations font d'une substance pierreuse, gris blanchâtre, assez profondément striées, & dont les articulations font presque lisses, petites, & d'une substance \* Seba, pl. cornée, d'un brun noirâtre \*; il porte 13 pou-Gualtieri, inces de haut sur 10 de large.

\* Séba, ibl.1,

Nº. 16.

FAUX CORAUX.

121. Trois petits faux Coraux articulés:
l'un approche de l'espéce précédente, mais il
en diffère par ses articulations qui sont beau\* Seba, pl. coup plus grosses & plus larges \*; l'autre est
numph. herb. le faux Corail rouge articulé \*, & le troisséamb. tom. 6.
tab. 84, litt.

che, à branches fines, déliées, demi transpatohe, à branches fines, déliées, demi transpatohe, no. 1. rentes, dont les articulations, au lieu d'être
ensoncées, sont plus faillantes que le reste;
ce qui peut le faire nommer faux Corail
noueux ougéniculé. Il se termine par un pédicule
applati, & a beaucoup de ressemblance avec

\* 56b2, pl. celui que nous citons \*.



### SECOND GENRE.

KÉRATOPHITES OU LITHOPHITES.

OLYPIERS branchus comme les Kératoprécédens, mais différens en ce qu'ils ou Lithofont d'une substance moins dure, plus PHITES. flexible, & totalement cornée. Leurs rrones & leurs branches font ordinairement revêtus d'une espéce d'écorce celluleuse & friable qui varie beaucoup, soit pour la forme & l'épaisseur, soit pour la couleur. C'est dans les trous de cette écorce que logent les Polypes. Les Kératophites, comme les Coraux, se trouvent attachés à des rochers, à des coquilles ou à d'autres corps durs, auxquels ils adhérent par le moyen d'un pédicule assez large qui leur sert de base.

122. Un très-grand Kératophite des Indes, connu fous le nom impropre de Corail Noir. Il est légèrement strié, & ses principales branches se divisent en un très-grand nombre de petits rameaux flexibles, dont les extrémités sont très-fines, d'un roux noirâtre, & demi-

ou Litho-

Kérato- transparentes \*. Il adhère par un gros & large pédicule à un Madrépore de l'espéce des Méandrites qui lui sert de base. Ce morceau a trois \* Seba , pl. pieds & demi de hauteur.

104. Nº. 2.

123. Un Kératophice ou Corail noir de Malthe, lequel ne diffère du précédent que par ses branches, dont les extrémités, quoique très-déliées, ne sont nullement transparentes; il a près de deux pieds de hauteur.

123. (bis). Cinquitres variétés de Corail noir: l'une est le vrai Corail noir, à rameaux peu nombreux, arrondis, d'une grosseur presque égale dans toute leur longueur, extrêmement lisses & luisans; l'autre est en forme d'éventail à rameaux applatis fort to tueux, légèrement striés, & d'un noir moins foncé. Les trois autres morceaux sont dépourvus de branches, & ne consistent qu'en une tige plus ou moins grosse & tortueuse. Dans l'un, cette tige est de la grosseur du petit doigt, peu courbée, & parsemée de petits points rudes au toucher; l'autre est plus tortueuse, de la grosseur d'une plume à écrire, & comme chagrinée à la surface; l'autre enfin est encore plus fine, & s'étend en spirale comme un tire-bourre. Elleest revêtue d'une écorce blanchâtre & épi-

\* séba, pl. neuse, chargée de petites escarres \* & de rété-\$14 No. 3. pores-dentellés.

> 124. Deux autres Kératophites, dont un brun

brun foncé à branches droites, un peu applaties, d'où partent, à distances é ales & PHITES OU dans une direction presque horisontale, plu-LITHOPHIfieurs petits jets granuleux & pointus, qui lui ont fait donner le nom de Lithophite plume de Mer\*, il a plus de deux pieds de hauteur; \* Séba pl. l'autre brun verdâtre, est à tige ronde, droite, jettant de tous côtés quantité de rameaux courts, roides, déliés, épineux. Il est connu fous le nom de Cyprès Marin \*, & a beaucoup de ressemblance avec les branches d'as-106, 1106, perges.

\* Séba pli

125. Un Kératophite arbrisseau, à branches applaties, revêtues en partie de leur écorce celluleuse qui est d'un beau rouge de Corail. Les parties qui sont dépourvues de cette écorce, ont la couleur & la transparence de l'écaille. Il porte deux pieds de haut.

126. Un Kératophite de la Méditerranée à branches principales chargées de petits rameaux capillaires, revêtues d'une écorce tartareuse d'un rouge pâle, dont les cellules sont très-petites & peu sensibles \*. La substance cornée de ce Lithophite est d'un beau noir:il adhère hist phys. de par sa base à une grande pierre fort pesante, fig. 83. & porte deux pieds de haut sur autant de large.

127. Un autre des Indes à branches droites garnies dans toute leur longueur de jets nom; Tome I.

breux & un peu recourbés; la ressemblance PHITES Ou singuliere qu'il a avec le Romarin lui en a fair Lithophi- donner le nom. Son écorce est d'un gris rougeâtre. Il adhére par sa base à un Astroite, & porte vingt pouces de haut sur seize de large.

> 128. Un autre d'Amérique à branches moins droites, & chargées de jets beaucoup plus longs, qui, par leur flexibilité, forment une efpéce de Panache. La couleur de l'écorce est d'un gris jaunître; il a trois pieds & demi de haut sur vingt pouces de large.

129. Un de même hauteur, mais un peu

moins large.

130. Un très-beau Kératophite à tige garnie de branches alternes, nombreuses, fléxibles, étendues en éventail, revêtues d'une écorce blanchâtre, dont les cellules sont fort saillantes & disposées autour de la tige, & des rejettons en forme de petites grappes à égale distance les Marfigly. unes des autres \*. Ce morceau qui a deux pieds

pl. 20. fig. 94. de haut fur dix-sept pouces de large, est encore remarquable par une vingtaine de petites étoiles de mer, de l'espèce des Scolopendroides qui v sont adhérentes.

> 131. Un Kératophite de Malthe, brun verdâtre, à branches principales, garnies aux extrêmités de petits ameaux capillaires très-flexibles; il est de plus recommandable par deux huitres de l'espèce connue sous le nom d'Hiron

deux pieds sur autant de large.

delle, qui y sont adhérentes. Sa hauteur est de

132. Un autre de Cadix, à tige se subdivi-Lithophifant en un petit nombre de je.s droits & extrêmement longs, revêtus d'une écorce rougeâtie; la substance intérieure de ce Lith. phite est verdâtre. Il a trois pieds & demi de hauteur, & adhere à un rocher chargé de vermiculaires.

133. Trois jolis Kératophites arbrisseaux peu communs; sçavoir, deux à substance intérieure opaque & noire dans les parties les plus groffes, transparente & couleur de corne aux extrêmités des branches qui sont applaties ; ils différent entre eux par l'écorce celluleuse dont ils sont revêtus. Elle est granuleuse & violette dans l'un, jaune ponctuée de pourpse dans l'autre; & un couleur de lilas, de l'espéce de celui de l'article 127, adhérent par sa base à une petite Huitre.

134. Quatre Kératophites; sçavoir, un en éventail, à branches principales se subdivisant en plusieurs rameaux qui montent droit en haut \*. L'écorce tartareuse dont il est revêtu est grisstre sur certaines branches, rouge de plomb lett, a. fur d'autres, épaisse, fistuleuse & verdâtre en quelques endroits. Un à branches tortueuses, couvertes d'une écorce noueuse, rouge pâle \*. Un à écorce brune plus épaisse & à tubercules 106, n°.; plus saillans; & un de l'espéce de celui de

Di

l'article 126, dont les branches sont chargées PHITES OU d'un groupe de vermiculaires, minces & déliés LITHOPHI- comme des fils. TRES

135. Dix petits Kératophites; sçavoir, un à écorce grisatre, épaisse, un peu applatie, hérissée de tubules saillantes & friables. Un à branches chargées de rameaux longs, étroits, applatis, blanchâtres, & semblables aux feuilles de Lavande. Un couleur de lilas de l'efpéce du dernier de l'article 133. Un comme le premier de l'article précédent. Un en forme d'éventail & de couleur poupre, à rameaux plus nombreux, dont plusieurs se réunissent \* Séba, pl. en s'abouchant \*. Un à écorce jonquille, hérissée de tubules. Un à écorce noueuse d'un

lett. B.

rouge pâle, de l'espece du second de l'article précédent. Et trois à branches très-fines, des variétés déjà décrites. 136. Un Kératophite de l'espéce décrite art.

126, adhérent par sa base à une grosse bouteille de terre, sur laquelle il s'est formé.

137. Un Kératophite digité de la grande espece, à branches de la groffeur du doigt, fourchues, couvertes d'une ecorce grisatre fort épaisse, parsemée de tubules peu saillantes. Ce morceau qui vient d'Amérique, porte 17 pouces de haut sur autant de large.

138. Un Kératophite digité d'Amérique, à branches moins groffes, dont les principales se

partagent en deux plus petites, chacune defquelles se divise encore en deux, & celles-ci de PHITES OU même. Il est revêtu d'une ecorce épaisse, rouge TES. & parsemée de pores très-sensibles comme certaines espéces de Madrépores. Il adhere à son rocher avec un Astroite, & porte près de deux pieds de hauteur.

139. Un Kératophite arbrisseau d'Amérique, revêtu d'une ecorce pierreuse, grisatre, ridée, annuleuse; ses branches sont garnies de deux rangs de petits rejettons, courts & disposés en forme d'arrête, qui font probablement, ainsi que l'ecorce, l'ouvrage de Polypes d'un autre genre.Ce morceau porte deux pieds de hauteur.

140. Deux autres Kératophites d'Amérique, dont un en forme d'éventail, à branches trèsnombreuses, grosses & peu flexibles, revêtues d'unc écorce grifâtre, épaisse & parsemée de petits trous; l'autre est en arbrisseau, & a quelquesunes de ses branches couvertes d'une ecorce tartareuse, épaisse & friable, d'un rouge pourpre, ayant tous les caracteres de ce genre de Polypiers: mais les autres branches ont servide retraite à des animaux d'un autre genre qui s'y font attachés, & qui les ont recouvertes, les uns de l'incrustation grisâtre & annuleuse de l'article précédent, les autres d'une incrustation pierreuse du genre des Millepores; cette derniere substance recouvre aussi plusieurs glands

Diii

de mer qui s'étoie et fixés sur ce Lithophite. THITES OU Ces divers accidens le rendent extrêmement LITHOPHI curieux. MES.

141. Six Kératophites d'Amérique en forme d'éventail, dont trois revêtus d'une écorce brune, mais avec ces différences que dans l'un cette écorce est parsemée de petites tubules qui ne d'hordent point la superficie; dans l'autre ces tubules sont saillantes & très-nombreuses \*;

Sc. an. 1700, P. 34 Pl. 2.

l'Académ. des elles sont aussi saillantes, mais plus grosses & plus éparfes dans le troisiéme. Un à ecorce griscendré, applatie, & à pores peu faillans. Un à ecorce de même couleur, mais arrondie & parsemée de pores a lez larges. \* Et un de l'espéce

\* Ibid. pl. 3. de celui de l'article 139.

> 142. Deux grands Kératophites d'Amérique, dont un digité de l'ef, éce de celvi de l'art. 138, adhérent à un rocher formé de concrétions marines qui lui sert de support. L'autre eft de l'espèce du quatriéme de l'article précédent.

> 143. Un magnifique Panache de mer d'Amérique, se partageant dès la racine en plusieurs rameaux anguleux, chargés d'un g and nombre d'autres, dont les extrêmités s'entrelacent

\* Marfigly, en forme de rets \*. I est couvert d'une ecorce al. 19, fig 86. ouleur de li'as, ainsi que les petits rejettons qui y adhérent, & porte trois pieds de haut sur autant de large.

#### MOUX OU FLEXIBLES.

55 144. Un Kératophite à branches reticulées, Kératoqui ne differe du précédent que par son ecorce PHITES OU qui est de couleur jaune. Il a quarante pouces de haut sur plus de deux pieds de large.

145. Deux autres Kératophites à panache. dont un est totalement incrusté d'une matiere grisatre & pierreuse, de l'espéce de celle de l'article 139, ce qui le rend fort pésant; l'autre est de l'espèce de l'article précédent. & adhére à une concrétion pierreuse.



fig.

### TROISIEME ET QUATRIEME GENRE.

CORALLINES ET ESCARES MOLLES.

OLYPIERS, d'une substance ou cornée ou crustacée, ou pierreuse, qui ont la MES. forme de plantes, & qui sont composés de plusieurs branches minces, subdivisées en fines ramifications, comme quelques espéces de mousses, ce qui les avoit fait ranger dans cette classe par les Botanistes, avant les découvertes de M. Ellis. Cet habile Observateur les distingue en vésiculeuses, en tubuleuses, en celluleuses & en articulées \*. Comme son de Phitt. nat. ouvrage est entre les mains de tout le &c. la Haye monde, nous ne dirons rien ici des caractéres spécifiques qui différencient ces Polypiers, ni des animaux qui les

146. Deux belles Corallines vésiculeuses ; \* Ellis, pl. l'une est la Queue d'Ecureuil \* adhérente à un 2, n°. 4, let. manche de couteau bivalve : trois des princi-\* Fllis, pl. paux jets de cette Coralline, ont plus d'un \* Fllis, pl. pied de hauteur. L'autre est le Cheveu de mer \*

habirent.

MOUX OU FLEXIBLES.

tadhérent à une moule aussi bivalve. Plus le CORALLImême sur un gros sucus.

147. Cinq Corallines vésiculeuses; sçavoir, le Tamuis de mer 1, le Sapin de mer 2, adhé- 1 Ellis, pl. 1 rent à une coquille, l'Antenne d'Ecrevisse 3, 2 Ibid. pl. la Queue d'Ecureuis sur une moitié de coquille, 1 no. 2: de la Cheveu de mer sur une moule.

148. Douze jolies Corallines, dont sept vésiculeuses qui sont l'Antenne d'Ecrevisse ou barbe de mer, des deux variétés décrites dans Ellis 4. 9 , nº. 14 # Le Cheveu de mer, adhérent à un fucus. Le Cy-let. a. & b. près de mer 5. La Coralline à lentes 6. La Co-5 Ibid. pl. 32 nº. 5, let. a. ralline à cosses environnant un fucus 7, & la 61bid. pl. 152 Queue d'Ecureuil. Deux Corallines tubuleuf. s; no. 24, b. 7 lbid. pl. 7; sçavoir une à petites ramifications 8; & une du n°. 12. b. 8 Ellis , pl. Cap de Bonne Espérance, ridée comme la 16, fig. a. Trachée-artere formant un faisceau de petits 9 Ellis Ibid: tubes paralleles & foit ferrés?. Trois Corallines fig. b. celluleuses adhérentes à des sucus; sçavoir, la 20, 10° 3, b. Rampante 10, la Coralline à cils 11, & la Co- 20, nº, 5. d. ralline à touffe couleur d'yvoire 12; plus trois 21, nº . 6. a Escares molles, qui sont l'Escare à seuilles étroites 13, celle à feuilles larges 14, & l'Escare mille-28, fig. a. pore spongieuse & irréguliere, dont les ouver-29, nº. 2. a. tures sont garnies de poils 15. 15 Ellis pl

 CORALLI - commune à extrémités terminées en bouton : la Coralline à têtes en forme de lance & à articu-

: Ibid. pl. 24, lat ons plattes 1: la Coralline rouge semblable n°.4.c. \* Ibid. fig. e. à der cheveux 2 : la blanche à articulations dé-3 Ibid. fig. d. lices 3: la Coralline à branches arrondies, dont

les extrêmités s'applatissent & se contourner à la derniere articulation : la Coralline à branches applaties, rameules & mobiles de la grande espéce : la Coralline à seuilles très-applaties, rondes au sommet : la blanche à

4 Ibid. pl. feuilles atticulées de la Jamaique 4, & une 45 , fig. b. très - rare à longue tige, ornée à l'un des bouts d'une houpe de filamens articulés, trèsdéliés, semblables à un pinceau. C'est le vrait pinceau de mer.

150. Les deux espéces d'Acétabule, décrites dans Tournefort & Bauhin. L'un est le grand Acétabule de mer, formant un groupe de six pouces de haut sur autant de large, adhérent Tournesott, à une pierre s. L'autre est de la petite espèce & achere à une valve de coquille du genre des cœurs. Il n'est pas bien décidé que cette production singuliere soit un Polypier. M. Donati dont l'autorité est d'un grand poids en cette

Donati, matiere, la range dans les plantes marines 64 pl. 3 , fig. I.

. pl. 3;8.



## GENRE CINQUIEME.

EPONGES.

& élastique, composés de plusieurs fibres qui s'entrelaçant les unes dans les autres, s'unissent & forment une espece de rézeau percé de tubes plus ou moins larges & prosonds; ces tubes paroissent remplis d'une substance molle & blanchâtre, & il résulte de leurs diverses inslexions, un grand nombre de variétés dans les éponges. Les cavités dont elles sont remplies, sont probablement l'ouvrage & la demeure d'une certaine classe d'animal-cules encore peu connus.

151. Deux très-grandes Eponges fines, de l'espéce commune, l'une en forme de manchon & l'autre en chapeau rabattu, nommées le Manchon & le Chapeau de Neptune.

152. Quatre autres de la même espéce, remarquables par leurs formes singulieres, nomEPONGES.

mées l'Eventail, le Turban, la Calotte, &

153. Onze Eponges fines de formes trèsvariées, de l'espéce des précédentes, & l'Eponge des Frotteurs.

154. Deux Eponges d'Amérique, dont une de forme longue comprimée, à côtés garnis de petits trous, à partie supérieure percée d'une suite de trous larges & prosonds, rangés sur une même ligne, qui sui ont fait donner le nom de Flutte de Pan, elle a seize pouces de de long; l'autre est rameuse & digitée, à seuilles applaties, & adhere à une belle moule Magellanique de l'espèce chatoyante.

155. Deux Eponges rameuses, à branches nombreuses de substance friable, qui dans l'une sont étendues en éventail, comme certains lithophites, & ramassées en forme de gerbe dans l'autre. La premiere porte vingtsix pouces de haut, & la seconde vingt-deux.

156. Quatre Eponges rameules, dont trois de substance molle & sléxible, plus ou moins 4 seta, pl. fines & serrées\*, & une de l'espece décrite dans 27, n°.5, 6 l'article précédent.

157. Une Eponge en forme de colomne, à fibres rudes & serrées, à circonférence parsemée de grandes cavirés irrégulieres, & à sommet percé d'une large ouverture cylindrique, qui pénétre juiqu'à la base. Elle est de couleur rousse.

T58. Trois Eponges en colomnes; sçavoir, Eronges, tine à tissu fin peu serré, uniforme dans toute sa longueur, sans autre grande cavité que celle qui la traverse d'un bout à l'autre \*; une de la \*\$5ba; plu grosseur du doigt, un peu applatie, qui au lieu d'être percée dans sa longueur d'une seule cavité comme la précédente, l'est transversalement de deux rangées de trous opposés, qui se suivent à distances égales; elle paroît être une variété de la flutte de Pan; la troisséme est de l'espèce de celle de l'article précédent; mais elle a deux cylindres joints par les côtés.

159. Une autre Eponge en colomne pyramidale, de couleur brune, nommée le Cierge, elle differe des précédentes, en ce que ses fibres sont plus serrées, & qu'elle est comme crevassée dans tout son pourtour. Ce beau morceau

a 26 pouces de haut.

160. Une autre de même forme, mais à tissue encore plus serré & plus compacte, brun-noirâtre & à superficie hérissée de tubercules. Elle est sur-tout remarquable par sa hauteur qui est de 41 pouces.

161. Une Eponge de même espéce, mais dissérente pour la forme. C'est un groupe de cinq gros tuyaux, placés l'un près de l'autre, comme des tuyaux d'orgue; il a 22 pouces de haut.

162. Trois Eponges en colomne des variétés

Eronges.

déjà décrites. L'une est à deux tuyaux, de même tissu que la premiere de l'article 1585 l'autre à quatre tuyaux, de même spéce que celle de l'article 160. La troisième réunit sur un seul tube le tissu ompacte & seiré, & le tissu mince & lâche de ces deux espéces.

163. Une grande Eponge, nommée le Bonnet de Neptune, sa partie convexe est tuberculeuse & à larges canelures, & sa partie concave tapissée de sibres longitudinales qui vont du sommet à la circonsérence, d'une maniere fort réguliere.

164. Trois jolies Eponges de formes singulieres. L'une applatie, d'un tisu fort serré garni de pointes, ressemble exactement à une Mêtre d'Evêque. L'autre d'un tissu plus lâche, aussi hérissé de pointes, n'imite pas moins bien une Crosse; la troisième, d'un tissu semblable à la mie de pain, est de forme ovale comprimée, & s'appelle le Gobelet de Neptune.

165. Deux Eponges de même espéce que la premiere de l'article précédent, dont une semblable aux seuilles de l'Opuntia, adhérente à un Astroite qui lui sert de base; l'autre composée de quatre tubes un peu applatis, d'un tissu peu serré, & parsemés de tubules arrondies.

166. Une autre de même espèce, mais digitée, sa forme lui peut saire donner le nom de Gand de Neptune; elle adhere par sa base à un faux Corail & à un petit Kératophite.

167. Deux Eponges, don: une rare en forme de cornet, appellée Trompette de mer. Le tiffu en est mince & fragile, & remarquable par quantité de petits trous cylindriques, dont la cavité & les bords extéreurs sont revêtus d'u e croute pigrreuse, firiée & étoilée, qui en bouche quelquefois l'ouverture. L'autre Epo; ge est à peu près de même forme, mais de texture plus solide, & privée des cellules pierreuses qu'on remarque en la précédente.

168. Sept petites Eponges, dont une à feuilles minces & découpées, en forme d'Agaric; une rameuse à tubes noueux & tuberculeux, d'un tissu très-sin & trè-serré; une en sorme d'entonnoir un peu comprimé; une en crosse; une en bouquet, imitant la fleur de Jacinthe; & deux à tubes cylindriques, des espéces déjà décrites.

169. Deux Eponges rares, l'une appellée la Morille, à cause de sa ressemblance parfaire avec ce végétal. Elle adhere à un faux Corail. L'autre de forme orbiculaire, peut être nommée l'Eponge oursin. Les pointes dont elle est hérissée, & qui la traversent de part en part. sont liées les unes aux autres par des fils épers. minces & déliés comme de la toile d'araignée.

170. Trois Eponges, dont une peu com-

Eponges, mune, en forme de buisson à petites seuilles nombreules découpées & frisées, portées sur un rocher qui leur sert de base, & deux de l'espéce de celles de l'article précédent, dont une est la Morille à feuilles plus petites, plus

\* Mem. du nombreuses & plus comprimées \*. L'autre a les fur l'hist. nat. pointes entierement engagées dans ces fibres gl. 24, let. E. éparses, que nous avons dit ressembler à la toile d'araignée.

171. Une très-rare & magnifique Eponge rameuse, de couleur brune-obscure, dont les branches rondes vers la tige, s'élargissent & s'applatissent en s'élevant, & prennent la figure de cornes de Daim, elles sont entierement couvertes de petites feuilles drues, plissées & comprimées, d'un tissu ferme, serré, peu slexible. Ses branches les plus larges sont reticulées à peu près comme le Lithophite éventail. Elle porte vingt-un pouces de haut sur un pied de large.

172. Neuf Eponges de différentes espéces; sçavoir, une Eponge agaric, à feuilles blanches, nombreuses, frisées, comprimées, percées çà & là de cellules arrondies & tuberculeuses en forme de verrues, dont la cavité intérieure est incrustée d'une substance friable & crétacée. Trois semblables à la mie de pain, de substance friable & comme vermoulue; l'une de forme applatie, comme un morceau de

liége.

liége, les deux autres de forme irréguliere. EPONGES.

Une globuleuse, percée de larges cavités cylindriques & irrégulieres, rangées para lelement comme dans les Afroites. Deux minces
& plattes, dont le tissu roide, quoique lâche &
peu serré, forme des cellules à réseau, fort
nombreuses & jointes les unes aux autres,
comme celles des mouches à miel. Une à rameaux arrondis, entrelacés les uns dans les
autres, comme un groupe de tuyaux vermiculaires. Il est d'autant plus aise d'en faire la
comparaison, qu'on voit plusieurs de ces derniers qui y adhérent; & une mince & platte,
plissée comme une fraise de veau.

173. Seize petites Eponges de formes trèsvariées. Sçavoir, deux digitées, l'une grise &
l'autre brune, à rameaux creux & cylindriques, percés de trous plus ou moins larges. Une
rameuse, grise, qui paroît êtré une variété de celle
décrite àrticle 171. Six variétés d'Eponges rameuses, à branches applatties, l'une à feuilles
larges, velues, prosondément découpées; l'autre à
feuilles étroites & allongées; l'autre à
feuilles frisées; l'autre à petites branches rondes applatties & bisourchues; l'autre à feuilles d'Agaric, repliées les unes sur les autres;
& l'autre à feuilles terminées en bouton tubuleux. Une à branches arrondies \*. Une sembla-

\* Séba, pl;

ble, dont les extrêmités s'applattissent en forme de main. Une applattie comme la feuille de l'Opuntia. Une à fibres droites & isolées. Une cannelée; & deux globuleuses.

## GENRE SIXIÉME.

### ALCYONS.

ALCYONS.

M. Ellis, paroissent principalement destinés à servir de nids & de matrices à des animaux de mer. Les Alcyons varient beaucoup dans leur forme & dans leur substance; celle-ci est spongieuse dans quelques espéces & charnue dans d'autres. Ils ont aussi dissérentes sortes d'enveloppes, les uns ont une peau graveleuse, elle est calleuse, coriace ou friable dans les autres.

174. Le grand Guepier de mer. Cet Alcyon en forme de ruche, est d'une substance dure & cartonneuse, de couleur rougeâtre, percée çà & là d'un grand nombre de petits trous. Au sommet est une large ouverture en cône

175. Huit Alcyons; sçavoir, un en forme de

renversé, qui laisse voir les compartimens celluleux dont l'intérieur est garni. Ce morceau ALCYONS. curieux a dix pouces de haut sur huit de large.

Poire de substance lisse & friable, d'un rouge de brique \*. Son extrêmité est percée d'une cavité profonde & conique, qui laisse appercevoir les bist de la mer, cellules intérieures. Un de même espéce, de pl. 16, fig. 79 couleur grise, adhérant à un groupe d'autres Alcyons en forme de Figue, revêtus d'une écorce rude & épineuse, & troués au sommet. Un de l'espèce du premier de cet article, ressemblant à des figues jointes par les côtés. & se terminant en une seule queue. Un de forme globuleuse, d'où partent en tous sens des tubes creux & spongieux, & quatre de forme plus ou moins ronde, à tissu spongieux, celluleux & peu flexible; parmi ces derniers, trois adhérent à des corallines & à des fucus.

176. Trois Alcyons branchus peu communs, en forme de cornes de Daim. La substance de l'un est spongieuse, friable, percée de distance en distance de trous arrondis qui laissent voir les cellules intérieures ; celle de l'autre est coriace, dure & semée de cavités peu profondes. Dans le troisiéme, elle est membraneuse, celluleuse & épineuse.

177. Quatre Alcyons de l'espéce du premier de l'article précédent ; dont un singulierement

95. nº. 8.

contourné. Deux Agarics, de substance spongieuse & friable, semée de petites cavités intérieurement celluleuses; & une autre variété d'Agaric, revêtue d'une écorce cartonneuse, percée en sept à huit endroits de trous comme les précédens, mais beaucoup plus larges.

178. Deux Alcyons, l'un desquels est une grosse masse songueuse & tuberculeuse en for-\* Sébapl. 96 me d'Agaric \*, dont l'écorce est de même consistance que celle du dernier de l'article précédent ; l'autre est en forme de coupe lovale, à bords un peu comprimés, de substance dure, coriace, ridée & de couleur brune.

tonneuse; scavoir, un à feuilles larges & frisées, dont les plus grands rameaux tiennent ensemble à l'aide d'un tissu mince & membraneux; elles sont flexibles, un peu élastiques, \* séba pl. & femblables à des feuilles désséchées \*. Un à feuilles plus étroites, épineuses & semblables à celles du chardon, ce qui l'a fait nommer Chardon de mer. Le troisième est une feuille large & spongieuse, qui recouvre totalement les branches d'un petit fucus, excepté les ex-

179. Trois jolis Alcyons de substance car-

180. Quatre Alcyons différens; sçavoir, un rare des Indes, à branches rondes en forme de corail, de substance assez dure, spongieuse,

trêmités qui fortent en façon de frange.

friable, non élastique. Un d'Amérique, dont la substance est une espèce de peau calleuse & savonneuse, couverte de tubercules en sorme de verrues trouées dans le milieu, laquelle enveloppe une concrétion de mer. Le troinéme est une masse assez informe, roide, membraneuse, celluleuse & piquante, de couleur brune tirant sur le noir \*. Et un qui approche assez \* séba, ibid. du précédent, mais d'une substance plus spon-pl. 95, n°. 3gieuse & néanmoins plus compacte.

181. Treize petits Alcyons, dont un en masse arrondie, se partageant en plusieurs petites tiges velues & pointues, de substance friable & spongieuse \*. Un en sorme de vesse de \* Imperation lib. 27. Cap. 2 loup; un dans la cavité duquel est logé Bernard fig. 6. l'Hermite; un en forme de petit chapeau; les

autres sont des espéces déjà décrites.

182. Huit espéces dissérentes d'Ovaires ou Matrices de coquillages, dont quelques-unes portent le nom vulgaire de Savonettes de mer-Scavoir, 1°. une d'Amérique, composée de petites vessies jaunes, rondes, applaties, jointes ensemble en une de masse irréguliere, & adhérentes à une branche de Madrepore; ce sont les matrices des Pourpres communes. 2°. Une de même espéce venant de nos mers; elle est en masse arrondie \* 3°. Une \*Ellis Corat. à vessies en forme d'entonnoir, dont les bords sont festonnés; ce sont des matrices de Buc-

cins de la Jamaique. 4°. Des matrices de bucALCYONS.

\* Ellis, pl.
33. fig. a. & tubes droits, dont le fommet est rouge de corail,
Liter, pl. 878

& \$279.

cins de Virginie \*. 5°. Autres en forme de petits
tubes droits, dont le fommet est rouge de corail,
liter, pl. 878

ils adhérent à un buccin. 6°. Deux à vessies
noires triangulaires & à tête applatie. Et trois
autres variétés de matrices, des Indes oriens
tales.





#### SECONDE PARTIE.

# Coquilles ou Testacées.

PRVANT d'entrer dans l'énumération des Coquilles que nous possédons, Coquilles. nous croyons devoir dire un mot de l'ordre que nous suivrons dans leur distribution, & donner quelques notices préliminaires & succinctes qui puissent rendre ce Catalogue utile, par l'ordre que nous tâcherons d'y observer.

Nous avons présenté dans la premiere Partie les habitations pierreufes \* ou ligneuses des plus petits Ani- \* Les Polymaux connus dont les Mers soient peuplées; nous avons compris dans la même Classe les productions d'Animaux encore inconnus, telles que les Eponges, &c. & enfin celles qui paroissent destinées à servir de nid & de matrices à certains Coquillages de Mer : ce qui

nous mene, par une gradation presque Coquillages insensible, à traiter des Coquillages mêmes : ce sera le sujet de cette seconde Partie.

> On distingue primitivement trois fortes de Coquilles, celles de Mer, celles d'Eau-douce, & celles de Terre. Nous en ferons trois Sections; dans la premiere nous rangerons les Coquilles Marines, dans la seconde les Fluviatiles, & les Terrestres dans la troisième,

> Les Coquilles Marines se trouveront ici divisées, à l'exemple de la plûpart des Auteurs qui en ont traité, en trois Classes:

> > Les Univalves. Les Bivalves. Les Mutivalves.

Nous sous-diviserons encore, conformément à la méthode la plus suivie, chaque classe en un certain nombre de familles, chaque famille en genres, chaque genre en espèces, & celles-

Coquilles

Mais il est bon de prévenir que, ne s'agissant ici que de Coquilles où ne se trouvent plus les Animaux auxquels elles ont été propres; ces divisions ne pourront être les mêmes qu'elles auroient été, si elles avoient dû se rapporter aux Coquillages entiers, comprenant à la fois l'Animal & la Coquille, telles qu'on en trouve de trèsheureuses & detrès-justes dans l'histoire des Coquillages du Sénégal, par M. Adanson, de l'Académie Royale des Sciences.

On a cru d'ailleurs ne devoir point négliger de joindre aux descriptions de chaque espéce ou variété de Coquilles, les noms tirés presque toujours de quelque ressemblance frappante, & sous lesquels elles sont le plus connues, sussentils même du nombre de ceux dits vulgairement de guerre, ou qui ne sont en usage que chez quelques Amateurs ou chez les Marchands.

On a de plus placé dans quelques Soquilles, à titre de Coquilles improprement dites, des fourreaux ou habitations d'Animaux, formées d'un grand nombre de fragmens de diverses Coquilles, joints à des brins de bois, à de gros sable, &c. sur-tout lorsque ces Coquilles se sont trouvées à peu-près semblables pour la forme, à celles de ces familles.

Quant aux Coquilles Fluviatiles & Terrestres, comme nous ne connoisfons des premieres que de deux sortes générales, les Univalves & les Bivalves; & des secondes que d'une sorte seulement, sçavoir les Univalves; & que d'ailleurs les familles en sont analogues à celles des précédentes, & en même-tems moins nombreuses: nous ne décrirons la collection, assez variée cependant, que nous avons des lunes & des autres, que par forme d'autant d'appendices, qui feront la seconde & la troisiéme Section.

# SECTION PREMIERE.

#### \_

# Coquilles de Mer.

#### CLASSE PREMIERE.

UNIVALVES.

Nous rangerons dans cette Classe toutes les Coquilles où l'on ne remarque pour l'ordinaire qu'une seule piéce. Nous disons pour l'ordinaire, parce que plusieurs de ces Coquilles en ont deux lorsqu'elles sont habitées par l'Animal: mais il n'y en a qu'une qui retienne proprement le nom de Coquille, l'autre est connue sous le nom d'Opercule.

Ces Opercules se trouvent rarement dans les Cabinets avec les Coquilles auxquelles ils appartiennent, & les samilles & genres de ces Coquilles n'étant pas même assez bien déterminés par opposition aux autres, nous n'avons point jugé devoir, comme ont fair quelques Auteurs, très estimables d'ail-

UNIVAL.

# 76 COQUILLES UNIVALVES

Univales, tirer la division générale des Univalves, ou même certaines de leurs divisions ultérieures, des caractéres de n'être point, ou d'être en effet operculés.

Nous avons donc préféré de puiser ces diverses divisions dans la forme générale des Coquilles, & ce sera de caractères moins apparens que dériveront les disférences des genres, des espéces & des variétés. Les Coquilles Univalves peuvent être partagées en douze familles, qui sont:

- 1. Les Lépas ou Patelles.
- 2. Les Oreilles de Mer.
- 3. Les Tuyaux vermiculaires.
- 4. Les Nautiles.
- 5. Les Limaçons.
- 6. Les Buccins.
- 7. Les Rochers.
- 8. Les Pourpres.
- 9. Les Tonnes.
- 10. Les Vis.
- 11. Les Volutes.
- 12. Les Porcelaines.

#### PREMIERE FAMILLE.

### LÉPAS OU PATELLES.

Ce sont des Coquilles ouvertes, évasées, non contournées, de la figure Lis Le pass,
d'un cône tronqué, qui s'attachent aux
rochers ou à quelqu'autre corps dur.
Elles sont ou entieres, ou percées, ou
chambrées, ou à appendice intérieur;
& c'est delà que nous tirerons leur division en quatre genres, qui sont:

- 1°. Les Lépas à Coquille simple &
- 2°. Les Lépas à Coquille percée endessus.
  - 3°. Les Lépas à Coquille chambrée.
- 4°. Les Lépas à Appendice en demi-



#### GENRE PREMIER.

# LÉPAS A COQUILLE SIMPLE ET ENTIERE:

- I. FAM.
- 1. N Lépas des Indes, tèrs-rare, blanc, de Les Lépas, forme presque ronde & applatie, creusé endessus de silons ondés concentriques, & endedans de stries fines qui s'étendent du centre à la circonférence. Le bouton du sommet est jonquille, le milieu de l'intérieur est jaune. Ce Lépas qu'on pourroit nommer Parasol Chinois, porte trois pouces deux lignes sur trois pouces quatre lignes de diamétre.
  - 2. Le même, avec cette seule différence. que le milieu du dedans est fauve tirant sur le gris de lin.
  - 3. Un Lépas des Indes, rare, à tête située vers les deux tiers de la longueur, à stries longitudinales, à base ovale, & de l'espéce nommée Bouclier imitant l'Ecaille de Tortue \*; il est marbré en-dessus, & nacré en-dessous.

\* Argenv. Pl. 2. lett. P.

- 4. Un Bouclier semblable, un peu plus grand, dépouillé, & dont les stries ont disparu. Ses couleurs ont un grand éclat.
- 5. Un autre dépouillé & sans stries, moins grand, & de marbrure plus chargée que le pré-

\* Lift. tab. cédent \*.

\$31 no. 9.

6. Un très-beau Bouclier à onze bandes lon-

gitudinales, de forme un peu moins élevée que les précédens, sa tête est blanche & I. FAM.
LES LÉPAS. nacrée \*. Il porte trois pouces, sur deux pou- \* Rumph. ces six lignes de diamétre.

7. Un autre moins grand de l'espéce du pré-

cédent, mais dépouillé.

- 8. Un grand Lépas Magellanique, papyracé à stries longitudinales peu élevées. La tête, le bord de la base, & une zône intermédiaire font flambés de lie de vin sur un fond blanc, l'intérieur est nacré.
- 9. Six Lépas de l'espéce de celui de l'article précédent, mais moins grands, de fonds & de marbrure variés.
- 10. Sept Lépas de moyenne grandeur, sçavoir, un blanc tacheté, de forme un peu applatie, à stries longitudinales serrées & granuleuses; un à tête élevée placée près de son milieu, & de forme presque conique, à stries longitudinales bien marquées. Deux Lépas coniques jaunes, l'un dans l'état naturel à tête plus obtule, & l'autre poli. Deux de l'espéce de l'article précédent, & un Bouclier imitant l'Ecaille de Tortue.
- 11. Deux très-grands Lépas Magellaniques en pendant, de forme oblongue, à tête fort élevée & chatoyante, à grosses stries ou côtes longitudinales rabotteules, de couleur brune moirée en-dessus, nacrée en-dedans,

I. FAM. LES LÉPAS.

- 12. Deux autres de forme plus applatie.
- 13. Deux autres de l'espéce de ceux de l'article onze; à cela près, qu'ils son blancs nués de marron; les sommets sont comme dans les précédens.
- 14. Deux grands Lépas rares Magellaniques, à côtes affez larges & peu saillantes, brun-foncé en dessus, nacrés en-dedans, à tête élevée, de forme à peu-près conique, & nommés en Hollande Entonnoirs.
- 15. Deux autres qui ne différent des précédents qu'en ce que les cannelures de l'un font blanches, & qu'on remarque aussi un peu de blanc dans le haut & le bas des cannelures de l'autre.
- 16. Cinq Lépas de moyenne grandeur & fort jolis; sçavoir, un rare à stries blanches & cannelures amaranthe-clair, chargées de petits grains très-sins; un autre rare encore à stries sines & serrées, à peine sensibles, rassemblées en plusi-urs faisceaux alternativement blanc & cerise; deux sond blanc nué de bleu, naciés en-dedans, & un Entonnoir de l'espèce du premier des précédens.
- 17. Trois Lépas rares, sçavoir, un grand blanc, nué de violet vers le haut, & de verd dans le bas, à côtes longitudinales nombreufes, & nacré tant en-dedans qu'en dehors; un de l'espèce du premier de l'article précédent,

mais

inais plus grand; & un autre un peu plus grand, nué & marbré de fauve roux, à côtes peu éle- I. FAM. vées, & nacré tant en-dessus qu'en dessous:

18. Sept Lépas de moyenne grandeur ; scavoir, un à stries & cannelures longitudinales, granuleuses & à tête élevée, bariolé de noiràtre, de fauve & de blanc \*. Un à groffes \* Arg. pl. s côtes longitudinales, laissant entr'elles de pro-lett. H. fondes cannelures, nué de marron clair sur un fond blanc, à tête blanche & de forme applatie. Un à stries larges & peu élevées, fond brun avec une zône blanche, nacré par-tout. Un à seize côtes longitudinales, marron, & autant de cannelures verdâtres. Deux semblables au premier de l'article précédent; à cela près, que les cannelures en sont couleur de rose, & qu'ils sont plus applatis, & un de même espéce nué de gris-de-lin.

19. Six Lépas, sçavoir, deux à peu-près semblables aux deux premiers de l'article précédent. Un semblable au premier de l'articlé 16 ; un granuleux bariolé d'orangé & de blanc; un semblable au quatriéme de l'article précédent, mais plus grand; & un grand Lépas Magellanique mince, à côtes peu élevées, ondées & irrégulieres marron, sur un fond blanc & nacré:

20. Deux grands & beaux Lépas de forme un peu applatie; l'un à côtes longitudinales Tome I.

grandes & petites, alternatives, & débordant I. FAM. la base en sorme de rayons; il est panaché en LES LEPAS. zigzag de blanc, de jaune clair & de brun, & a le sommet noir; on le nomme Œil de \*Arg. pl. 2. rubis radié \*, l'autre est à stries blanches &

tab. 534. fig. cannelures couleur de rose. 23.

21. Deux semblables, à cette différence près, que l'Œil de Rubis est à stries moins élevées, moins radiées, & à zigzags plus marqués; & que l'autre Lépas est ici plus grand, plus oblong, & nué seulement de couleur de rofe.

22. Trois Lépas, sçavoir, deux fauves à ffries légeres & nombreuses, de forme oblongue, à côtés comprimés, ressemblants par-là à \* List. tab. des bateaux, & nommés en effet de la sorte \*, & un œil de Rubis semblable à celui de l'arti-

cle précédent.

\$41. fig. 25.

23. Trois grands Lépas, l'un à côtes grandes & petites, alternatives, débordant la base, de sorme applatie, à tête marbrée de blanc & de fauve, brun dans le reste, & nommé Œit \* Arg. pl. de Bouc radié \*; l'autre poli, de forme un peu a. lett. B. élevée, arrondie vers le haut, à tête & bords brun-foncé, blanc-nacré dans l'intervalle; & un blanc du Brésil, marbré de fauve-roux, à groffes côtes, chargées de stries inégales, onduleuses & rabotteuses, & à base dentelée.

24. Trois autres, sçavoir, un Œil de Rubis,

un Œil de Bouc; & un comme le dernier de l'article précédent, mais moins grand.

LES LEPAS

25. Quatre grands Lépas, içavoir; deux blancs à stries longitudinales, faillantes en vive arrête & dentelées, débordant la base; un blanc un peu orangé, à tête élevée, & à stries fines; & un semblable, à stries plus larges, chargé de Glands de Mer.

26. Sept Lépas, sçavoir, un grand, blanc nué de fauve, de forme applatie, à larges côtes peu élevées & à stries fines & serrées \*; un à stries longitudinales, bariolé \* Gual. Ind. de zônes fauves, blanches & noires; un semblable aux deux premiers de l'article précédent, mais moins grand; un à tête plus élevée & à stries non dentelées. Un granuleux semblable au premier de l'article 18, & deux de l'espèce nommée Œil de Rubis.

27. Trois très-grands Lépas, sçavoir, un d'Amérique, à stries inégales & rabotteuses. marbré de blanc, de fauve & de gris-verdâtre. Un de la Méditerranée à stries saillantes, rabotteuses & débordant un peu la base, marbré par zônes de marron, & de blanc; & le troisiéme dépouillé, d'un beau blanc, à tête élevée & pointue.

28. Huit grands Lépas, sçavoir, un blanc à stries inégales, revêtu de son épiderme. Un autre dépouillé paroissant de même espèce, T. FAM.
LES LEPAS. grosses stries long tudinales débordant la base;
& marbrés par zônes de marron-clair & soncé,

\*Coul ind. & de verd d'eau \*; deux Magellaniques de sab. 9. litt. H. l'espéce de ce « x de l'article 11, & deux blancs dépouillés, semblables au dernier de l'article précédent.

29. Vingt-quatre Lépas de moyenne grandeur, sçavoir, quatre à bandes larges, alternativement blanches & brunes, & à stries fines & serrées. Deux fauves nués de verd & de gris, de l'espéce du premier de l'article 26. Deux verdâtres à stries inégales, serrées & rabotteuses, parmi lesquelles il y en a, dans un, onze orangées placées à distance presqu'égale les unes des autres. Un fouci lisse, à tête blanche; un à stries peu élevées, & à zônes brunes hachées fur un fond jonquille; un verd de terrasse strié, à bandes alternatives, fauves & brunes; deux à stries transversales & à petites bandes hachées, blanches & rougesbrunes. Deux pet.ts Magellaniques papyracés, à stries brunes & cannelures blanches, mieux prononcées dans l'un que dans l'autre. Deux autres Magellaniques papyracés, de la variété de l'article 9. Quatre Œils de Rubis, dont deux radiés & revêtus de leur épiderme; les deux autres dépouillés & non radiés. Deux de l'efpéce du premier, de l'article 28, & un

en bateau comme les deux premiers de l'article 22.

LES LEPAS.

30. Cinquante Lépas de moyenne grandeur & petits, scavoir, deux petits & plats à stries capillaires, marbrés, par zônes inégales, de brun & de gris, & à sommet blanc \*. Deux autres de forme conique & à stries fines alterna-539.f. 22. tives, blanches & noires. Deux à tête comprimée, à stries fines, blanches & grises. Deux lisses & applatis, à lignes longitudinales, brunes, interrompues, sur un fond blanc. Deux applatis d'un beau couleur de rose, à stries capillaires & à fommet blanc. Un femblable, mais brun-obscur. Un blanc à grandes taches couleur de rose, régnantes dans une large zône. Deux un peu plus élevés, fauves-gris. Deux blancs à côtés comprimés, & à stries longitudinales & transversales, grosses & rabotteuses, formant un réseau imparfait. Un noir de forme conique, à huit côtes élevées, d'un blanc d'émail. Un de même espéce, à neuf côtes, blanc nué de fauve roux, & à sommet noir applati. Un à base dentelée & à côtes strices, alternativement blanches & brunes \*. \* Lift. rabi Le petit Lépas peint en façon de reseau \*. 532. fg. 11. \* List, tab. Deux Lépas bruns, dont les cannelures & les 530. fig. 8. stries sont hérissées de petits points rudes \*. \* List. tab. Deux autres semblables, mais rougeâtres. Un 536. fig. 15. blanc à stries fines, granuleuses & à base pres-

I. FAM. que circulaire. Cinq Magellaniques, dont qua-Les Lepas, tre de l'espéce de l'article 9, & un Entonnoir à bandes alternatives blanches & brunes. Deux wils de Rubis radiés, un Bouclier, & dixfept autres variétés.

31. Sept Lepas peu communs, tous à grands rayons, en forme d'étoile, & nommés par cette raison Astrolépas; sçavoir, un blanc de forme plate, à seize rayons faillans en-dehors, & creusés en-dessous en goutiere; trois blancs roussatres à tête plus élevée, à rayons plus ferrés & dentelés; un blanc à rayons épais & granuleux; & deux blancs marbrés de noir,

\*Arg. pl. 2. l'un à sept, l'autre à huit rayons \*.

Lift, rab, 532. fig. 10.

32. Deux Lépas à tête recourbée & à stries sines & serrées, nommés Bonnets de Dragon; l'un d'une belle couleur de chair, & plus grand que celui représenté dans la première Planche

\*Arg. app. de l'Appendice de d'Argenville \*; l'autre n'en pl. 1, lett. A. différe qu'en ce qu'il est un peu moins grand & de couleur blanche. Ils sont de la plus par-

faite conservation.

33. Deux rares Lépas Magellaniques papyracés à tête recourbée, & grands dans leur espéce. Ils sont en sorme de gondole, à tête placée à l'une des extrémités de la base, & un peu recourbée sur ce même point, à stries transversales qu'on n'apperçoit qu'à la loupe, blancs en-dessus, nacrés en-dedans.

34. Douze autres Lépas Cabochons de I. Fam. moyenne grandeur & petits; sçavoir, deux LES LEPAS. fauves nués de marron, à stries longitudinales, granuleuses vers le haut, tuilées dans le bas, & à léger recourbement de tête regardant l'un des deux bouts \*. Un autre avec son \* qualt. inde épiderme à stries, alternativement granuleuses tab. 9. litt. V. & hérissées de petites tuiles fort saillantes. Un petit blanc de la Barbade, à stries transversales & ridées, à base irréguliere, & à recourbement de tête regardant un des côtés \*. Un \* Litt. tab? petir blanc du même lieu à stries longitudi- 544 fig. 31. nales, revêtues de Drap Marin, à base ronde & à recourbement de tête contourné \*. Un \* List. tab. petit blanc à stries fines, transversales, gra- 144 fig. 32. nuleuses & à base ronde \*. Deux blancs & gris, nués de verd, de forme conique à stries 544 fig. 30. longitudinales, & à sommet un peu recourbé. Un blanc à stries transversales, onduleuses & ridées, & à recourbement de tête descendant jusqu'à la base. Deux Bonnets de Dragon de l'espéce de ceux de l'article 32, mais plus petits \*; & un petit de l'espèce de ceux de l'ar- \* Arg. pl. 2; ticle 33.

35. Un Lépas rare de couleur fauve, à groffes stries rabotteuses, longitudinales, & à petites transversales qui se crossent en réseau, à base ovale & à tête recourbée sur l'un de ses côtés; l'intérieur ressemble à une valve de I. FAM. Les Lepas. \* Arg. pl. 2.

lett. D.

came qui seroit destituée de charniere, ce qui lui a fait donner le nom de Concho-Lépas \*.

# GENRE SECOND.

LÉPAS A COQUILLE PERCÉE EN DESSUS,

36. On Lépas rare de Magellan, à base ovale, de plus de trois pouces de long, sur plus de deux de large, de forme assez élevée, à stries longitudinales, serrées, coupées par quelques autres transversales, & à vingthuit larges rayons alternativement blancs & violets, nués d'incarnat vif, le trou ovale du sommet a un demi-pouce de long sur trois lignes de large, & est bordé de blanc.

37. Un de même espèce, à cela près qu'il est plus large, & que ses rayons sont alternativement violets & blancs nués de ver-

dâtre.

38. Deux Lépas en pendant, de la variété de celui de l'article précédent, mais un peu moins

grands.

39. Douze Lépas de différentes grandeurs, tous percés au sommet; sçavoir, un à large ouverture, & à côtés comprimés, qui lui donnent la forme d'un canot. Un marbré de blancfale & de verd céladon, à stries inégales & ser-

rées, & à bords dentelés ; le Lépas réticulé, I. FANT blanc safrané; 2 le Treillis à pointes de Lister 3; Les Lépas. le Lépas à Treillis plus serré 4; le Lépas d'Afrique légérement strié, blanc-verdâtre en dedans, brun-roux en dessus 5; le Lépas verd à stries no. 6. Argeny. blanches, alternatives, & dont le trou du som-527. fig. 1. met est noirâtre tant en dedans qu'au dehors 6; le Lépas blanc taché de verd, à stries 527, fig. 2. noueuses 7; le Lépas blanc tacheté, remar- 528. fig. 4quable par le trou circulaire de son sommet 3; fig. 7. 1bid. le Lépas à dix rayons fascié d'incarnat & de fig. 6. brun; & deux grands Lépas en pendant de fig. 7. l'espéce de celui de l'article 37.

40. Trente-quatre autres de différentes grandeurs, tant réticulés que striés, de toutes les variétés de l'article précédent, excepté la

feconde.

# GENRE TROISIEME.

LÉPAS A COQUILLE CHAMBRÉE,

41. VINGT-UN Lépas de moyenne grandeur & petits; scavoir, deux blancs \* flambés \* Lin. 146; de brun-rougeâtre, de forme plate, à base sassans. Historia irréguliere, à tête faillante en forme de bec fig. 8. un peu recourbé, & à cloison paralléle à la base, occupant près de la moitié du dedans,

(1) Gual. tab 9. litt. N. (2) Bonan. (3) List. tab. (4) 1bid. tab.

Quatre autres, dont trois blancs, nués de fauve-Les LEPAS, clair, & un orangé, à stries longitudinales, inégales & hérissées de petites pointes, à tête recourbée & contournée qui leur donne une forme approchante de celle des Oreilles de Mer; leur chambre est à peu-près semblable à celle des précédens. Un de forme peu différente, mais lisse & à robe verd-de-terrasse, picottée de petits points grifâtres. Deux blancs, lisses, de forme un peu bombée, & à tête recourbée de biais jusqu'à la base, imitant trè :bien une Nacelle: ils ont beaucoup de ressem-

\* Hift, du blance avec le Garnot de M. Adanson \*. Deux séneg. pl. 2. planes paryracés, de forme ovale très-applatie, fig. 9. approchant beaucoup du Jenac du même Au-

\* Ibid.fig. 10. teur \*. Deux autres blancs papyracés, de forme plus allongée, & qu'on nomme Sandales. Deux à coque épaisse, à tête un peu recourbée, descendant presque jusqu'à la bate, & fous laquelle on appercoit en dedans une efpéce de très-petite chambre; leur robe est lisse & panachée de petites larmes en losange,

blanches, vertes & violettes \*. Deux de mêtab. 40. litt. O. me espéce, mais à fond brun & larmes fauves. Deux petits fauves de la Méditerranée, en forme de cônes évafés, & à petite chambre

\* Arg. pl. 2. dont l'ouverture s'étend du centre à un des cl. 1. n°. 12. points du bord \*, nommés le Bonnet Chinois; lift. tab. 146. fig. 38.

& deux des Indes de même espéce, mais blancs; dont un à stries long tudinales, iné-LES LEPAS! gales & peu ferrées, & l'autre lisse au sommet, imitant le bout d'un maminelon.


# GENRE QUATRIEME.

TEPAS A APPENDICE EN DEMI-CORNET.

42. P EUF Lépas, fçavoir, deux blancs papyracés, à stries longitudinales, très-fines, & à groffes stries transversales, onduleuses, à base irréguliere, à tête élevée & saillante en bec de Corbin, & de l'espéce nommée Cabochon \*. Deux autres de la même espéce, mais \* Arg. pl. 25 lett. K, Gualt. dont les grosses stries transversales serpentent ind. tab. 9. & se croisent en divers sens; ce qui les fait litt. Z. paroître comme ridés. Deux autres Cabochons blancs de Saint Domingue, différens des précédens, en ce que les stries longitudinales en font fortes & bien marquées, & que les transversales y paroissent à peine. Deux petits blancs feuilletés, formés chacun comme de sept autres papyracés, empilés, à distance inégale les uns sur les autres, & qui vont en diminuant de volume à mesure qu'ils approchent du sommet, imitant par-là un toît Chinois à plusieurs étages, d'où ils ont tiré leur nom de

#### 92 COQUILLES UNIVALVES

Atg. pl. 2. Toits Chinois \*; & un petit blanc & conique à stries longitudinales bien marquées, à trois renssemens circulaires, terminés par un petit bouton, & nommé Bonnet de Matelot.



## SECONDE FAMILLE.

#### OREILLES DE MER.

II. FAM. DE font des Coquilles ouvertes & apOREILLES platies qui n'ont qu'une feule spirale,
& qui ressemblent assez bien à l'oreille
humaine, d'où elles ont pris leur nom.
Elles ont ordinairement une rangée de
trous ronds disposés sur une ligne courbe; mais quelques unes en étant privées, nous en serons un genre à part.
Ces deux genres sont:

1°. Les Oreilles de Mer à trous.

2°. Les Oreilles de Mer sans trous.



\* Rumph.

#### GENRE PREMIER.

#### OREILLES DE MER A TROUS.

43. UNE Oreille de Mer, des Indes, rare, dépouillée, d'une très-belle Nacre, ayant OREILLES plusieurs semences de Perles dans son milieu, de Mer. & portant cinq pouces & demi sur quatre \*. \* Gualt. ind.

44. Deux autres un peu moins grandes, non tab. 69. litt. dépouillées, à profonds fillons, à thries élevées en vive arrête, onduleuses & rabattues toutes d'un même côté en forme de feuilles roulées.

La Nacre du dedans offre aux yeux toutes les couleurs de l'Arc-en-ciel \*.

ouleurs de l'Arc-en-ciel \*. \* List tab.
45. Deux comme les précédentes, dont une

dépouillée.

46. Trois belles Oreilles de Mer, Orientales, de forme étroite allongée, l'une à ftries prefqu'imperceptibles, revêtue de sa pellicule d'un beau verd-pré, tacheté de blanc - sale; les deux autres dépouillées & très-grandes dans leur espèce. Leur Nacre intérieure est du plus bel Orient \*.

47. Sept jolies Oreilles de Mer, sçavoir, E. F. Arg. pl. 3. une rare des Indes, jaune, marbrée de blanc-lett. E. fale, à stries longitud nales ondu euses, coupées d'autres plus fines transversales, à bord

II. FAM. extérieur granuleux, mais fur-tout remarqua-OREILLES ble par une fuite de tubercules paralléles aux trous dont l'Oreille est percée, & qui se pro-

trous dont l'Oreille est percée, & qui se prolongent en spirale jusqu'à la clavicule où ils forment une espéce de Couronne. Deux autres aussi des Indes à robe aurore réticulée, & à deux larges cannelures bordant des deux côtés la rangée de trous & de tubercules. Deux de Rio de la Plata à coque plus mince & à stries plus régulieres que celles de nos Mers; & deux petites de l'espéce de l'article précédent.

48. Douze Oreilles de Mer de nos parages, fçavoir, un affortiment de six à peu près de même grandeur, percées de 4,5,6,7,8 & 9 trous, confervant leurs pellicules marbrées en forme leurs. A.F. de diverses couleurs \*. Une à stries en forme stid. lett. D. de feuilles ou rides très-saillantes \*. Deux grandes chargées de Glands de Mer, & trois dépouillées, dont une orangée aurore & cerise.

pouillées, dont une orangée aurore & cerife, de diverses nuances & d'un grand éclat, tant en dessus, qu'en dessous, & au-dedans de laquelle adherent des semences de Perles, mais dont le bord paroît avoir été rogné jusqu'en deçà des trous qui y manquent.



#### GENRE SECOND.

OREILLES DE MER SANS TROUS.


blanches de forme applatie, & nommées

Oreilles de Venus, à stries très-sines \*; & une de Mer.

petite très-rare d'une autre espéce, blanche, \* Arg. pl. 3marbrée d'orangé, légerement striée, nacrée
en dedans, & de forme bombée \*.

List. tab.

1056.



# TROISIEME FAMILLE.

TUYAUX ET VERMICULAIRES.

CE font des espéces d'Etuis testacés, III. FAM.
TUYAUX
droits, recourbés, sinueux ou tortillés, ET VERMIqui ont servi de logement à des espéces de Vers de Mer, & qui adherent
souvent les uns aux autres & à d'autres
corps.

On les appelle ou Tuyaux de Mer, ou Vermiculaires, selon qu'on les ren-

TIII. FAM. contre ou isolés, ou groupés ensembles plus ou moins grosses, &c est Vermiculaires. ces dénominations distinctives donneront lieu à les partager ici en deux Genres:

- 1°. Les Tuyaux de Mer.
- 2º. Les Vermiculaires.

Auxquels nous ajouterons, par forme d'appendice, un troisième Genre, qui sera composé de ceux qui sont sormés d'une substance cartilagineuse & flexible, ou de grains de sable & de fragmens de Coquilles, ou de grains de sable seulement, liés ensemble par un suc glutineux, soit qu'on les trouve seuls ou groupés. Quoique nous ne regardions pas ceux de ce dernier genre, comme des Coquilles proprement dites, nous n'avons pas cru devoir les ranger ailleurs, vû leur ressemblance avec les précédens.



#### GENRE PREMIER.

#### TUYAUX DE MER.

Tuyaux de Mer de l'Isle d'Amboine, nommé l'Arrosoir ou le Pinceau IIII. Fam.

de Mer, de six pouces & demi de long & parsaitement conservé. Il est de couleur blanche à culaires. tête arrondie en sorme de gland, & percée de petits trous, couronnée d'une espéce de fraise sormée de petits tubes accolés & tenans les uns aux autres, comme autant de portions de rayons d'un même cercle \*.

de rayons d'un même cercle \*.

51. Deux Arrosoirs de la côte Coromandel, lett. G. list.

51. Deux Arrosoirs de la côte Coromandel, lett. G. list.

moins grands que le précédent, & à tuyau?

un peu recourbé, l'un à tête & fraise appiaties, & l'autre à fraise fort irréguliere. Une tête d'Arrosoir, coupée au-dessous de la fraise pour faire voir l'organisation intérieure, & un Tuyau d'Amérique blanc nué de violet, ridé, & à deux replis irréguliers, dont l'extrêmité la moins grosse est fermée par une demi-sphére lisse & luisante.

52. Le grand Tuyau de mer de l'espèce des folen du fable, de forme cylindrique, droite, ridée, & composé comme de plusieurs pièces entées l'une sur l'autre, formant un seul tube,

III. FAM. CULAIRES.

excepté à l'extrêmité supérieure qui se partage Tuxaux en deux par une cloison longitudinale d'un ET VERMI- pouce de long. Il est fort épais, d'un blanc sale, & a dix-huit pouces de haut sur quinze lignes de diametre dans le bout le plus gros. Sa forme qui ressemble parfaitement à un cierge, lui en

r Seba, tom. 3, tab. 94. peut faire donner le nom 1. Klein tub. mar. tab. 1,

fig. 3.

53. Onze autres, sçavoir, quatre de l'espéce du précédent, & dont le plus gros qui est courbé, a 5 pouces & demi de long, sur un pouce & demi de diametre. Un cylindrique, de huit pouces & demi de long, de cinq lignes de diametre, & formé de quatre additions ou jets; & fix petits d'Amérique un peu courbés, dont le diametre va en s'étrécissant comme aux pré-

2Rumph.tab. cédens 2. 41 nº - 3.

54. Dix-huit Tuyaux de mer; sçavoir, deux grands Dentales des Indes, cannelés, de couleur verte foncée dans le bas, qui s'éclaircit 3 Arg. pt. 3. jusqu'au blanc vers la pointe 3. Deux semblananni, nº, 8, bles, à cela près qu'ils font plus minces, & 4 Lister, tab. à cannelures plus étroites 4. Deux autres blancs 547, fig. 1. 5 Arg. Ibid. lett. II. droits & courts à cannelures plus profondes s. Huit Antales, liffes & blancs 6. Et quatre aulett. KK. Bo- tres légerement striés, dont deux aurore nués nanni. nº. 9. par zones de blanc, & deux couleur de rose

7 Gualt, tab. ro. litt. F.

55. Un tuyau de mer des Indes & de la plus grande rareté, de couleur blanche, auquel sa

nués par zones de verd 7.

ressemblance avec un Escalier a fait donner le nom Italien de Scalata. C'est un ruyau contour- III. FAM. nom trailen de Sauata. Cen un tryau contout TuyAux né régulierement en spirale de huit orbes, qui se ET VERMI furmontent les uns les autres en forme de vis culaires. conique, & dont le plus bas revient en cornet former une bouche ovale; il est revêtu extérieurement & à distance égale, d'anneaux blancs, saillans en vive arrête, se rapportant & partie se joignant d'orbe en orbe, & laissant entre deux, d'un orbe à l'autre, des jours à raison de neuf par orbe, à commencer de la bouche même que le premier borde. Il a deux pouces de haut & est des mieux conservés \*.

\*Rumph.tab.

56. Deux gros tuyaux de mer, rares, de 49. litt. A. Gault tabrio. couleur grise, de forme presque cylindrique, lett. ZZ. Arg. contournés en spirale, & nommés Tire-bourres. Cette espéce est remarquable par des Aries circulaires onduleuses & ridées, & par une fente droite qui regne dans la longueur de toutes les spires, & qui en laisse voir en plusieurs endroits le dedans. La clavicule est applatie dans l'un & faillante dans l'autre \*.

\*Séba pl. 94;

57. Cinq Tire-bourres de l'espéce du dernier des précédens, groupés à côté les uns des autres sur une production de mer grisatre & couverte de houpes de petits poils transparens, semblables à des filamens d'alun de plume.

58. Quatre autres plus grands que les précédens, groupés sur une production marine de même espéce. Gii

59. Six rares Tuyaux de mer de l'espéce Tuyaux nommée Solen Serpent; sçavoir, deux ET VERMI-fauves, dont les replis se terminent par une culaires. clavicule en forme de vis très-aigue à fon ex-\*Gualt. tab. trêmité\*, & qu'on peut nommer Vilebrequin; Arg.pl. 4 lett. deux ridés & tortillés, de couleur rousse, dont un lisse & l'autre strié; un à côtes longitudinales épineuses, à sillon dentelé, & à replis

\*Rumph.tab. tortueux, imitant ceux des vers de terre \*; Gualt. tab. 10 & un gros & long à trois faces, dont deux litt. R. plates, & la troisiéme arrondie, à stries lon-

\* Bonanni. gitudinales & transversales \*. £ab.20. litt.F.

60. Dix Tuyaux de mer ; sçavoir , un gros Serpent, à stries longitudinales granuleuses, plié en spirale & adhérent à un morceau de corail oculé blanc. Trois accolés ensemble & formant divers plis femblables à ceux des intestins. Deux rares à robe rabotteuse, roulés en forme de cornes d'Ammon, l'un à trois &

\* Arg. pl. 4. l'autre à deux contours \*. Un grand nombre lett. H. de très-petits blancs, adhérens à l'Algue ma-\* List. tab. rine, nommés par Lister Nautiloïdes \*. Trois

554.t. 5. Klein rub. mar, tab, petits Tire-bourres de l'espéce du premier de a. f. 2. l'article 56, & trois autres de l'espéce des deux

premiers de l'article précédent.

61. Deux Tuyaux de mer d'Amérique, rares, d'un petit diametre, & d'une extrême longueur, tortillés chacun en deux spires d'un grand nombre de révolutions, & ressemblans à des petits pains de Bougie, ce qui nous leur en fait donner le nom.

62. Huit Tuyaux de mer chambrés; sçavoir, et Vermiun très-rare aurore clair, à fix replis irrégu- CULAIRES. liers, & ouverture longitudinale dentelée des deux côtés, à petites chambres intérieures, tournant leurs convexités du côté du bout le plus mince, & qui paroissent destituées d'un siphon qui les traverse toutes, tel qu'on l'observe dans celles des Nautiles chambrés. Six autres, ronds, roulés en spirale plate, à cloisons nacrées, traversées d'un fiphon, nommés Ammonies, & en Hollande Cornets de Postillon \*. Un autre de même espéce, percé de \* Arg. pl. 52 quelques trous latéraux pour en faire voir les lett. GG. chambres; & quelques diaphragmes ou cloisons détachées garnies de leur siphon.



# GENRE. SECOND

#### VERMICULAIRES.

63. ROIS grands & beaux groupes, l'un de III. FAM. gros Tuyaux Vermiculaires du Golfe de Veturaux nife, à stries longitudinales granuleuses; les culaires. deux autres de la Méditarranée, moins gros, lisses & blancs. Ils adhérent l'un à un grandrage, pl. 4. Peigne, l'autre à une valve de Cœur de Bœus.

64. Quatre autres groupes, des deux varié-

\* Ibid. pl. 4. tés de l'article précédent \*.

65. Neuf Variétés de Vermiculaires, fçavoir, un groupe de Vermiculaires peu communs, minces comme du fil fin & diversement \*\* séba tom. tortillés \*. Un autre de deux tubes à plis ciral tab. 100.000 culaires en vive arête de distance en distance, qui les font ressembler à plusieurs gobelets empilés les uns dans les autres, & qu'on nomme Tuyaux Trompettes. Une grosse Came chargée de vermiculaires blancs & triangulaires à côte longitudinale en vive arête sur le milieu du corps. Et six autres Variétés dont quelques-unes déjà décrites.

66. Quatre groupes de Vermiculaires, dont deux blancs operculés du Sénégal, nommés Verplanta de mets \* Et deux réguliers d'un beau pourpre foncé, connus sous le nom de Tuyaux d'Orgue. Plus un opercule de Vermet détaché, ainsi que l'animal \*.

67. Un groupe de Tuyaux d'Orgue; de \* Arg. pl. 4x près de huit pouces de longueur, sur près de lett. A. six de largeur & autant de hauteur.

. 68. Un autre groupe de Tuyaux d'Orgue;

moins gros que le précédent, mais de couleur plus vive.

69. Un grand & beau groupe de Tuyaux Vermiculaires de la Méditerranée, partie operculés, partie de l'espèce appellée Tuyaux Trompette, lequel renferme plusieurs pétoncles.

70. Deux amas de Vermiculaires très-blancs, groupés à l'entour de fragmens de bâtons, & qui posent sur des pieds de bois des Indes; & un autre amas de Vermiculaires, semblable à celui de l'article précédent, mais plus petit.

71. Un gros groupe de Vermiculaires du Sénégal, des deux espéces, brune & blanche, nommées Vermets & Dofans\*, formé en \* Adans. pla éventail, auquel adhérent des huîtres feuil-11, nº.1 & 3,6 lettées & des glands de mer : il a dix pouces de haut sur douze de large, & est posé sur un pied de hois poirci.



# GENRE TROISIEME.

TUYAUX ET VERMICULAIRES NON TESTACÉS.

72. A RENTE-CINQ Tuyaux de mer; sçavoir, fix cartilagineux, dont un fimple & mince, Tuyaux un peu élastique, brun rougeâtre, les cinq autres ET VERMI- sont des étuis de Scolopendre, à double coque, dont l'extérieure est mince, grise noirâtre & ridée, l'intérieure un peu plus épaisse, très-lisse, de la dureté & transparence de la corne. M. Ellis \*Ellis, pl 34. les nomme Coraline tubuleuse de Malte \*. Trois mar. tab. 1.f. d'une autre variété, cartilagineux, longs, minces & fragiles. Douze à robe raboteuse & fragile formée de fable & de fragmens de co-\* Klein, tub. quilles \*. Deux autres de même espéce, mais mar. tab. 1. f. de consistance plus solide; fix autres adhérens à autant de pointes d'oursins. Quatre papyracés de forme conique tronquée, lisses & fragiles \*. Et un de la côte de Coromandel 1 \* Klein Bid. à robe seulement formée de fragmens de coquilles. Plus une Scolopendre de l'Isle de Saint-Helene, avec son tuyau, conservés dans l'Esprit de vin.

73. Un gros groupe de Tuyaux Vermiculaires de l'Océan, formés de fable & de fragmens de coquilles; la furface, où aboutiffent

les bouches des tuyaux, offre à l'œil des compartimens à peu près semblables à ceux des III. FAM. gâteaux des mouches à miel \*, mais dont les Vermicucellules seroient rondes & non exagones; il LAIRES. est de la plus belle conservation, & porte 15 \* Ellis, pl. pouces 3 lignes de large sur 5 & demi de haut. G. Mém. de

74. Deux groupes de Vermiculaires; fça-l'Acad. des Se. voir, un de l'espéce de ceux de l'article pré-134, pl. 2, fe cédent, mais d'un volume à pouvoir entrer dans des tiroirs, & un d'autre espéce formé de gros sable blanc seulement, & venant de l'Isle de l'Ascension : plus des boëtes où sont des sables & autres fragmens provenans de la décomposition d'une partie de chacun, qu'on a raffemblés pour pouvoir à volonté les examiner au Microscope.



# QUATRIEME FAMILLE.

NAUTILES.

IV. FAM.

E font des Coquilles contournées en spirale de trois révolutions, toutes dans un même plan, & dont la derniere paroît seule extérieurement. Elles ont l'apparence d'un petit navire ou gondole à poupe élevée.

Les Coquilles de cette Famille sont ou épaisses & cloisonnées, nacrées en dedans, à carenne lisse & arrondie; ou papyracées & non cloisonnées, ni nacrées, à carenne tuberculeuse plus ou moins large, d'où résulte leur division en deux genres.

19. Les Nautiles épais & chambrés.

2°. Les Nautiles papyracés non chambrés.



## GENRE PREMIER.

#### NAUTILES ÉPAIS ET CHAMBRÉS

75. Un grand Nautile des Indes, fauve trèsclair, à flammes onduleuses cannelle dans la IV. FAM. moitié de sa robe la plus voifine de la tête, & NAUTILES. à grande tache noire dans l'origine de la seconde révolution \*.

\* Arg. pl. 53 76. Un autre blanc qui differe du précédent lett. E. en ce que sa tache noire y est plus grande & se prolonge en une raye fine qui borde l'intérieur de la bouche \*.

" Gualt. tabi

77. Un autre fauve foncé, à flamme can- 17, fig. A. nelle, & où la tache noire ne forme qu'une zone peu large.

78. Un autre dépouillé & par-là nacré, tant en dedans qu'en dehors, & d'un bel orient.

79. Trois Nautiles chambrés & umbiliqués dont un de moyenne grandeur à flammes blanc de lait dans toute sa robe, & deux petits dépouillés \*.

80. Les mêmes Nautiles qu'à l'article pré-lett. F. Gualt, tab. 17, fig. & cédent, excepté que l'un des deux petits n'est

point dépouillé.

81. Un grand Nautile chambré, coupé en deux suivant sa longueur pour en laisser voir l'inté-

rieur \*. Un percé de divers trous du côté qui répond à ses chambres, & vers la tête d'un IV. FAM. NAUTILES. plus grand, laissant à découvert un intervalle \* Gualt. pl. de trois cloisons; & la portion chambrée d'un autre, ouverte en divers autres sens.

## GENRE SECOND.

NAUTILES PAPYRACÉS, NON CHAMBRÉS.

82. Un Nautile papyracé de la Méditerranée, blanc de lait, à stries onduleuses unies, à carenne étroite, brune dans la moitié de sa longueur, de 7 pouces 4 lignes de long, avec son

\* Arg. pl. s., polype desséché & bien conservé \*. 83. Le même Nautile, mais moins long d'un Zoomorp. pl. 2, f. 2 & 3.

demi pouce, & fans polype.

84. Un Nautile semblable aux précédens à cela près que la couleur blanche en est moins vive, & que les bords d'une partie de la carenne en font plus noirs.

85. Un Nautile des Indes papyracé, blanc tirant sur le fauve, à stries chargées de petits tubercules en forme de grains de ris, à deux crochets faillans ou oreilles, à carenne large,

\*Arg. pl. 5, & de 5 pouces 4 lignes de long \*. lett. C.

86. Un du Bresil de l'espéce du précédent, mais moins grand, & d'un beau blanc de lait.

87. Deux Nautiles, l'un de l'espèce du précedent, mais beaucoup plus petit; l'autre sans IV. FAM. tubercules, de couleur blanche tirant sur le NAUTILES. roux, à carenne large & très-petit \*.

88. Un Nautile de moyenne grandeur , tom. 3, tab. à stries chargées de grains de ris, mais dif-34, no. 9 & férent de ceux des articles 85 & 86, en ce qu'il n'a pas d'oreilles, & par-ià plus rare \*.

\* Seba, tona. 3 , tab. 84 ,

# CINQUIEME FAMILLE.

proceed the second of the seco

#### LIMAÇONS.

E sont des Coquilles contournées en spirale, depuis deux orbes jusqu'à V. FAM. dix, dont on distingue trois genres; LIMAÇONS, sçavoir,

1°. Les Limaçons à bouche ronde, & à levre extérieure, presque perpendicu-

laire à la base.

2°. Les Nerites ou Limaçons à bouche demi-ronde, & à levre extérieure, presque perpendiculaire à la base.

3°. Les Sabots ou Limaçons à bouche ovale & à levre intérieure, presque

parallele à la base.

# GENRE PREMIER.

# LIMACONS A BOUCHE RONDE.

89. Eux Limaçons, l'un lilas vif, l'autre blanc, nué de gris de lin, nommés Dauphins \*. V. FAM. Limaçons

90. Deux autres Dauphins un peu plus \* Arg. pl. 6, grands, l'un couleur de lilas, & l'autre fans lett. H. Seba, tab. 59, nº. 15 avoir été nétoyé \*.

8 16. \* Seba, ibid.

91. Deux autres plus grands, à pointes & n°. 20 & 21. feuilles plus nombreuses, mais moins faillantes qu'aux précédens \*.

\* Séba , ibid. 310.7,8811. Gualt. tab. 68, litt. D.

92. Deux très-grands Limaçons des Indes, de forme renflée, & du genre des Burgaux nommés Olearia, parce que les anciens s'en servoient pour mettre de l'huile. L'un est umbiliqué & d'un verd foncé; ce qui le fait aussi \* Bonan. cl. nommer Pot-verd \*. L'autre différe du premier en ce qu'il n'a point d'umbilic; il est dé-

3, nº. 9. Gualt, tab. 64, pouillé & montre en dehors comme en dedans litt. A.

\* Gualt. tab. 68, litt. A.

une très-belle nacre \*. Plus un grand Opercule qui appartient aux Coquilles de ce genre. 93. Deux Burgaux déponillés de l'espèce du

dernier des précédens, mais moins grands.

94. Deux Burgaux, l'un plus grand, l'autre moins, à robe verte, marbrée de blanc & de marron, nommés en Hollande Princesses. Dans le plus grand, la côte la plus élevée se rend à la bouche par un gros pli formant en V. FAM, dedans une espéce de gouttiere \*. L'autre est Limaçons. d'un verd moins foncé.

\* Rumph. take,

on verd moins fonce.

95. Deux Burgaux rares, sçavoir, un dé- séba, tab. 742.

n°.184. pouillé en partie, dont la robe n'offre aux yeux que du noir & de la nacre, & qu'on nomme Veuve perlée; & l'autre dépouillée jusqu'à la nacre qui est très-brillante; tous deux à tête orangée \*.

96. Un plus gros, de même espéce, aussi dé-lett. B. pouillé, à robe nuée de rouge & d'orangé, de l'éclat du rubis.

96. Le même Burgau que le précédent, dépouillé en partie seulement, noir & orangé dans le reste, nommé Burgau perlé.

98. Deux Burgaux rares de la Chine, verd foncé, nués de jaune, à cannelures & stries circulaires & inégales, croifées d'autres transverfales, fines & onduleuses, à cinq pas de spirale, & à très-petite queue: l'un à cing rangs de tuiles saillantes, diminuant de grandeur de la bouche à la tête, & l'autre à deux rangs seulement.

99. Deux beaux Burgaux en pendant, blancs marbrés principalement par zônes d'un beau verd, dépouillés en quelques endroits jusqu'à la nacre, à tête un peu élevée, à fix orbes, & nommés Perroquets perlés.

100. Six Burgaux, dont un noir, à quelques V. FAIL. traits blancs interrompus, nommé Veuve. & Limaçons. cinq autres flambés plus ou moins régulière-I Gualt, tab. ment de blanc & de noir, nommés Petit deuil I

68 , litt. B. Bonanni, cl. ou la Pie.

3, 11º. 29 & 101. Trois beaux Limaçons, scavoir, un à 30. Arg. pl. 8, stries circulaires & tuberculeuses, nommé Boulett. G. 2 Arg. pl. 6, che d'or 2; un à stries circulaires, sans tuberculett. D. Séba, les, nommé Bouche d'Argent 3, & un à stries séba, ibid. longitudinales, ferrées & peu prononcées, nº. 4. Rumph. tab. 19, 11°. 3. nommé Ruban 4.

102. Trois Coquilles des espéces précéden-4 Séba, ibid. m°. 27. Arg. pl. 6, lett. K. tes, mais un peu différentes par la grandeur & les couleurs.

103. Trois autres de marbrure différente. 5 Séba, pl. 74, scavoir, une Bouche d'or 5, fermée par son nº. 10 % 11. opercule, une Bouche d'argent 6 & un Ruban. 6 Séba, ibid. 104. Trois Limaçons femblables aux précénº. 6.

dens, à cela près que les couleurs en sont un peu différentes, & que la clavicule de la Bouche d'argent est d'un rouge de corail.

105. Deux Rubans un peu différens des précédens, & l'un de l'autre, & une Bouche d'argent qui différe de celle de l'article 101, en ce que les pas en sont applatis & bordés extérieurement d'une strie plus forte que les autres.

106. Deux grosses Bouches d'argent d'Amérique, & d'espéce rare, marbrées par bandes longitudinales, obliques & irrégulieres, l'une

de

de blanc & de fauve de diverses nuances, l'autre de b'anc & de verdâtre, à grosses stries V. FAM. transversales, un peu applaties, croisées d'au- Limaçonsa tres longitudinales & obliques, très-fines & serrées, à tête élevée, à fix orbes arrondis, & à pas creufés en dedans.

107. Six Limaçons de moyenne grandeur; Scavoir, deux Rubans, deux Bouches d'or & deux Bouches d'argent qui sont à stries & à tubercules, comme les Bouches d'or.

108. Six autres, sçavoir, un à taches blanches, olives, & brunes, nommé Peau de serpent \*; deux Bouches d'argent, l'une marbrée \* Arg. pl. 63 de fauve & de brun, l'autre de verd & de noir; lett. C. un Perroquet perlé, un Petit-deuil & un Ruban.

109. Dix Limaçons un peu moins grands que les précédens, & par pendans deux à deux; sçavoir, deux blancs tachetés par compartimens de noir, sans umbilic, & qui peuvent former une seconde espèce de Petits-deuils : deux Petits-deuils de la premiere espéce, deux Peaux de serpent, deux Perroquets perlés & deux Rubans.

110. Vingt - fix petits Limaçons; sçavoir; deux noirs, nués de fauve dans le bout, nommés Marrons rôtis \*; deux de forme à peu près \*Ibid. lett. I. semblable, & rayés par zônes de fauve, de jaune & de noir \*; deux de forme bombée & \* Gualt tab. à bouche argentée, dont la robe est chargée 45, lit. A, C,

· Tome I. H

V. FAM. LIMAÇONS.

642 , fig. 34.

d'une suite de petites taches oblongues, pourpre-clair, rangées par lignes circulaires 1; deux blancs tachetés de noir, par bandes longitudi-Lister, tab. nales en zig-zag, & du reste, semblables aux \*Hid. fig. 33. précédens 2; deux petits Burgaux à tête élevée, marbrés de blanc sale & de noir, dont un dépouillé en partie & par bandes obliques jusqu'à la nacre ; deux autres umbiliqués de l'espéce des Petits-deuils; deux Bouches d'or, deux Bouches d'argent, deux Rubans, un Limaçon dépouillé, d'une belle nacre, très-singulier en ce que la tête en est rouge de corail très-vif; un couleur de noisette, à tête dépouillée, jouant l'opale; fix autres dépouillés & nacrés partout. Plus deux bracelets faits, l'un de petits Burgautins dépouillés, enfilés ensemble, & l'autre de gros fragmens de Petits-deuils, avec un lambeau de ceinture de Sauvage, tissu de petits morceaux de coquilles, violets & blancs, cylindriques & creux.

111. Deux Burgaux des Indes, très-rares, verds, marbrés, l'un de blanc, l'autre de rouge & de blanc, à tête orangée, à quatre pas un peu applatis & obliques, bordés de tubercules peu élevés, à umbilic & à un pli dans l'angle des deux lévres, du côté de la bouche le plus près de la spirale.

112. Dix Limaçons des Indes; sçavoir, deux fauves qui différent des précédens par leurs stries granuleuses, & en ce que l'un des deux n'est point umbiliqué'; un de l'espèce de ce dernier, V. Fam. dépouillé & d'une belle nacre; un petit, d'est-limaçons. péce à peu près semblable, verd soncé, marbré de blanc; deux petits Burgaux de la forme des précédens, sauves, nués de verd, umbiliqués & légérement striés; un à robe marron clair, chargée de grandes taches blanches, & de huit lignes circulaires, ponctuées de blanc, nommé en Hollande le Turban Turc 2; le même dépouillé & d'une belle nacre, & deux blancs, à 74, n°-14. quatre orbes poin illés de pourpre, à stries granuleuses & à gros tubercules 3.

che d'argent d'une grandeur extraordinaire & de couleurs très-vives; une Veuve, un Limaçon dépouillé 4; deux percés à jour en diffé- 4 séba, tab.
rens sens, pour donner la facilité d'en observer 74, n° 7.

le dedans, & un opercule d'Olearia.

bouche ronde, dont douze variétés; fçavoir, un grand d'Olearia, blanc & lisse en dessus, à spirale fauve en dessous; un moins grand, de saumph. tab. forme plus bombée, à stries sines & onduleuses couleus sont litt. A. fommet 7; deux aurore, nués de brun vers le litt. A. sommet 7; deux autres couleur de chair dans 20, litt. G. le bas, noirs aux sommets, qui ont appartenu à solit. G. les Bouches d'or; un blanc légérement strié, litt. L. lisse & verd d'Eméraude au sommets si ceux litt. M.

Hij

granuleux, l'un blanc en dessus, & l'autre blanc LIMAÇONS, nué de fauve dans le bas, verds au sommet:

un grand, blanc, hérissé de tubercules dans sa \* Gualt. tab. partie convexe \*; fix Nombrils de Venus, lisses, 20 , litt. I. convexes vers les bords, mais creux au milieu,

\* Ibid. litt. de couleur rouge, un peu nuée de blanc \*; E, F. Rumph. ibid. litt. C, E. deux autres petits Nombrils de Vénus, blancs & granuleux en desfus; un très-petit, blanc, nué de couleur de chair, & six autres entiérement blancs.

## GENRE SECOND.

LES NÉRITES.

111. A ROIS Nérites des Indes, rares ; sçavoir, une blanc-sale, à stries longitudinales. très-fines & serrées, un peu onduleuses; elle ne différe de la petite oreille blanche sans trous, de l'article 49, que par fa clavicule plus élevée & sa forme plus bombée \*; une de même es-List. tab. péce, fauve-clair nué de blanc, polie, & dont \$70, fig. 21. les stries ont presque disparu, & une blanche à

coque très-épaisse, à stries fines transversales. à lévre intérieure garnie de dents, & s'extravasant en forme d'excrescence sur toute la base.

116. Trois grandes Nérites umbiliquées, la premiere des Indes, fauve foncé, à quatre fascies blanches, tachetées de flamines brunes en zig-zag <sup>2</sup>; les deux autres nommées Cordonbleu par Dargenville <sup>2</sup>. Celles-ci sont terrestres, V. Fam. & appartiennent à la troisséme Section.

117. Quatre Nérites umbiliquées, par pen- 1 Arg. pl. 7, dans; sçavoir, deux des Indes, nommées Testie. A. C. cules 3, & deux de l'espèce de la premiere de lett. B. l'article précédent, mais un peu moins grandes, lett. V.

118. Deux Nérites rares des Indes, fauves en dessus, blanches en dessous, nommées le Jaune d'œuf applati 4.

blanches, mouchetées de souci 5, & deux Testes de souci 5, & deux Testes de souci 5, & deux Testes de souci 5 de so

voir, deux Grives 6, deux Mammelons blancs 7, 6 Arg. pl. 7, & deux umbiliquées, nommées en Hollande Jau-lett. B. 7 Ibid. lett. nes d'aufs 8.

121. Dix Nérites par pendans; sçavoir, deux tab. 22, lit. A. à lévre intérieure garnie de deux dents, surmontées d'une tache rouge, & nommées pour cela Quenottes saignantes 9; deux blanches, 9, Arg. pl. 7, nuées d'incarnat, à quatre zones blanches, ta-lett. H. O. chetées de roux, & umbiliquées 10; deux de l'espéce des premieres de l'article 119; deux Jau-160, nº.; nes d'œufs, & deux Grives, dont une à stries fines, quoiqu'à larges cannelures.

122. Deux Nérites des Indes, rares, blanc de lait, lisses, à quelques plis près qui regnent autour de leur spirale, umbiliquées, à appen-

dice naissant du milieu de la lévre intérieure, & V. FAM. se plongeant dans l'umbilic, & à angles des lé-LIMAÇONS. vres, très-saillans.

123. Six Nérites des Indes, par pendans; sçavoir, deux rares de la Chine, fauve roux, à trois bandes longitudinales blanches, & umbili-\* Arg. pl. 7. quées \*; deux Mammelons blancs, & deux Mammelons souci, à tête & base blanche, ce qui

les rend rares. 124. Douze Nérites des Indes, par pendans, sçavoir, deux blanches, à trois bandes longitudinales, bariolées de canelle, dont les intervalles \* Gual. tab. sont ponctués de même, & umbiliquées \*; deux blanches, picotées de marron clair, à tête éle-\* \* 1bid. litt. vée, & umbiliquées \*; deux à groffes stries lon-

N. Arg. pl. 7, gitudinales noirâtres, & cannelures profondes jounâtres, à lévres intérieure & extérieure gar-\* Arg. pl. 7. nies de dents \*; deux marbrées par grandes talett. I. ches de blanc & de verd noirâtre, à stries fines

67. litt. Q.

\* Ibid. lett. E. & égales \*; deux Mammelons blancs nues de couleur de chair, & deux Quenottes saignantes des plus vives couleurs.

125. Quatorze Nérites des Indes, par pendans; sçavoir, deux gris de lin, à trois bandes longitudinales blanches \*, & dont une conserve \* Rumph. (ab. 22. no. 2. fon opercule; deux blanches à stries longitudinales raboteuses, à lévres garnies de dents, confervant toutes deux leurs opercules; deux blanches, tachetées de noir, & à cannelures larges

& profondes \*; deux semblables aux deux premieres de l'article précédent; deux comme les V. Fam.
septieme & huitieme du même article; deux Limaçons.

\* List tab.

\* Mammelons, l'un blanc, l'autre fouci, & 599. fig. 15.
deux très-belles Quenottes saignantes.

126. Vingt-deux Nérites, par pendans; sçavoir, deux des Indes, à stries longitudinales noires, & cannelures grises plus ou moins profondes, dont une avec son opercule; deux d'Amérique, noires, ponctuées de jaune pâle \*; \*Arg. pl. 7. quatre petites de la Méditerranée, jonquille, de n°. 4. forme renssée \*; quatre autres, marron sascié \* List. tab. de fauve clair \*; deux de l'espéce de la troisseme \* List. tab. de fauve clair \*; deux de l'espéce de la troisseme \* List. tab. de fauve clair \*; deux de l'espéce de la troisseme \* List. tab. de fauve clair \*; deux de l'espéce de la troisseme \* List. tab. de fauve clair \*; deux de l'espéce de la troisseme \* List. tab. de fauve clair \*; deux de l'espéce de la troisseme \* List. tab. de fauve clair \*; deux de l'espéce de la troisseme \* List. tab. deux de la quatrieme de l'article précédent; deux 40. grandes Quenottes saignantes d'Amérique; deux grands Mammelons blancs; deux Jaunes d'œufs; & deux Grives.

127. Quatorze Nérites, par pendans; fçavoir, deux de la Méditerranée, blanc de laît, à fix orbes renflés, à tête un peu élevée, & umbiliquées \*; deux des mêmes parages, & de forme femblable aux précédentes, mais d'un brun 67. lin. E. verdâtre; deux de l'espéce de la premiere de l'article 116; deux à peu près semblables aux septieme & huitieme de l'article 124; deux grandes Quenottes saignantes; deux Jaunes d'æus, & deux Grives.

128. Dix-huit Nérites, par pendans; fçavoir, deux des Indes, à fond blanc picoté de

Hiv

V. FAM. LIMAÇONS. \* Arg. pl. 7. lett. N. \* Adanf. Hift. 13. fig. 4. \* Lift. tab. 5674 fig. 17.

noir, & à deux larges zônes noires\*; deux petites des Indes, blanches, tacherées & ponetuées par zônes de roux, & umbiliquées; deux blanche, ondées en zig-zag de fauve roux: du sénég. pl. c'est le Gochet de M. Adation \*; deux à robe noire; deux pe ites, jonquilles, semblables aux quatre de l'article 126; deux Quenottes saignantes; deux grandes Grives; deux Jaunes d'œufs, & deux Mammelons blancs.

> 129. Huit belles Nérites des Indes; scavoir une blanche, marbrée de fauve clair, à trois larges bandes longitudinales cramoifies; deux à trois bandes pourpre, & bariolées de blanc & de verdâtre; une de même espéce, mais à bandes plus prononcées, & taches verdâtres isolées; une gris de lin, tachetée par zône de brun & de verd céladon, à quatre orbes de forme bombée, à bouche nacrée & doublée en dessus de blanc mat; ce qui a fait nommer cette Coquille Bouche double ; une de même espèce, dépouillée, d'une belle nacre, à tête verd d'émérande & à stries circulaires bien prononcées; deux blanches, umbiliquées, à lignes roussâtres,

\* Lift. tab. transversales & onduleuses \*, & deux Quenot-\$59. nº. I. tes saignantes.

> 130. Sept Nérites des Indes peu communes; sçavoir, deux à bandes longitudinales, alternatives blanches & noires, & à tête aurore; une àbandes alternatives noires & blanches nuées de

lilas; deux de même espéce, dont les bandes noires & blanches font marbrées de jonquille dans l'une, & de jaune dans l'autre 1; deux l'Arg. pl. 74. LIMAÇONS. Bouches doubles; plus fix petites Nérites, à lé-lett. M. vre extérieure non garnie de dents, de Lister; qui font, la blanche à lignes noires fines, onduleuses, ombrées 2; celle à lignes larges, blanches & noires alternatives 3; celle à taches jau- 3 lbid. fig. nâtres 4; l'ondulée 5; la réticulée 6; & la blan- 25; lbid. fig. 131. Deux petites Nérites des Indes, & ra-27.

res, dont une blanc fale nué de gris, à ffries 18. 11 lid. fig. transversales onduleuses, & à un rang d'épines 7 libid. fig. couronnant son premier orbe; on la nomme Epineuse 8; & une blanche, nuée dans deux 8 Rumph. tab. 22. lit. Of bandes longitudinales de jonquille pâle, umbiliquée & à ffries longitudinales & transversales, piquées, partout où elles se croisent, d'un petit

point creux.

132. Vingt-une jolies Nérites, d'especes, formes, couleurs & marbrures déja décrites, & très-variées.

133. Idem.

- 134. Trente-quatre Nérites, d'espéces, formes & couleurs non moins variées que les précédentes, dont deux d'une beauté singuliere, à trois zones orangées, & tachetées de verd & de noir sur un fond blanc.
  - 135. Deux cartons contenant foixante-

V. FAM. LIMAÇONS.

feize petites Nérites des Indes & d'Amérique, d'un très-beau choix, & d'une très-grande variété.

136. Deux cartons contenant cent trente Nérites, plus petites encore que les précédentes, des mêmes parages, & non moins variées.

137. Quatre Nérites des Parages de Hollande, recouvertes d'une incrustation grise granuleuse & épineuse, qui paroît être un ouvrage de Polype; l'une est occupée par un Bernard l'Hermite. Six petites Nérites de Lister \*. Un carton contenant soixante - quinze

\* Lift. tab. Nérites choisses & très - variées. Une petite 605 fig. 31.88 tab. 606 fig. boëte de semences de Nérites de la Barbade, 34.455.36.376 d'un verd clair. \* Une autre de petites Nérites 38.

\* List. tab. du Brésil, bariolées de diverses couleurs, & con. sig. 18. nommées Pois de Mer. Une grosse Nérite fauve découpée en spirale pour en faire voir le dedans, & six opercules de Nérites de distérentes gran-

\* Gualt. tab. deurs, dont trois variétés \*.

70. litt. P. Q. Rumph. tab. 20. n°. 5 & 6. List. tab. 560. fig. 4.



#### TROISIEME. GENRE

#### LES SABOTS.

138. Un grand Sabot des Indes, à base applatie, nommé l'Escalier ou le Cadran \*.

V. FAM. LIMAÇONS. \* Séba, tab.

139. Un Cadran semblable au précédent.

40. nº. 1 & 2. 140. Un grand Cadran de la Côte Coromandel, à stries transversales, plus profondes, à taches moins régulières & plus grandes que celles des précédents, dont il est une variété \*.

\* Ibid. no.

141. Deux Cadrans d'une troisiéme variété,

& moins grands que les précédens \*.

142. Quatre Sabots de forme peu élevée: 13 & 14. Arg. sçavoir, deux d'Amérique umbiliqués, l'un blanc nacré, & l'autre verd nacré, appellés l'Eperon, tous deux grands dans cette espéce \*; & deux Cadrans de moyenne grandeur, de l'espéce de ceux des articles 140 & 141.

\* List. tab. Arg. pl. 8. let.

143. Neuf Sabots; sçavoir, deux des Indes H. à stries granuleuses, à bouche nacrée, & à umbilic, connus sous le nom de Bouton de camisole \*; deux de la Méditerrannée, aussi um lett 1. Q. List. biliqués, & de l'espéce nommée Sorciere \*. Un pl.637. fig.25. Eperon semblable à ceux de l'article précédent, lett. S. à sa couleur près, qui est nuée de citron, de verd & de blanc. Deux autres petits Eperons fauve - clair, de forme fort élevée, & sans

v. Fam. de l'article 141.

\* Séba. tab. 144. Dix Sabots par pendans deux à deux; 59. nº. 5 & 6. fçavoir, deux Eperons de moyenne grandeur Rumph. tab. & de la premiere variété; deux de la feconde variété, mais à pointes moins faillantes, dont un dépouillé. Deux Boutons de Camifole, deux Sorcieres & deux Cadrans.

145. Deux Sabots des Indes, rares & en pendant; l'un blanc-sale, mêlé de verdâtre, de forme conique un peu élevée, à stries longitudinales larges & un peu onduleuses, à trois tours de spire, à bords dentelés & à base

\* List. tab. concave \*; l'autre nué de verd & de gris-617. fig. 13. de lin, de forme conique plus élevée, à stries longitudinales moins larges & moins prononcées, à sept tours de spire, à base très-concave, & umbiliqué.

146. Deux Sabots d'Amérique, de forme conique, à robe recouverte de diverses sortes de coquilles, ou fragmens de Coquilles, de Madrépores, de Cailloux, &c. à orbes renflés, raboteux, comme hachés à coups de marteau, & se recouvrant l'un l'autre de haut en bas, à base très-concave, & striée en spirale, & de l'espéce nommée en France Fripiere, & en Amérique Conchiliologie. Ceuxci font très-grands dans leur espéce.

147. Trois Fripieres moins grandes que les précédentes, dont une chargée d'un grand V. FAM. nombre de très - jolies Coquilles, & les Limaçons deux autres en pendant, moins chargées de Coquilles, mais sur chacune desquelles on voit un Fongipore de l'espéce nommée Œillet de Mer.

. 148. Deux Sabots des Indes & très-rares, noirs, à sept orbes bombés, à stries longitudinales, obliques, onduleuses, croisées irréguguliérement par d'autres transversales, à base fauve dans l'un, fauve nué de noir & de verd d'éméraude dans l'autre, & à bouche d'une très-belle nacre.

149. Douze Sabots par pendans deux à deux, sçavoir, deux des Indes à tête élevée, & à plufieurs étages chargés de tubercules finissant en pointe, qui les ont fait nommer la Pagode ou le Toit Chinois \*; deux de la Méditerranée de forme \* Arg. pl. 8; moins élevée, à cinq orbes renflés, & cou-lett. A. Rumph. tab. ronnés de tubercules longitudinaux en forme 21. litt. A. de plis, à bouche nacrée, & à lèvre inférieure bordée d'aurore \*; deux de même espéce dépouillés & nacrés : deux Sorcieres, deux Boutons 3. nº. 11. de Camisole, & deux Cadrans.

150. Huit Sabots; sçavoir, deux grands umbiliqués, à tête élevée, de l'espéce nommée Cul-de-lampe, & qu'on appelle plus particuliérement Bouton de la Chine \*, l'un desquels \* Arg. pl. 9,

est dépouillé de distance en distance jusqu'à lana cre. Deux verds & blancs, dont toutes les spires W. FAM. LIMAÇONS. sont chargées de petites tuiles couchées de haut

\* Gualt. tab. en bas, un peu saillantes, & à bouche nacrée \*. 62. litt. H. Deux de l'espéce des troilième & quatriéme de l'article précédent, dont un conferve son opercule, & deux des Indes, verd nué de blanc, à robe réticulée, & à grosses côtes obliques on-

\* Arg. pl. 8. duleuses \*. lett. I.

151. Deux Culs-de-lampe de l'espéce des deux premiers de l'article précédent, mais plus grands.

152. Deux autres de même espéce, mais à base plus large, l'un desquels est taché par flammes plus grandes & moins confuses; l'autre est en partie dépouillé jusqu'à la nacre.

153. Cinq Culs-de-lampe moins grands que les précédens: sçavoir, un blanc, fauve & verd, à stries circulaires granuleuses \*: un à-. \* Gualt. tab. peu-près de même forme, & dépouillé en ligne spirale, & trois umbiliqués, dont un à spirale bordée d'un cordon de tubercules \*, & rab. 21. n°. 3. les deux autres de l'espéce de ceux de l'article

\* Rumph.

co. litt. M.

151.

60. litt. C.

154. Seize Culs-de-lampe de moyenne grandeur : sçavoir, deux Toîts Chinois de nos mers, verdâtres, nués de blanc-sale, à étages moins saillans, & à moins vivé arrête que ceux des \* Gualt. tab. Indes \*; deux Culs-de-lampe verds nués de blanc, à base dentelée, & à tours de spire, chargés de tubercules \*. Deux des mêmes V. FAM. couleurs, à base plus large, granuleuse & den- \*Gualt, tab. telée, à stries tuberculeuses, & umbiliqués\*; deux 60. Jitt. N. \* Ibid. litt. O. à flammes longitudinales, alternatives blanches &rouges, à stries granuleuses, & umbiliqués \*: \* Ibid. tab. deux marbrés de blanc & de verd, de forme 61. litt. E. un peu renflée, à stries granuleuses & tuberculeuses, aussi umbiliqués \*; deux à flammes lon- \* Ibid. litt. gitudinales alternatives blanches & vertes, à DD. fries granuleuses, & à base un peu concave \*: \* List. tabé deux de l'espéce du premier & des deux der- 631. fig. 17. niers de l'article précédent, & deux dépouillés.

155. Dix-neuf Culs-de-lampe de moyenne grandeur, & au-dessous; sçavoir, deux lisses marbrés de rouge & de violet, à orbes féparés par un cordon \*; deux à stries fines circulaires, \* Gualt. tab. marbrés de blanc & de jaunâtre \*; deux couleur de souci, lisses & à bouche moins com-G. primée \*; deux rose-seche, à stries circulaires fines & granuleuses, à base un peu con-L. vexe, tachetés çà & là de petits points rougeâtres \*. Un rare à stries circulaires blanches & ficelées, & à cannelures noires, chargées elles- M. mêmes de stries obliques très.-fines, à base platte, & umbiliqué. Deux petits à robe-grife tachetée de violet-foncé, à cinq étages de spire bombés & détachés, à côtes longitudinales un peu tuberculeuses, & umbiliqués, Un cou-

\* Ibid. litt.

V. FAM. LIMAÇONS.

= leur de rose, à larmes blanches disposées réguliérement & à distances égales autour de sa spirale, à stries circulaires, fines & granuleuses, & umbiliqué. Un marbré de blanc & de rouge, à stries circulaires granuleuses & tuberculeuses. Deux tachetés de verd, de noir & de violetclair, à stries cordelées, à base renssée. & à bouche nacrée, doublée de blanc mat, ce qui les fait nommer Bouches doubles, & quatre dépouillés, dont deux umbiliqués.

156. Neuf gros Sabots, sçavoir, deux d'Amérique blancs nués de couleur de rose pâle & de verd, à cinq orbes renflés, bordés chacun dans le bas de trois cordons, tuilés de distance en distance, & chargés de stries & de plis tuberculeux, à base striée & tuilée circu-\* Séba, tab. lairement, & à bouche dentelée \*; deux

Culs-de-lampe de l'Isle de France, blancs nués de verdâtre, de forme conique très-élevée, à côtes tuberculeuses faillantes le long de la spi-\* Bonan, cl. rale & à base dentelée \*; un du même endroit,

3. fig. 90.

gris verdâtre, à groffes côtes longitudinales obliques, disposées de façon que celles d'un pas répondent aux cannelures de l'autre pas, à base striée circulairement & dentelée; deux comme les troisiéme & quatriéme de l'article 149, & deux comme les derniers de l'article 150.

157. Trente-deux jolis Sabots de couleur &

de

de formes très-variées, & des espéces déja décrites: sçavoir, dix Cul-de-lampes gran leux, V. FAM. dont deux dépouillés ; huit lisses, dont quatre dé- Limaçons. pouillés; quatre striés, dont un dépou llé & un découpé en spirale pour faire voir le dedans; deux Toits Chinois de nos mers, deux Cadrans, deux Boutons de Camisole, deux Bouches doubles, & deux petits Sabots de l'espéce des troisiéme & quatriéme de l'article 149:

158. Neuf Limaçons rares; sçavoir deux des parages de Mississipi, violet trèsfoncé, lisses, à cinq orbes renssés, & à tête orangée, l'un desquels est dépouillé en partie jusqu'à la nacre, qui est striée circulairement & d'un bel orient ; fix Magellaniques papyracés, perlés & à stries circulaires très - fines. dont deux à petites zones couleur de rose; deux à raies noires circulaires, & deux blancs; un gris-noirâtre des Indes, à grandes taches blanches quarrées, placées à distances égales dans le bord supérieur de chaque orbe, & à mouchetures blanches dans le reste, à stries circulaires très-fines, de forme un peu applatie, à fix orbes, dont le premier est très-large & umbiliqué.

159. Deux cartons contenant 120 petits Sabots des Indes, tous de même forme, un peu applatie, de couleurs, marbrures & desseins extrémement variés.

Tome I.

160. Idem.

V. FAM.

161. Quatre très-grands Cul-de-lampes : Limaçons. scavoir, un blanc flambé régulièrement de rougeâtre, à orbes renflés dans le bas, un peu concaves dans le haut, & à base un peu convexe; un à flammes plus irrégulières de l'espéce du premier de l'article 150, auquel adhere un Madrépore, & deux dépouillés & découpés en spirale pour en faire voir l'intérieur.



### SIXIEME FAMILLE.

#### BUCCINS.

E sont des Coquilles contournées en volute, à plusieurs spirales, dont la plus Buccins. basse est beaucoup plus grande que les autres; ce qui les rend grosses par le milieu. Elles sont ordinairement dépourvues de pointes & de tubercules. & ont toutes une grande bouche oblongue qui est ou entiere, ou échancrée, ou terminée par une queue plus ou moins longue, d'où nous les diviserons en quatre genres; scavoir,

- 10. Les Buccins à bouche entiere, dépourvue de queue.
- 2°. Les Buccins à bouche échancrée, dépourvue de queue.
- 3°. Les Buccins à bouche garnie d'une queue peu longue.
- 4°. Les Buccins à bouche garnie d'une longue queue.

VI. FAM. Buccins.

Les Naturalistes ont été fort peu d'accord jusqu'à présent sur la distribution de cette famille, qu'ils ont aggrandie ou resserrée, suivant l'idée plus ou moins étendue qu'ils attachoient au mot Buccin, qui, de lui - même, est assez vague. Nous aurions bien desiré suivre une autre route, en partageant cette nombreuse famille en plusieurs autres petites, dont les caracteres auroient été plus précis; mais, comme nous n'avons dessein que de jetter un peu d'ordre dans ce catalogue, & non de faire un traité de Conchiliologie, nous avons cru qu'il suffiroit de suivre les divisions déja reçues, en y faisant les changemens qui nous ont paru indispensables.



#### GENRE PREMIER.

BUCCINS A BOUCHE ENTIERE, DÉPOUR-VUE DE QUEUE.

162. Un Buccin des Indes, revêtu de son épiderme marron à huit orbes, à bouche cou- VI. FAM. leur de chair garnie de deux dents, & de for-Buccins. me approchante de celle d'une oreille, ce qui l'a fait nommer Oreille de Midas, il est très-grand dans son espéce \*.

\* Arg. pl.

163. Une Oreille de Midas de l'espèce de la 10. lett. G.

Séba, tab. 71. précédente, & de même grandeur, mais dé-fig. 21 & 22.

pouillée, & d'une belle couleur de chair.

164. Deux petites Oreilles de Midas, dont une grise à stries longitudinales onduleuses & granuleuses, à bouche blanche garnie de deux dents, & à quatre orbes seulement \*; l'autre est \* List. tab. 326 semblable, mais dépouillée. fig. 30.

165. Cinq petites Oreilles de Midas; sçavoir, deux flambées de blanc & de marron-clair dans le corps, à levres retroussées en dehors, l'extérieure finueuse & l'intérieure armée d'une seule dent : deux fasciées de blanc & de marron-clair à tête peu élevée, à bouche garnie de deux dents, & imitant encore mieux que les précédentes la forme d'une oreille \*, & une légére- \* 181d. tab.

VI. FAM. garnie d'une seule dent, & nommée Ave-Buccins. line \*.

835. fig. 58.

166. Quatre Buccins de forme à-peu-près femblable aux précédents, & nommés pour cela fausse Oreille de Midas; sçavoir, deux de Cayenne, dont un fauve-clair, & l'autre fauve-nué de gris-de-lin, à stries fines longitudinales, à cinq orbes un peu bombés, à bouche

\* Ibid. tab. plus large que l'Oreille de Midas & fans dents \*; \$\$\frac{5}{6}\text{ta}\_1, pl. 71. un de Rio de la Plata, qui ne differe de ceux-

ci que par ses orbes moins renflés, & sa couleur orangée, & un de Rio-Janeiro, à orbes plus renflés que tous les précédents, revêtu de son épiderme, fascié par bandes longitudinales de fauve clair & de sauve roux. Ces Coquilles, ainsi que celles des articles 162, 163 & 164 sont terrestres, & nous ne les avons mises ici, que pour saire voir sous un seul point de vue, toutes les variétés de cette espéce de Buccins.

167. Deux Buccins à orbes renflés, & nommés *Perdrix rouges*, l'un flambé de blanc & de \*5%a pl. 71. rouge-brun & dépouillé \*, l'autre avec fon épi-

fig. 2 & 3. Lift. tab. 572. derme marron-foncé.

£. 520

168. Deux autres Buccins, dont un revêtu de fon épiderme, à raies longitudinales onduleufes, alternativement blanches & rouge-brun,

\* Siba, ibid. & grand dans son espèce, nommée le Zebre ou fig. 4 & 5. Append, l'Ane rayé\*; & une Perdrix rouge, semblable pl. 2. lett. L.

à celles de l'article précédent, mais dont on a coupé une portion du premier orbe & la co- VI. FAM.
BUCCINS. lumelle entiere.

169. Une Perdrix rouge & un Ane rayé, moins grands que les précédens.

170. Deux Buccins de la forme des précédens; sçavoir, un à bandes longitudinales, nuées de violet & de bleu, à tête flambée de rouge & de jaune, & à bouche violette \*, & \* List. tab. une Perdrix rouge.

171. Deux Buccins en pendant, de l'espéce du premier de l'article précédent, mais dépouillés de leur épiderme, polis, & devenus par-là d'un couleur de rose très-vis.

172. Vingt petits Buccins; sçavoir, deux peu communs blancs, flambés par bandes longitudinales onduleuses de brun & d'incarnat, à levre extérieure en bourrelet, & intérieure garnie de quatre dents : deux fauves tigrés de blanc, à levre extérieure en bourrelet, dentelée en-dedans, & du reste semblables aux précédens. C'est la Porcelaine de M. Adanson\*; \* Ibid. tab quatre blancs mouchetés par zônes de petites \$18. fig 29. Adanfon, pl. taches ou traits longitudinaux marron, de for-4. f. 1. me semblable aux précédens \*; deux blanc- \* List, tals jaunâtre, l'un flambé, l'autre pointillé de mar-803, sig. 10. ron, à stries circulaires très-fines, & à orbes litt. Q. rensiés \*; deux très-petits de même forme à \* Ibid. robe flambée de blanc & de violet; deux petits 44. litt. Z..

très-singuliers à robe grisatre, poreuse & tuVI. FAM.
Buccins:

berc leuse, où l'on ne remarque aucunes spires, & à très-petite bouche ovale, nommés

Mures de haies; deux verd-bleuître à levre extérieure en bourrelet, & intérieure garnie de
quatre dents, & à tête se consondant avec le
corps; deux plus petits, qui ne différent des
précédents qu'en ce que la levre extérieure est

\* List. tab. garnie de cinq dents \*, & deux gris légerement salciés, privés totalement de tête, &
à levre garnie de trois dents.

# GENRE SECOND.

BUCCINS A BOUCHE ÉCHANCRÉE, DÉ-POURVUE DE QUEUE.

173. We Buccin très-rare rayé par zônes alternatives de blanc & d'orangé-vif, à tête affez élevée, à clavicule blanche, finissant en bouton, & nommé Pavillon d'Orange \*; il est de la plus parsaite conservation, & porte deux pouces cinq lignes de long, sur un pouce trois lignes de large.

174. Deux Buccins des parages Magellaniques, rares & en pendant, à robe marronfoncé, à stries transversales tuilées, alternativement plus ou moins élevées, à levre extérieure

dentelée & armée en-dedans vers l'extrémité insérieure d'une dent saillante, ce qui leur a fait VI. FAM. donner le nom de Licorne.

175. Deux Buccins en pendant peu communs, blancs, à grandes taches marron, dispoiées par zônes, & paralleles les unes aux autres, umbiliqués, & des plus grands dans leur espéce \*.

\* Séba pl. 735 Bonan. cl. 39 nº. 70.

176. Deux Buccins femblables aux précé-n°. 23 & 26. dents, mais moins grands.

177. Deux Buccins blancs, flambés & tachetés de fauve, & de même forme que les précédens, à cela près, que les pas en sont plus creusés en-dedans en forme de fillons \*.

\* Séba, ibid. n° - 21 & 22.

178. Dix Buccins; sçavoir, un rare blanc Bonan. cl. 36 à stries circulaires, les unes élevées, les autres pl.17, lett. Ma non, à côtes longitudinales rabotteuses, à fix orbes terminés par des pas applatis, sur lesquels les côtes se prolongent, à levre extérieure dentelée & à umbilic ; deux gris à stries fines circulaires, à côtes longitudinales obliques, qui s'étendent depuis la clavicule jusqu'à la moitié du corps, & à pas des orbes arrondis \*; deux de forme à-peu-près semblable aux premiers 37. n°. 76,77. de cet article, mais à stries plus fines & plus serrées en vive arrête, & un peu tuilées \*; un blanc nué de fauve-roux, à robe réticulée, & 896.f. 16. à levre intérieure garnie de deux dents \*; un ventre de biche à stries circulaires, dont les in-850. &

tervalles font remplis d'autres plus fines, à pas VI. FAM. des orbes arrondis, & du reste semblable aux précédens, aux dents près, dont il est dépourvu; deux blancs à stries circulaires peu prononcées, & à cinq orbes, dont les pas sont un peu concaves en se relevant, & un de l'espèce de ceux de l'article 177, mais différem-

\* Séba, pî. ment tacheté \*.

deux rares, blancs nués de fauve, à stries circulaires fines & serrées, à levre extérieure, si-\* List. tab. nissant en un bourrelet, & dentelée en-dedans \*;

deux de même couleur à firies circulaires ficelées & ondées, féparées par de larges canne-\* 56ba, tab. lures, à cinq pas applatis, & umbiliqués \*; un

fauve nué de gris à groffes stries longitudinales granuleuses, fort distantes les unes des autres, à fix orbes, dont les pas sont un peu applatis; un fauve blond, à robe en réseau granuleux, ventru & à huit orbes; quatre, dont deux blancs & deux gris, à côtes longitudinales, & à levre intérieure, retroussée jusqu'au haut du premier

\* List. tab. orbe \*; un très-petit à une bosse sur le dos, & à rebroussement de la levre jusqu'au haut du

\* Ibid. tab. troisséme orbe \* ; quatre blancs , dont deux 971. s. 26. fasciés de souci , & deux partie de souci & partie de marron ; quatre , dont deux blancs & deux marron à stries sines circulaires , tuilées; deux fauves ventrus à pas des orbes bordés

d'un rang de taches marron 1, & deux fauves roux, dont un lisse à trois côtes longitudinales VI. FAM. blanches, & un à stries circulaires bien pro-Buccins. noncées: plus, un collier dont les Indiennes se 1 List. tab. parent, fait de petits Buccins, dont le rebroufsement des levres s'étend jusqu'à la clavicule.

180. Vingt-cinq autres petits Buccins intéressans; scavoir, deux blancs marbrés par grandes taches de fauve roux, granuleux par bandes longitudinales 2; deux des mêmes fond 2 Gualt, tab. & forme que ceux-ci, à lignes circulaires ca- Argen. pl. 9. nelle & lisses, aux derniers orbes près, qui lett. I. font striés en longueur 3; deux fauve-roux & , Rumph. marron, à côtes longitudinales chargées de tab. 29. litt. P. stries onduleuses 4; deux blancs & fauves, nués 4 Ibid. litt. de marron, à robe réticulée, & à levre garnie de dents 5; deux blancs fasciés de marron, s List tabe à stries circulaires noueuses 6; deux petits noirs 965, f, 21 6 Ibid, tab. de la Barbade 7; deux fasciés par zônes alterna- 969. f. 23. tives de blanc & de noir 8; un blanc strié, & 976. f. 32. fascié de zônes noueuses ma ron 9, deux mar- 834. f. 61. ron, fasciés de lignes blanches, à côtes longi- 954 fig. 5. tudinales & stries fine: transversales \*; deux de \* Gualt. tab. même forme, mais entierement marron; un 44. litt. C. blanc à côtes longitudinales chargées de stries transversales onduleuses & bien prononcées; un gris-de-lin à stries circulaires fines & granuleuses; un fascié de taches alternatives blanches & marron, à stries circulaires très-fines

VI. FAM. Buccins.

entre quelques autres plus groffes; un marbré de blanc & de marron à stries circulaires peu prononcées, & deux lisses, verdâtres, à pas des orbes granuleux.

181. Un grand Buccin Magellanique rare, blanc, nué de fauve & de jaune, avec quelques zig-zags marron, de forme allongée, à fept orbes terminés par un mammelon, à levre intérieure garnie de trois dents & à robe lisse chargée de quelques plis ou rides.

182. Un semblable, à cela près que les rides en sont nuées de verd-clair, & que les zig-

zags n'y paroissent point.

183. Deux Buccins blancs tachetés par zônes, l'un de rouge sanguin & de l'espèce nome \* Arg. pl. 9. mée Thiare ou Couronne Papale \*; l'autre d'outet. E. Séba, tab. pl. 9. . . . . . . rangé, & connu sous le nom de Mitre \*, tous l'arg. pl. 9. deux de la grandeur de ceux que nous citons ibid. n°. 13 & dans Séha.

184. Une Thiare un peu moins grande que 1860, ibid. la précédente 3, & une Mitre de même grande deur.

185. Cinq Buccins moins grands que les précédens ; sçavoir , un lisse ventre de biche 4 List. tab. nué de blanc, nommé l'Ivoire ou Mitre jaune 4; 974- s. 29. trois autres Mitres , dont une semblable à celle de l'article précédent , une à fries signification

de l'article précédent; une à firies circulaires 5 56ba, pl. 50. flambée de taches rougeâtres, nommée en n°. 49. List. Hollande *Thiare bâtarde* 5; une légerement tab.822.640. friée & mouchetée par zônes circulaires, de taches rouge-brun, nommée la Cardinale \*, & VI. FAM. une Thiare femblable à celle de l'article précé-Buccins.

\* Séba, pl. \* Séba,

186. Sept Buccins, dont deux petites Thia-50. List. tab. res par pendant, marbrées de jonquille, de \$338. n°. 65. blanc & de roux, à stries circulaires piquetées \*56ba, pla de petits trous, espéce rare \*; une autre va-50. n°. 29. riété de Thiare, appellée la Thiare à trous, & les quatre variétés de Mitre de l'article précédent.

187. Sept autres, dont cinq Mitres des efpéces de l'article 185, & deux Thiares de cel-

les de l'article précédent.

188. Dix jolies Mitres par pendans; fçavoir, deux marron à zônes jonquilles, à stries longitudinales vers le sommet, & transversales vers le bas \*; deux blanches, à lignes & ban- \*Gualt. tals des vertes, noires & jaunes, à côtes longitu- 53. litt. E. dinales & stries transversales \*; deux blanches \* 1bid. 54. pointillées l'une d'orangé, l'autre d'orangé & litt. B. de brun, à stries qui se croisent en treillis\*; deux \* 1bid. litt. blanches nuées de verdâtre, fasciées & poin- H. tillées par zônes de rouge, à côtes longitudinales croisées par des stries circulaires \*, & Arg. pl. 9. deux de l'espéce de celle de l'article 183, dont lett. V. les taches sont d'un beau rouge de corail.

189. Vingt-huit petits Buccins par pendans; sçavoir, deux blancs fatciés de verd & de zônes noires interrompues, à côtes élevées, & nommes Minarets 1; deux Minarets à zônes VI. Fam.
Buccins.

Arg. pl. 9.

Lett. Q. Gualt.

Pl. 54. litt. F.

2 Gualt.

Platte 3; deux petits liffes marron, pointillés litt. A.

Jibid. litt. L.

Lift. tab. S19. de gris 4; deux blancs nués de gris, légére
Lift. tab. ment firiés, à pas des orbes granuleux 5; deux

Lift. tab. fauve-clair, à côtes longitudinales chargées de

177. f. 34.

Arg. pl. 9.

Remarks Minarets 1; deux Minarets à zônes

volumes 3 vertes de diveries nuances non inter
rompues 2; deux Beccins liffes à bandes longi
lett. Q. Gualt.

Platter 3; deux petits liffes marron, pointillés

lift. tab.

Lift. tab.

Lift. tab.

Lift. tab.

Lift. tab.

Tries circulaires faillantes en vive arrête 6; deux

Prof. 34.

Arg. pl. 9.

lett. O. Gualt. marron très-foncé, à zônes étroites blanches, & 7 Séba, pl. à côtes longitudinales friées transversalement ?;

49. n°. 42. deux blancs à côtes moins faillantes, pointillés 8 List. tab. de rouge-sanguin 8; deux légérement striés à

bandes longitudinales alternatives blanches & rouge-foncé, avec une zône blanche transver-fale; deux à robe marron-foncé avec une zône blanche; quatre comme les huitième & treizième de l'article 179, & quatre comme les feptième & dix-neuvième de l'article 180.

190. Vingt - quatre autres petits de forme effilée; fçavoir, un verdâtre imitant la corne, à robe réticulée & granuleuse, & extrémités des orbes bordés d'un petit rang de tubercules oblongs; un blanc réticulé, à taches marron de distance en distance sur une bande circulaire de même couleur 9; deux blancs à côtes.

<sup>9</sup> Séba, pl. laire de même couleur <sup>9</sup>; deux blancs à côtes. 49. m°. 19 & longitudinales granuleuses, mouchetées par zônes de rouge; un à robe blanche très-finement réticulée, & à stries circulaires rouges plus faillantes, écartées les unes des autres; VI. FAM. deux blancs marbrés, l'un de jaune-obscur, Bugcins. l'autre de gris-de-lin, à robe réticulée & granuleuse; un lisse blanc, marbré de lignes onduleuses marron-foncé; un Minaret sascié de blanc, de brun, de verd & de bleu-pâle; deux autres de l'espèce des troisiéme & quatriéme de l'article précédent; huit Mitres des variétés détaillées dans l'article 188, & cinq autres Buccins des variétés déja décrites.

#### GENRE TROISIEME.

BUCCINS A BOUCHE GARNIE D'UNE QUEUE PEU LONGUE.

191. N Buccin très - rare, fauve-clair, à fascies élevées & tuberculeuses marron, à stries des intervalles peu élevées, à fix orbes, à trèspetite queue, & à levre extérieure en bourrelet, nommé en Hollande l'Argus fascié \*; il \* Rumph. porte un pouce dix lignes de long.

192. Deux Buccins très-rares & en pendant, blanc-sale, à grosses stries applaties, & néanmoins très - faillantes, à larges & profondes canelures, à quatre orbes, le premier desquels est chargé de trois stries & de deux cannelures.

vi. Fam. cannelure, non compris les pas creusés en-de-Buccins. dans & plats qui les féparent : ces Buccins sont grands dans leur espèce, nommée le Cabestan.

193. Quatre petits Buccins; sçavoir deux lisses à pas des orbes applatis & saillants endehors presque en vive arrête, nommés en \* i.s. Hollande Perrons \*, & deux petits Cabes24. f. 166 tans.

nique, blanc nué de gris-de-lin, à fept orbes renflés, chargé de côtes longitudinales en vive arrête & papyracées, représentant de longues seuilles inclinées toutes vers la levre extérieure, à bouche presque ovale, à petite queue recourbée, creusée en gouriere, & umbiliqué. On le nomme Buccin feuilleté. Celui-ci porte trois pouces cinq lignes de long sur deux pouces deux lignes de large.

195. Deux Buccins de même espéce, mais moins grands.

196. Deux autres moins grands encore que les précédens.

197. Deux Buccins Magellaniques rares, fauve-clair, à grosses stries longitudinales & transversales formant un réz au qui imite les étosses gausrées, à cinq orbes bombés, à clavicule rentrant en-dedans, à queue courte un

peu recourbée & à coque mince; espéce nommée Gaufre.

198. Cinq petits Buccins rares; sçavoir, un Buccins. des Indes blanc & feuilleté, mais différent de ceux de l'article 194 par sa forme effilée, & ses feuilles plus éparfes & moins inclinées; un blanc ventru, feuilleté aussi, mais à feuilles moins faillantes, moins fines & plus serrées; deux Magellaniques blancs nués de fauve, de la forme du précédent, à côtes longitudinales arrondies, & à stries transversales; & un blanc de la Méditerranée, granuleux par compartimens, à queue & partie des levres recouvertes de Corail rouge.

199. Quatorze Buccins, dont dix par pendans; sçavoir, deux rayés par fines zônes de blanc & de brun, à sept orbes un peu bombés & à bouche blanche, nommés Bouches de lait \*; deux blancs, à trois zônes marron-clair, dont 43. litt. X.
Lift. tab. 831. deux sur le premier orbe & une sur les autres, à f. 55. côtes longitudinales & à stries fines transversales, s'élevant sur les côtes; un à-peu-près de même forme, blanc nué de fauve, à côtes longitudinales moins nombreuses & moins prononcées \*; un ventru à stries circulaires marron, \* Bonan. cl. & cannelures fauves, à levre extérieure dentée 3. f. 343. & en bourrelet, & à clavicule rentrante \*; un à \* List. tab. tubercules blancs & cannelures marron \*; deux 940. f. 36. blancs réticulés, à bouche garnie de dents, 828. f. 506 Tome I.

K

VI. FAM. BUCCINS.

& de forme bombée; deux blancs nués de fauve à grosses côtes longitudinales, à stries transversales, & à bouche violette dentelée; deux souci & de même forme, mais à côtes moins élevées & stries circulaires plus grosses, & un très-finement strié, marbré de blanc, de noir & de couleur de rose.

> 200. Quatorze Buccins; sçavoir, huit à stries circulaires granuleuses, interrompues par quelques gros tubercules longitudinaux, à bouche dentelée, & à levre extérieure garnie d'un large bourrelet, mais différens entr'eux par leurs cou-

\* Arg. pl. 9. leurs, qui sont très-vives, & très-variées \*; deux tab. 49. litt. I. Bouches de lait polies; deux comme les troisiéme & quatriéme, & deux comme les douziéme & treiziéme de l'article précédent.

201. Deux Buccins peu communs, blancs, marbrés de quelques taches brunes, à robe réticulée granuleuse, à tubercules disposés comme dans les huit premieres de l'article précédent, & à petite queue retroussée \*.

\* Rumph.tab. 49. litt. G. Lift. tab.1022. f. 86.

202. Un très-rare Buccin du Golfe du Mexique, à robe brune, fasciée dans le premier orbe, de deux zônes jaunes, dont la plus haute blanchissant peu-à-peu, suit la spirale jusqu'à la clavicule, à fix pas larges & plats garnis de petites lames onduleuses, presque perpendiculaires à leur plan, & bordés chacun d'une suite d'ongles ou de serres en forme de crénelures, dont les premieres sont creusées en bec de perroquet; espéce qu'on peut nommer le Buccin VI. FAMA BUCCINS. crénelé.

203. Deux grands & beaux Buccins de l'Isle de France, fauvès marbrés de marron-clair & de blanc, à stries circulaires, inégales, granuleuses, & guelquesois tuberculeuses, à bourrelets, disposés comme dans les deux de l'article 201, & à petite queue recourbée, creusée en

gouttiere \*.

204. Six Buccins; fçavoir, un rare fauve 49. litt. G. 10. taché de brun & de blanc, à groffes ftries cir-lett. M. Séba, tab. 17. 10. 23 culaires, rangées par paires affez distantes les & 24. unes des autres, à stries longitudinales obliques, peu apparentes, & assez distantes aussi les unes des autres, formant par leurs rencontres mutuelles de petits tubercules, à huit orbes renslés, & autant de pas obliques, à bouche dentelée, & à deux bourrelets longitudinaux \*; un fauve teint de jaune, à quatre orbes applatis, ceints de grosses stries doubles 57. no. 30. peu prononcées sur le corps, à bourrelet situé en arriere de la levre extérieure, qui est en tranchant & non dentelée, & quatre de l'efpéce de ceux de l'article précédent, mais plus petits, dont deux blancs nués de jaune.

205. Vingt-deux petits Buccins par pendans; sçavoir, deux peu communs, dont un blanc & un fauve dans le corps, & marron à la cla-

\* Gualt, tabi

vicule, tous deux à côtes longitudinales un peu finueuses, formant au haut des orbes des cou-VI. FAM. BUCCINS.

ronnes de tubercules, à stries fines transversales, & à huit orbes; quatre blancs, dont deux fasciés de fauve-roux & deux de brun, à stries longitudinales & transversales, formant un ré-

49, litt. E.

\* Gualt. tab. seau granuleux \*; deux lisses, dont un grisatre tacheté par zônes de pourpre, à zône blanche tachetée des mêmes couleurs \*, & un qui

\* Lift. tab. \$22.f. 41. ne differe du précédent que par son fond & ses

taches canelle; deux lisses à robe blanche tachetée par zônes de marron; deux bleu-pâle, marbrés de roux \*; deux blancs à côtes longi-

\* Gualt, rab. 46. litt. F.

tudinales & stries fines transversales, de forme bombée, à huit orbes, & à petite queue retroussée; deux blancs marbrés par zônes de taches jonquilles dans l'un, rousses dans l'autre, granuleux par compartimens, à bourrelet uni couvrant la levre extérieure, & se prolongeant dans une direction oblique fur tous les autres orbes, de forme oblongue, & un peu arquée; deux à-peu-près semblables, mais dont la spirale des bourrelets est composée de plus de révolutions, & quatre de l'espéce des douziéme & treiziéme de l'article 199.

206. Deux grands Buccins des Indes, ventrus, imitant le plumage de la perdrix, à trois rangs de bourrelets, & à levre extérieure

\* Séba, pl. dentelée, de l'espèce nommée Trompe Marine \*,

ou Conque de Triton; ils ont un pied cinq pouces de long, & sont posés sur des pieds de bois VI. FAM. en pendant.

207. Quatre Trompes Marines moins grandes que les précédentes, dont deux de l'Amérique \*, & deux de la Méditerranée.

\* Séba, pl.

208. Six Trompes Marines par pendans, & 81. de grandeur propre à entrer dans des tiroirs \*; \* Rumph. sçavoir, deux des Indes, & d ux d'Amérique, tab. 28. lîtes des plus vives couleurs, les deux autres sont de nos Mers.

209. Deux Buccins; sçavoir, un des Indes peu commun, fauve-roux & recouvert d'un fucus, ventru, à grosses stries noueuses, à lévre intérieure ridée, & extérieure garnie de groffes dents qui laissent de profondes cannelures \*, \* Bonan, cl. & une petite Trompe Marine de la Méditerra-3. n°. 289. List. tab. 936. née, conservant l'animal desséché sortant de la nº.31. Séba, coq ille avec fon opercule.

210. Un très-grand Buccin de l'espéce des Trompes Marines, mais différent des précédens en ce qu'il est d'un blanc-grisatre, à côtes longitudinales & grosses stries transversales, avec un rang de tubercules sur chaque orbe \*; il a \* List. tab. plus d'un pied, sept pouces de long.

211. Deux Buccins de la Méditerranée, blancs nués de fauve, à stries longitudinales & transversales, dont les plus grosses forment un treillis chargé de petits tubercules dans tous les

points où elles se croisent, à deux rangs de bourrelets sur chaque orbe, & à lévre exté-VI. FAM. BUCCINS. rieure frangée & dentelée.\*.

\* Gualt. tab.

212. Trois Buccins, dont deux blancs março. litt. A. List. 12b. 935. brés de roux & rayés de brun, à orbes ceints d'un petit cordon granuleux, nommés en France Tulipes, & en Hollande Agathines, tous deux grands dans leur espéce, l'un desquels conserve

\* Arg. pl. son opercule \* : le troisseme est de l'espèce de

Séba, pl. 71. ceux de l'article précédent. 120, 23-32.

928. f. 23.

213. Quatre Tulipes à fonds & rayes femblables aux précédentes, mais dont deux font marbrées de jaune, & deux d'olivâtre.

214. Quatre autres Tulipes par pendans, dont deux marbrées d'orangé & de fouci clair, & deux de brun obscur.

215. Quatre Buccins; sçavoir, deux blancs nués de fauve clair, à stries circulaires fines & un peu ondées, de forme approchante de celle \* séba, pl. de la Tulipe, & à clavicule en mammelon \*. 52, 10, 70 & deux Tulipes de moyenne grandeur, blanc nué de bleu, marbré de verdâtre, & rayé de même.

216. Cinq Buccins; scavoir, deux à stries circulaires ferrées, & à orbes bordés d'une couronne de petits tubercules, à robe brune, bordée au-dessous de chaque pas de deux zônes blanches, ce qui détermine l'espéce nommée so. Lift. tab. en Hollande l'Ethiopienne \*, & en France la

Minime ou la Cordeliere, l'un desquels a la tête entiérement recouverte de l'espéce de duvet VI. FAM. qu'on nomme Drap marin; un de même ef-Buccins. péce, mais rare, en ce que la couleur en est fauve-pâle, & qu'il est destitué de zônes; & deux Buccins flambés de blanc & de roux, à stries circulaires inégales, & à tubercules plus petits encore que les précédens \*.

\* Arg. pla

217. Deux Buccins rares de l'espéce de la 10, lett. 4 Cordeliere, mais fauve-gris & à plus gros tubercules.

218. Trois Buccins, dont un très-rare qui ne differe de la Cordeliere qu'en ce que le fond en est caffé au lait, que les tubercules s'y remarquent à peine, & que la forme en est plus allongée, & deux Cordelieres de l'espéce des deux premieres de l'article 216, mais plus grandes.

219. Trois Buccins rares, dont deux marron, à stries circulaires, & à sept pas applatis, couronnés de tubercules \*; l'autre est blanc, Arg. pl. 9.
veiné en longueur de rouge-brun, strié circulett. A. Séba,
pl. 57. n°. 27 lairement, à sept pas applatis bordés de petits & 28. subercules, & à tête peu élevée : on le nomme l'Unique, parce que la bouche en est posée à contre-sens des autres \*.

220. Trois Buccins rares; scavoir, deux 907. f. 27. blancs nués de fauve clair, à stries circulaires très fines, à six pas applatis, dont les bords gra-

\* bift taba

VI. FAM.
BUCCINS.
\* Gualt, tab.

47. litt. A.

muleux rentrent en dedans du côté de la columelle, où ils forment un affez large fillon \*; & un de l'espéce des deux premiers de l'article précédent.

221. Quatre petits Buccins, dont deux *Uniques*, & deux de l'espéce des deux premiers de l'article précédent.

222. Deux Buccins rares, ventre de biche, ftriés circulairement, à fept pas, dont les bords

\* List. tab. font chargés de petits tubercules \*; & un de

47. fig. 12.

l'espéce des deux premiers de l'article 220,
mais blanc de lait.

blancs, l'un à stries sines circulaires, l'autre lisse, \* 1bid. tab. de forme élevée, à sept orbes bombés \*; un à stries circulaires très - sines, de forme encore \* 1bid. tab. plus ventrue & moins élevée \*; deux blancs nués de fauve, granuleux en treillis, à lévre extérieure dentelée, & deux rangs de bourrelets

\* Gualt. tab. qui fe prolongent fur tous les orbes \*; deux qui 49. litt. M.
List. tab. 939. différent des précédens par une forme plus alf. 34.
\* Gualt. ibid.
litt. I. deux de l'espéce de ceux de l'article 203; deux
marron-soncé, à une petite zône blanche dans

marron-foncé, à une petite zône blanche dans le bas, ventrus, pesants, à fix orbes, & nommés Plombs; un revêtu d'une incrustation épineuse brune, & où loge un Bernard l'Hermite; deux Bouches de lait; deux Cordelieres; trois Tulipes, dont une découpée en spirale, pour

en faire voir l'intérieur; & cinq opercules de nature cornée, qui ont appartenu à différens VI. FAM., Buccins, dont un très-grand nommé vulgairement Feuille de laurier \*; & cinq autres moins \*Rump. tabs grands, plus ou moins épais, nommés Ongle Gualt. tab.703 litt. B. odorant ou Blatta Bizantia des Apothicaires \*. \*Rumph. ibid. n°. 3.

224. Quatre Buccins blancs, épais & pesants, Gualt. ibid. nommés Marbres (ou Raves,) dont deux à tête litt. C. D. élevée, à lévre intérieure armée de trois groffes dents, & à cinq orbes légérement tuberculeux, fe recouvrant l'un l'autre \*; & deux à tête \* Lift, tabi moins élevée & orbes applatis, à queue moins 815.f. 25.
Gualt. tab.46. longue, & de forme plus ventrue que les pré-lit. C. cédens. Plus, deux petits Buccins peu communs, de forme approchante des précédens, à

stries fines circulaires peu prononcées, à clavicule fort faillante, en forme de spirale cylindrique ou de tire-bourre, l'un à robe blanche piquetée par zônes de points jonquilles, & couronné de petits tubercules \*, & l'autre piqueté \* Rumph.tab. moins réguliérement de points bruns & oran- 36 n°. 7. gés\*.

\* Lift, tab. 225. Trois grands Buccins, dont un blanc- 816. f. 26. sale, à tête peu élevée, à six orbes, dont les pas sont un peu applatis & couronnés de tubercules \*; & deux beaux Marbres, blanc de lait, \*Gualt. tab. évidés en dedans, & gravés en dessus d'une 47. litt. B. espéce de mosaïque : cet ouvrage est des Indiens,

à qui ces Buccins servent de tasse.

VI. FAM. BUCCINS.

\$7 8 58.

226. Deux grands Buccins des Indes, rares: de forme un peu renflée, & à coque épai le blanc de lait, à groffes côtes longitudinales formant dans leur rencontre, avec les plus grands cercles de chaque orbe, de gros tubercules oblongs, à neuf orbes, dont les pas sont légérement réticulés, à lévre intérieure garnie de trois plis ou dents, & à clavicule rentrante & creusée en maniere de tire-bourre.

227. Cinq Buccins, dont un fauve revêtu de son épiderme marron, à lignes circulaires rousses, distribuées deux à deux, & à huit orbes chargés dans leur milieu de tubercules

\* Gualt. tab. nommé le Tapis ou la Robe de Perse \*; deux 46. litt. B. Lift. tab. 931. blancs nués de fauve, légérement striés à sept orbes bordés de tubercules \*; & deux Marbres. €. 26. \* Lift tab. des deux espéces de l'article 224. 884. Valen-

tyn. univ. no.

228. Quatre Buccins, dont deux dépouillés, de l'espéce du premier de l'article précédent. & deux gris qui n'en différent que par leurs tubercules moins prononcés.



# GENRE OUATRIEME.

D'UNE BUCCINS A BOUCHE GARNIE LONGUE QUEUE.

229. N Buccin rare, dont la couleur fauve des premiers orbes s'éclaircit peu à peu dans VI. FAM. les autres, jusqu'à devenir blanche dans les der-Buccins, niers, à stries transversales dans le bas, & longitudinales finement réticulées dans le haut, à bouche garnie d'une queue très menue, creusée en gouttiere, & de l'espèce nommée Fuscau \*. \*Séba pl. 56;

230. Un Fuseau très - rare blanc, nué de no. 3. pl. 106 fauve vers la queue, qu'il a plus longue que le lett. A. précédent, à lévre extérieure garnie de quatre dents, & nommé le grand Fuseau à dents : il porte cinq pouces huit lignes de long, & est de la plus belle conservation \*.

\* Séba, pli 231. Un fuseau blanc à stries fines circulai- 56. nº. 2. Arg. pl. 204 res, de forme moins effilée que les précédens, lett. D.

à neuf orbes chargés dans leur milieu de tubercules, à levre intérieure saillante en-dehors en vive arrête, à très-longue queue, & nommé Quenouille; il a neuf pouces de long \*.

\* Séba, la 232. Une autre Quenouille, qui peut faire Coquille inférieure du mile pendant de la précédente. lieu de la pla

233. Une semblable, mais plus effilée, & VI. FAM, de huit pouces & demi de long. BUCCINS.

234. Deux jolis Buccins en pendant, dont une Quenouille blanche de cinq pouces neuf lignes de long, nuée de fauve-roux vers la columelle, fur les lêvres, & le long de la queue, qui est re-

\*Arg. pl. 3. courbée à l'extrémité \*; & un Fuseau de mêlett. B. me fonds & de même longueur, mais différent en ce que les quatre derniers orbes sont destitués de tubercules, & que la queue est un

\* Lift. 12b. peu contournée. 218.

917. f. 11.

235. Deux Fuseaux, l'un blanc, différent de la Quenouille, en ce que les stries en sont moins prononcées, & les tubercules plus gros

\* Séba, la & plus arrondis \*; l'autre blanc, à stries transcoquille supérieure du mi- versales, & à grosses côtes longitudinales, dont lieu de la pl. les cannelures sont nuées de fauve roux \*. 79. \* Rumph.

236. Deux Fuseaux, l'un comme le pretab. 29. litt.G. mier de l'article précédent; l'autre en differe en ce qu'il est fauve-roux, nué de blanc, que les tubercules en font plus petits, plus minces .& plus nombreux, & les stries circulaires plus renflées.

237. Quatre Fuseaux par pendans; sçavoir, deux blancs tachetés par zônes de brun presque noir, à levre extérieure échancrée dans le \* Lift tab. haut, & nommés Tours de Babel \*; deux qui ne différent des précédens qu'en ce qu'ils sont

entierement blancs, & à stries plus saillantes. On peut nommer cette variété Tour de Babel VI. FAM. blanche \*.

\* Arg. Zno

238. Douze petits Fuseaux, dont dix par morp. pl. 40 pendans; scavoir, un blanc lisse, à pas des orbes, rentrans en-dedans, & à queue peu longue\*; deux semblables au grand de l'article 229; 915. f. 8. deux petites Quenouilles; deux Tours de Babel blanches à taches rouges \*; deux marron noirâtre; deux entierement blanches, & lett. M. une comme les deux premieres de l'article précédent.

239. Quatorze Buccins par pendans; fçavoir, deux à stries circulaires & à grosses côtes longitudinales, dont les rencontres avec le haut des orbes forment autant de couronnes de tubercules, fauves sur les côtes, blancs dans les cannelures; deux nués d'aurore & de jaunepâle, qui ne différent des précédens que par 922. f. 15. leurs stries saillantes sur les tubercules en vive arrête \*; deux bruns-marbrés de blanc à stries \* Arg. pl. 100 circulaires & à côtes longitudinales, un peu con-lett. L. tournées \*; deux blancs, qui ne différent de ceux- \* List. tab. ci que par leur forme moins allongée, & par 921. f. 14. leurs stries circulaires jaune-pâle dans l'un. orangé dans l'autre; deux petits fauves de même forme, mais à côtes longitudinales plus nombreuses; deux blancs à huit côtes longitudinales aurore, un peu contournées, & du

reste semblables aux précédents <sup>1</sup>, & deux VI. Fam. jaune-pâle à tubercules blanchâtres, fasciés de l'une rouge-brun <sup>2</sup>.

920. f. 13. <sup>2</sup> Bonan. cl. 6. f. 145.

### SEPTIEME FAMILLE.

MUREX OU ROCHERS.

VII. FAM. Rochers.

E font des Coquilles en volute qui approchent beaucoup des Buccins, mais qui en différent à plusieurs égards. Leur caractere le plus invariable est d'être presque toujours renssées du milieu plus ou moins allongées vers les deux extrémités, & garnies ou de pointes, ou de tubercules, ou de clouds; ce qui leur a fait donner le nom assez impropre de Rochers. Leur bouche oblongue est ou dentée ou non, & sans queue, ou dentée avec une petite queue, ou aîlée sans pattes, ou aîlée avec des pattes; & c'est ce qui nous fournit la division de cette famille en quatre genres; sçavoir,

1º. Les Rochers à bouche dentée ou non dentée sans queue.

2°. Les Rochers à bouche dentée & à petite queue.

- 3°. Les Rochers à bouche aîlée fans pattes.
- 4°. Les Rochers à bouche aîlée & à pattes.

#### GENRE PREMIER.

ROCHERS A BOUCHE DENTÉE OU NON DENTÉE SANS QUEUE.

240. N grand Rocher de la Jamaïque rare, marbré de blanc & de fouci très-vif dans le corps, à tête & clavicule couleur de chair, à bouche non dentée, à neuf orbes se recouvrant l'un l'autre, & entourés de tubercules peu saillans, nommé en Hollande Pyramide \*.

tubercules pointus, & de l'espéce nommée en

241. Trois grands & beaux Rochers des Indes, 83. no. 14. dont un blanc-sale, & l'autre couleur de chair. marbrés par grandes taches & par traits en zig-zag de fauve-roux & de marron, à bouche dentée & échancrée, à sept orbes couronnés de

VII. FAM. ROCHERS. \* Séba, le dernier rang

de la pl. 67.

Hollande Chauves-Souris, & en France Foul dres \*; & le troisiéme à fond orangé, veiné & taché par zônes de marron-foncé, à levre intérieure dentée, & à couronnes de tubercules, dont les gros se prolongent en forme de côtes sur le dernier orbe, nommé en Hollande l'Hébraique ou Musique bâtarde, & en France Boisveiné \*.

\* Seba, pl. 57. nº. 1 & 2. Arg. pl. 14.

lett. D.

242. Trois autres un peu moins grands : sçavoir, deux Foudres de forme plus raccourcie, à tubercules recourbés en - dedans, & creusés en forme de bec de perroquet \*, & un \* Séba, avant-Bois-veiné, comme le précédent, mais à fond

dernier rang de la pl. 67. \* séba, pl. blanc \*. 57. n°. 3.

243. Trois Rochers; sçavoir, un Bois-veine & deux Foudres, à-peu-près semblables à ceux. de l'article 241.

244. Trois Rochers, dont deux en pendant, & grands dans leur espéce, marbrés de verd, de blanc, de marron & de brun, à deux zônes formées de fix lignes paralleles dans l'un, & de cinq dans l'autre, à intervalle des zônes pointillé de rouge, & connus sous le nom de

416. no. 7 & 8. Musique \* , & un Bois-veiné \*.

Arg. pl. 14. lett. F. \* Séba, pl. 37. nº. 6.

245. Trois autres de même grandeur, dont deux en pendant marbrés de blanc, de bleu & de brun, qui ne dissérent des deux premiers de l'article précédent que par leur forme moins allongée, & par des taches oblongues, noires,

& plus marquées, qui leur ont fait donner le nom de Plein-chant, & un Bois-veiné, à taches VII. FAM. moins foncées que le précédent. ROCHERS.

246. Deux Musiques rares verd - céladon , pointillées régulierement de brun, à cinq petites zônes blanches, pointillées de même, espéce qu'on distingue par le nom de Musique verte.

247. Deux Musiques rares, couleur de rose, & nommées Musiques couleur de rose.

248. Trois variétés de Foudre; sçavoir, deux rares en ce que l'une a deux rangs de tubercules de plus sur le premier orbe \*, & que l'autre \*sela, coq. a les orbes couronnés d'un simple cordon gra- du milieu de nuleux \*; la troisiéme est de l'espéce des deux \* 566a, itid, premiers de l'article 241.

litt. a & b.

249. Six Rochers; sçavoir, trois Foudres, dont un à tubercules en bec de perroquet, & deux de l'espéce ordinaire; deux Plein-chants en pendant, & une Musique à robe réticulée, différente de toutes celles ci-dessus décrites.

250. Sept Rochers; sçavoir, quatre Foudres & trois Musiques, dont une de l'espéce de celle de l'article précédent.

251. Un Rocher de la Chine très-rare, de forme fort renslée, rayé par petites zones de fauve, & de quelques points bruns, à trois rangs circulaires de tubercules tuilés, à six pas applattis, recouverts d'une suite de feuilles

Tome I.

ROCHERS.

couchées, retroussées vers le bord, & comme frisées, à levre extérieure dentelée, & umbiliqué.

252. Un de même espece, mais un peu moins grand.

253. Deux gros Rochers fort renflés, fas-

ciés de bleu sur un fond jaune, à spirale de fix pas se recouvrant l'un l'autre, & séparés par un fillon : le premier a deux rangs de pointes seulement, dont un vers le bas, & l'autre \* Séba, pl. vers la tête \*; le second, qui est très-rare, outre le rang de pointes du bas, en a encore trois autres vers la tête, dont le plus haut paroît s'être replié en forme de feuilles sur les sillons que laiffent entr'elles les deux premieres spires; ils sont de l'espèce connue en France

> 254. Quatre variétés de Lards fasciés & rayés de fauve & de bleu; sçavoir, deux à un rang de clouds vers le bas, & trois vers le haut; un à un simple rang de clouds dans le haut, de même que dans le bas, & un totalement dé-

> fous le nom de Lard, & en Hollande sous ce-

pourvu de clouds.

lui de Toile à Matelas.

255. Trois Rochers, dont un très-rare, blanc de lait, & imitant à cet égard la porcelaine, à Ries longitudinales très-fines, & à côtes peu prononcées en même sens, finissant vers le haut en une couronne de tubercules,

72. nº. 3.

qui se prolongent dans les six orbes dont est composée la spirale, & deux Lards bleuatres VII. FAM. rayés de blanc, l'un à deux rangs \*, l'autre ROCHERS. à trois de pointes dans le haut, & tous deux à 72. nº. 5. Arg. pl. 15. un rang dans le bas. lett. H.

256. Trois Rochers; scavoir, deux d'Amérique blancs, à stries circulaires inégales, à huit orbes tous couronnés de tubercules, à quatre grosses stries tuberculeuses ou tuilées dans le bas & umbiliqués, nommés Aigreires \*, & un \* Lift. tab! Lard à un rang seulement de tubercules dans 810. f. 19.

le haut.

257. Cinq Rochers; sçavoir, un rare blancgrisâtre, à stries fines circulaires, à six orbes & à deux rangs de tubercules mousses dans le corps, dont les plus élevés se prolongent d'orbe en orbe jusqu'à la clavicule; deux Aigrettes différentes des précédentes, en ce qu'elles sont toutes les deux recouvertes en partie d'un Astroite, & deux Lards de moyenne grandeur, l'un à deux rangs de pointes dans le haut, & un dans le bas, & l'autre à un seul rang de pointes, tant en haut qu'en bas.

258. Quatre Rochers; sçavoir, deux noisette-foncé, à stries fines circulaires, dont les canelures font nuées de blanc, à trois rangs en même sens d'épines tuilées sur le corps, dont le plus haut se prolonge dans tous les orbes \*. \* Séba . pl.

décrites, dont une chargée en partie d'un Af-

Rochers.

259. Deux très-belles Aigrettes en pendant, de l'espéce de celles de l'article 256.

260. Deux Rochers des Indes en pendant, noirs marbrés de blanc, à plusieurs rangs de pointes régnans dans toute leur longueur, grands dans leur espèce, & nommés Chausse.

\* Arg. pl. trapes \*, ou Murex à dents de Chien.

f. lett. E. List. tab. 829. f. 51. Gualt. tab. 55. litt. D.

261. Trois Chausse - trapes de moyenne grandeur, dont une blanche marbrée sur les côtes & les pointes de rouge-brun, nué d'orangé, & deux autres en pendant, dont la couleur est plus semblable à celle des précédentes.

262. Trois Rochers des Indes peu com-

muns, dont un marron-clair marbré de blanc, à stries fines circulaires, & deux rangs de clouds, à tête peu élevée & presque entiérement enveloppée dans un retour blanc de la levre intérieure, qui est aussi évasée vers l'extrémité inférieure de la clavicule \*, & deux Chausset trapes des mêmes couleurs que celles de l'art. 260, mais qui en dissérent en ce que la tête n'en est pas élevée, & qu'elles sont destituées de

\* 5éba, pl. 50. n°. 11.

\* Ibid. no. 8. ftries transversales \*.

Arg. pl. 14. litt. P.

263. Huit petits Rochers par pendans; sçavoir, deux blancs à grosses côtes longitudinales bien prononcées & fort écartées, formant

sur les côtes des tubercules plus ou moins gros, à huit orbes applatis, & umbiliqués; deux gris VII. FAM. de forme approchante de celle du premier de ROCHERS, l'article précédent, mais à quatre rangs de tubercules moins saillans; deux Chausse - trapes de l'espéce de celles du même article, & deux Lards, dont un marron, l'autre fouci, tous deux à zônes blanches, & à deux rangs de clouds situés l'un en haut, l'autre en bas.

264. Dix-huit petits Rochers, dont douze par pendans; sçavoir, un très-rare blanc, ventru, umbiliqué, à stries transversales, & cinq rangs de tubercules marqués principalement vers le haut, à tête faillante couleur de noifette, & à bouche couleur de chair; un blancfale, à gros boutons noirs, rangés dans sept bandes obliques & cinq cercles, à bouche du plus beau lilas, étroite & dentelée des deux côtés, & de l'espèce nommée Mure \*; une Mure peu différente, à tubercules marron, & à bou- 804. f. 13. che blanche; deux petites à boutons & grains plus nombreux & plus ferrés, de forme moins renflée, à tête plus élevée, & à bouche violette\*; une blanche ventrue, à bouche fort ouverte, & 254. f. 5. à deux petites taches noires sur la levre intérieure \*; un petit Rocher à stries fines circu- \* Bonan, cl. laires, granuleuses, à robe grise hérissée de tugualt tals 68,
bercules pointus, à bouche couleur de sasran, list. BB.
List. tals. 990. & umbiliqué, nommé en Hollande Hérif-f. 50.

ROCHERS.

son 1; un autre Hérisson, à-peu-près de même forme, mais fauve en-dessus, pourpre en-dedans & sans umbilic 2; deux autres blancs, hérissés de Gualt, tab. pointes fines, marron, fort faillantes, à levres

44. litt. S. 28. litt. R.

<sup>2</sup> Ibib. tab. dentelées & bordées de jonquille<sup>3</sup>; deux blancs-Ibid.litt.N. marbrés de brun-noirâtre, à pointes plus grof-Arg. pl. 10. ses, moins nombreuses, & à tête plus élevée lett. A.

4 Gualt. tab. 43. litt. V.

60. 11°. 38.

que les précédens 4; deux noirs marbrés de blanc, à trois rangs de clouds & à tête éle-5 Séba, pl. vée 5; un jaune-pâle en-dehors, jonquille endedans, de forme applatie, ceint de cinq rangs peu marqués de cordons un peu tuberculeux, qui finissent à la levre extérieure en un double rang de pointes, dont les deux plus hauts s'é-6 Ibid. n°. 48. tendent en forme de pattes 6; un petit Rocher

marron à trois stries fines circulaires, à pas des deux premiers orbes applatis, & couronnés de 7 Ibid. nº.32. tubercules 7, & deux ventrus blancs fasciés

<sup>5</sup> List. tab. de brun, à un seul rang de gros tubercules 8. 992.1. 52.

265. Vingt-deux petits Rochers, dont deux de l'espéce des deux premiers de l'article 258, mais différens en ce qu'ils sont dépourvus des trois rangs d'épines sur le corps, & ne conservent qu'un rang de petits tubercules, qui se pro-2 Séba, pl. longe sur tous les orbes 9, & vingt autres

65. B° . 9. presque tous des variétés déja décrites.

> 266. Deux Rochers rares, citron, lisses, à tête fort élevée, à dix orbes tuberculeux, bordes chacun vers le haut d'une raye blanche

ponctuée de canelle, & à clavicule blanche.

VII. FAM. ROCHERS.

267. Dix Rochers de moyenne grandeur, dont huit marbrés & bariolés de diverses couleurs, de forme approchante de celle des deux de l'article précédent \*, & deux de même ef- \* List. tabs péce, mais remarquables par divers accidens 888, f. 9. qui les rendent monstrueux.

n°. 38 & 39. Arg. pl. 14.

268. Quatre grands Rochers; scavoir, un lett. I. revétu de son épiderme, marbré de blanc & de fauve-roux, & trois dépouillés, dont un couleur de chair, & deux ventre de biche, tous à fascies transversales onduleuses, & peur prononcées, à tête élevée, & à onze orbes couronnés de clouds fort saillans \* : plus, trois \* Gualt. tab. petits à stries fines circulaires, à clavicule éle- 54. litt. M. vée. & à une couronne de clouds dans le premier orbe, qui se changent en petits tubercules dans les fuivans \*.

269. Quatre autres qui ne différent des pré-lett. K. cédens qu'en ce qu'ils font couleur de chair, teints de fauve & nués de brun, & que les clouds qui couronnent le corps y sont beaucoup plus saillans, & trois petits comme les derniers

\* Arg. pl. 14.

270. Trois Rochers, dont un ventre-de-biche, de forme effilée vers le bas, renslée dans le corps, à fix pas un peu concaves séparés par un petit fillon, & couronnés de tubercules un

du même article.

ROCHERS. \* Lift. .ab. 385.

peu applatis \*; un fauve-roux, qui en differe VII. FAM. en ce que les pas n'en sont point séparés par des vuides, & que la tête est un peu plus élevée. & un plus petit, rare, blanc nué de verdâtre, imitant le jade, de forme effilée vers le bas, mais du reste à-peu-près semblable au précédent.

#### GENRE SECOND.

ROCHERS A BOUCHE DENTÉE ET A PETITE QUEUE.

271. A EUX grands Rochers triangulaires fauve-roux, à fascies transversales nombreuses. élevées & tuberculeuses, à stries fines en même sens dans les intervales des fascies, à trois rangs de bourrelets un peu applatis, mais trèsfaillans, surtout celui de la levre extérieure, \* Séba, pl. à queue retroussée, & nommés Dragons \*.

%3. nº. 7 & 8.

272. Deux autres ventre-de-biche, nué d'orangé, à grosses côtes tuberculeuses transversales, & à plusieurs rangs de bossages fasciés de blanc & de marron, de forme très-irréguliere, à queue un peu contournée & retroussée; espéce que quelques Amateurs nomment Rhino-

\* Arg. pl. 15. ceros \*. litt. B.

273. Quatre Rochers; sçavoir, deux jaune-

pale nué de blanc dans l'un, & d'aurore dans l'autre, à plusieurs rangs circulaires de tuber- VII. FAM. cules granuleux, à quelques portions de cô-ROCHERS. tes longitudinales tuberculeuses, à levre extérieure dentelée, & à très-petite queue, connus sous le nom de Culotte de Suisse \*, & deux \* Arg. pl. ? fauves, nués d'aurore, à côtes & fascies peu lett. D. Rumph. tab. différentes de celles du Rhinoceros, mais moins 28. litt. C. faillantes & plus arrondies, à orbes bombés & à queue un peu longue, contournée & retrousfép \*

\* Gualt. tabs

274. Dix petits Rochers; sçavoir, deux 37. litt. F. fauves nués de blanc, de forme bombée, à stries longitudinales & transversales, granuleuses aux points où elles se croisent, à trois côtes tuberculeuses, & à queue un peu longue recourbée; un plus petit des mêmes forme & couleur, mais à deux bourrelets seulement; deux blancs nués de fauve, à côtes & stries plus prononcées, & à longue queue recourbée \*; deux en treill's granuleux, à queue \*Arg. pl. 10. courte retroussée; une Culotte de Suisse, & lett. O. deux petits Dragons, dans l'un desquels la côte formant la levre extérieure est moins large & creufée en dedans, ce qui, suivant quelques Naturalistes, désigne le premier âge de la Coquille \*.

275. Deux Rochers des Indes fauves nucs 63. nº. 9 & ion de blanc, de forme applatie, à deux rangs la-

téraux de grandes épines, & à quelques rangs VII. FAM. longitudinaux de petites pointes, à levre ex-ROCHERS. térieure dentelée, & à petite queue, nommés

\* Séba, pl. en Hollande Crapauds \*. 60. nº. 19.

List. tab. 949. nº: 44.

276. Sept Rochers des Indes; scavoir, deux blancs nués de fauve & de marron, à stries transversales granuleuses, dont trois plus fortes chargées dépines sur le corps, la plus élevée desquelles se prolonge dans tous les orbes, à deux côtes longitudinales & latérales tuberculeuses, & à très-petite queue, connus

49. litt. L. nº. 18.

\* Gualt. tab. sous le nom de Raccrocheuses \*; quatre de mê-Séba, pl. 60. me espéce, dont deux fauves-gris, & deux fauves nués de blanc, à pointes moins faillantes, & répandues dans moins de zônes, l'un \* Ibid. no. desquels n'a que deux petites bosses seulement\*,

15, 16, 17.

& une petite Culotte de Suisse, à bouche du plus beau lilas.

277. Deux Rochers des Indes rares, marbrés de blanc & de marron, chargés de gros tubercules granuleux, à deux grosses côtes latérales, d'où fortent en-dehors des pointes creusées en gouttiere, à bouche à-peu-près semblable à celle de la Culotte de Suisse, & à

\* Arg. pl. 9. petite queue retroussée \*.

letti R. 5éba, pl. 60. n". 14.

278. Quatre Rochers par pendans, dont deux blancs marbrés de fauve, à stries longitudinales & transversales granuleuses dans leurs rencontres mutuelles, de forme bombée, & comme boffuée

en-dessus, mais applatie en-dessous, à levres se rabattant en-dehors en une fraise platte, mince VII. FAM: & dentelée des deux côtés, espèce que la for-ROCHERS. me de sa bouche a fait nommer Grimace \*, & \*Arg. pl. 9. deux blanches, qui ne different des précédentes, qu'en ce que la robe en est formée d'un réseau plus régulier & à plus petits grains, & que la seule levre extérieure y est bordée d'une fraise; on nomme cette variété Grimace blanche.

279. Cinq Rochers, dont un blanc nué de fauve, à tête élevée, à zônes granulcuses, à deux rangs de tubercules dans le corps, qui se prolongent en diminuant de grosseur sur les autres orbes, & à deux rangs latéraux de côtes longitudinales; deux Culottes de Suisses, & deux Grimaces des variétés de l'article précédent.

280. Deux Rochers des Indes, rares, couleur de chair, flambés par zônes de rougeobscur, à tête applatie, à clavicule aigue, à petite queue fort retroussée du côté de la levre intérieure & sinueuse à son extrémité, à levre extérieure coupée en vive arrête, ce qui les distingue de tous les autres Casques, dont le caractere spécifique est d'avoir cette levre retroussée en bourrelet : ceux-ci nommés Casques-Plumes, sont très-grands dans leur espèce \*.

4 Rumph.

281. Deux Casques - Plumes de couleurs tab. 22. lit. B.

plus pâles, & moins grands que les précé-VII FAM. dens.

ROCHERS.

282. Un Casque des Indes rare, blanc nué de fauve, à plis longitudinaux, laissant entr'eux de larges cannelures, à côte latérale tachetée de brun, de même que la cavité du bourrelet de la levre extérieure, à pas des orbes granuleux.

\* Séba, pl. & à tête élevée \*. \$3. B°. I & 2.

283. Un Casque des Indes peu commun ; ventre de biche, marbré par taches rondes de blanc, à levre extérieure tachée de brun, & repliée en-dehofs en gros bourrelet, à levre intérieure blanche, à un double rang de tubercules dans le premier orbe, & un seulement dans les autres, de forme bomble & à tête peu

\* Ibid. pl. élevée \*.

184. Trois Casques des Indes lisses; scavoir. deux blancs nués de bleu, à grandes taches quarrées fauves, rangées par zônes, à grande côte longitudinale, fituée en arriere de la lévre intérieure, & à trois petites sur les orbes suivans, à clavicule aiguë, nommés Casques pavés ou truités, & grands dans leur cspéce \*; & tab. 25 no. 1. un verd de terrasse, à slammes longitudinales

\* Rumch. Arg. pl. 15.

73. Do. 16.

étroites & onduleuses fauves, & du reste semblable aux précédens \*.

\* Rumph.

ibid. nº. 2. Arg. ibid. let.

185. Quarre Casques pavés, dont deux de l'espéce des deux premiers de l'article précédent; & deux verd de pavot qui n'en différent qu'en ce qu'ils font moins grands, très-finement réticulés, à taches plus petites, & de for- VII. FAM. me un peu moins bombée \*.

\* Gualt, tab.

286. Quatre Calques; scavoir, deux Pavés 40. litt. B. du Golfe de Venise, blancs nués de fauve, à taches quarré-long, striés circulairement dans les premiers orbes finement réticulés dans les derniers, à tête un peu élevée, à coque mince & lévre intérieure granuleuse \*; & deux des \* Bonan. cl. Indes, gris teint de verd d'eau, lisses dans le premier orbe, finement réticulés dans les autres, à pas applatis bordés de petits tubercules, à lévre extérieure finissant par trois dents saillantes en dehors, & à côte longitudinale fituée

derriere le repli de la lévre intérieure, espéce qu'on nomme Casque Bézoard, ou simplement

Bézoatd \*. 287. Trois Casques; sçavoir, deux de la Gualt, tab. 40. Méditerranée, qui ne dissérent des premiers de litt. A. l'article précédent, qu'en ce que les taches s'y joignent en forme de bandes long tudinales, que les canneluses transversales y sont beaucoup plus grandes, & la coque plus épaisse \*; \* Gualt. tab. & un gros Bézoard dépouillé, devenu par-là séba, pl. 68. noisette, bordé de bleu pâle.

288. Treize petits Casques; sçayoir, deux blancs à robe plissée en longueur, à pas des deux premiers orbes un peu tuberculeux, & \*Gual tales à lévre extérieure fort épaisse, tachetée de Arg. pl. 15. brun \*; deux rares qui différent des précédens lett. G.

VII. FAM. ROCHERS.

par le rebord de la lévre extérieure, qui est très= mince, & par une large bande longitudinale oblique, tachetée de brun : ce qui les peut faire

\* Arg. pl. nommer Casque en baudrier \* ; deux blancs nués 14. lett. H. séba, pl. 13. de fauve, à flammes étroites longitudinales roun°. 18-23. geâtres, à lévre extérieure comme les précé-\* Gualt. tab. dens \*; deux blancs réticulés, à pas du premier

Do. 4.

39. litt. L. Séba, pl. 53. orbe applati & bordé d'une couronne de petits tubercules, à lévre extérieure dentelée en dedans sur toute sa longueur, & en dehors dans le bas seulement, l'un desquels est garni de plus fur le premier orbe d'une côte longitudinale qui

de la pl. 69.

\* séba, la reparoît encore dans l'orbe suivant \*; quatre Coq. du mi-lieu du haut réticulés, dont deux Pavés de l'espèce des deux derniers de l'article 285; deux qui en différent en ce qu'ils sont à bandes longitudinales ondées, variété qu'on distingue par le nom de Casques rayés; & un très-petit à stries circulaires. & à côte longitudinale située à l'opposite de la lévre extérieure.

> 289. Cinq Casques des Indes: scavoir, trois de l'Isle de France, dont deux blancs veinés de gris, marbrés comme les Casques plumes, mais d'un rouge plus obscur, à stries longitudinales & cannelures transversales peu profondes, appellés en Hollande Bonnets de Pologne \*; un

\* Ruinph. sab. 23.110.3. 3cha, pl. 72. 8º. 17-21.

qui ne différe des précédens que parce qu'il est entiérement blanc, excepté le repli de sa lévre extérieure, qui est tacheté de brun, ce qui le dinales, & à lévres tachetées de rouge-brun, VII. FAM. dont un à pas des orbes un peu applatis & \*\*Goalt. tab. couronnés de petits tubercules\*, & l'autre à 40. litt. C. pas des orbes fans tubercules, mais arrondis en forme de gros bourrelets, & féparés les uns des autres par un profond fillon; ce qui le rend aussi très-rare.

290. Seize Casques de différentes grandeurs; sçavoir, deux blanc - jaunâtre de la Méditerranée, de forme très-bombée, & à stries circulaires peu prononcées \*: deux des Indes blancs, striés aussi circulairement, mais à pas des orbes 299. fig. 64. creusés en dedans en forme de sillon assez profond; deux fauves nués de blanc, à cinq fascies tuberculeuses sur le premier orbe, dont la plus élevée se prolonge sur le haut du second & du troisieme orbe \*; deux blancs, lisses, tachetés \* Rumph.tal. de marron autour de la spirale, & de brun sur 27. nº. 1. List.tab.1003. le bourrelet de la lévre extérieure \*; un Casque sig. 68.

\* seba, pl.

pavé lisse à petites taches \*; un Casque rayé de 53. n°. 9. l'espèce de ceux de l'article 288; deux comme 25, litt. B. les deux premiers, & un comme les septieme & huitieme du même article; un qui différe du précédent, en ce que les pas des orbes en sont moins applatis & simplement granuleux; & deux Bonnets de Pologne.

291. Dix Casques de moyenne grandeur; sçavoir, deux blancs de la Méditerranée, à grosses stries granuleuses dans le haut, à lévres 3. fig. 21.

extérieure repliée en gros bourrelet, & inté-VII. FAM. rieure granuleuse \*; un de Saint - Domingue, ROCHERS. \* Bonan, cl. de forme à peu près semblable, mais à stries circulaires moins prononcées & de couleur fauve; un des Indes, rose-séche, lisse, couronné dans le haut du corps de petits tubercules, & umbiliqué; deux Casques Bézoards, dont un dépouillé ; deux Bonnets de Pologne, & deux de l'espéce des cinquieme & fixieme de l'article précédent.

> 292. Deux Casques peu communs, blancs nués de fauve, à stries circulaires nombreuses, à lévre extérieure relevée & faillante en dehors en vive arrête, & intérieure tapissant une portion de la base, & saillante aussi vers le bas, à petite queue peu retroussée, l'un à bouche dens

\* Gualt, tab, telée des deux côtés, l'autre non \*.

43. nº. 2. Bonan. cl. 3. 293. Un grand Casque de la mer du Sud. rare, blanc nué de fauve, à stries longitudinales £ 160. peu élevées en forme de rides, à quatre zônes chargées de taches rousses, & dont la plus haute est un peu tuberculeuse, à huit orbes renssés, ornés chacun d'une couronne de petits tubercules, & au-dessus de cercles granuleux, à lévres extérieure & intérieure faillantes en dehors

\* Séba, pl. & applaties, & à côte mince longitudinale \*. 75. nº. 12 &c

394. Deux grands casques des Indes, nués & marbrés de blanc, d'aurore & de brun de différentes nuances, à stries fines longitudinales,

ceints

ceints d'un grand nombre de cordons circulaires tuberculeux, à bouche dentée des deux côtés, VII. Fam. & à lévres retroussées, l'extérieure fort épaisse, Rochers. l'intérieure ridée, noire en dedans, tapissant une partie de la base, & nommés Turbans\*.

295. Deux *Turbans* de couleurs très-vives, 73. no. 3, 40 moins grands que les précédens, & par-là pro-

pres à être placés dans des tiroirs.

296. Deux semblables, mais moins grands, & à lévre extérieure sort mince, ce qui est rare

dans cette espéce de Casques.

297. Deux gros Casques d'Amérique, grisblanc, flambés par bandes longitudinales en zig-zag de sauve, de brun & de violet, de forme un peu triangulaire, à trois sascies transversales tuberculeuses, dont les deux premieres sont peu prononcées, à tête applatie, à lévres teintes par grandes taches de brun-soncé, & nommés Casques triangulaires \*.

\* Gual. tab:

298. Deux Casques triangulaires de moyenne 41. litt. A. grandeur, dont un à un seul rang de tubercules, & imitant par son dessein le point de Hongrie\*; l'autre en dissére en ce qu'il n'a point de \* 56ba, pl. stries dans le corps, & que son milieu est 73. n°. 10 & chargé de gros tubercules \*.

299. Trois Casques; sçavoir, deux blancs 14 & 15marbrés de sauve & de brun, à stries circulaires & cannelures piquées réguliérement de petits traits longitudinaux, par où ils imitent le

Tome I.

dessous d'un ouvrage tricotté, à trois fascies VII. FAM. tubercu'eules, & une couronne de clouds qui ROCHERS. s'étend dans tous les orbes, dont les pas sont applatis & se recouvrent l'un l'autre, nommés Casques tricottés, petits dans leur espéce, &

\* séba, pl. par-là propres à entrer dans des tiroirs \*; & un 73. n°. 7 & 8. de la variété du premier de l'article précédent. Gualt. tab. 40. mais dont le rang de tubercules est à peine senlitt. D.

\* Séba, ibid. fible \*. nº. 19 & 20.

rcos.

300. Trois Casques plus grands que les précédens, dont un Tricotté, & deux Turbans.

301. Deux grands Casques, dont un Tricotté, & un Turban.

302. Deux gros Casques triangulaires, à trois rangs de tubercules fort faillants, de la base de l'un desquels on a enlevé des portions pour mertre à découvert la structure intérieure.

203. Trois très-grands Casques, dont deux gris-jaunâtre, à deux rangs de tubercules sur le milieu du corps, & un de clouds très-saillans à l'extrémité, à lévres applaties & extrêmement faillantes, sur-tout du côté de la tête qui est peu élevée, à coque très-épaisse & bouche dentée

\* List. tab. des deux côtés \*; & le troisseme gris, à stries circulaires encore plus distantes que dans le précédent, à trois fascies chargées de mammelons peu élevés, à tôte platte, & à lévres applaties, plus faillantes vers les côtés que vers la tête, à côte platte longitudinale, couchée sous la lévre intérieure, & se prolongeant sur les orbes suivans, & à bouche tachée de rouge- VII. FAM. brun, garnie de très-grosses dents.

## GENRE TROISIEME.

ROCHERS A BOUCHE AILÉE SANS PATTES.

304. Un grand Rocher blanc un peu taché de jaune, à grande aîle cannelée transversalement, se repliant en dedans, s'étendant sur la tête, la dépassant, & échancrée vers le bas, à dix orbes couronnés de petits tubercules, & nommé l'Aîle large \*.

\* Rumph. 305. Trois Rochers aîlés, dont deux blancs, tab. 36. lit. L. & un fauve nué de blanc en dessus, & blanc non 18.182. en dessous, à aîles moins grandes que celles du précédent, ne s'étendant que jusqu'au second orbe, & finissant par deux échancsures, à dix orbes couronnés de petits tubercules, & de l'espéce nommée Tourterelle \*.

306. Six Ailées; sçavoir, deux cannelle à 62. n°. 21 & quatre petites zônes blanches, tachetées du Rumph. tab. fond, à aîle recourbée & striée en dedans \*; 36. lin. M. deux blanches marbrées, par bandes longitudi- 61. nº. 15. nales en zig-zag, de canelle, ventrues, à grande Rumph. tab. aîle recourbée en dedans, épaisse dans son bord.

\* Séba, pl.

#### 180 COQUILLES UNIVALVES

& finissant par deux petites sinuosités \*; & deux Tourterelles sauves.

VII. FAM.
ROCHERS.
Séba, pl.

852. fig. 8.

307. Idem, à quelque petite différence près. 308. Deux Aîlees blanches nuées de jaune,

29. 13. 28 & à firies transversales dans le bas, & cannelures fines crulaires, à tête fort élevée, composée de neuf orbes réunis les uns aux autres par une moulure, à aîle recourbée, commençan: & finissant par une échancture, & à lévre intétieure retroussée en dehors on les nomme en Hollande

A Lift. tab. l'Artimon entortillé \*.

309. Deux Artimons entortillés peu communs, dont un blanc qui ne différe de ceux de l'article précédent, qu'en ce qu'il est de forme plus effilée, & à onze orbes, dont les cannelures sont plus marquées & se prolongent même

\* 55ba, pl. sur le corps \*; & un blanc nué de jaune, abso-62 n°. 19. List tab. 855, lument de même forme, mais sans aîle, & par fig. inferior. conséquent du premier âge de certe espéce.

310. Cinq Artimons entortillés; sçavoir, deux de l'espéce de ceux de l'article 308, à petites mailles orangé sur un sond blanc, & à trois zônes blanches, chargées de chevrons aussi

\* séba, pl. orangés \* ; & trois papyracés du premier âge, 62. nº. 18 & dont deux marbrés de blanc & d'orangé, & 20.

Rumph tab un blanc avec une légere teinte de jaune.

311. Quatre Ailées peu communes, dont deux blanches à rayes circulaires & onduleuses fanves très-serrées, un peu bossues dans leurs contours, à une échancrure dans le haut de VII. FAM. l'aile, & doux dans le bas, & à bouche lilas \*; ROCHERS. & deux petites de même sorme, marbrées de 3. f. 150. brun-jaunâtre, & à cinq zônes blanches onduleufes \*. \* Lift. tab.

312. Deux Aîlées très - rares, blanches, à 847. fig. 1. rayes circulaires pourpre, formées de traits in-lett N. terrompus & onduleux, à huit orbes, dont le Rumph. tab. premier est couronné d'un rang de subercules, à triple échancrure dans l'aîle comme les précédentes, & à bouche citron; on les nomme en Hollande Buccins de la mer rouge.

313. Deux Ailées rares, marbrées par grandes taches de marron clair & de blanc, à tête élevée, composée de neuf orbes traversés de cannelures longitudinales peu prononcées, à aîle bordée dans le haut d'un petit bourrelet, & de trois dents faillantes dans le bas, & à lévre intérieure repliée en dehors \*.

314. Neuf Aîlées; sçavoir, trois rares, dont 61. 110.41-474 deux blanches tirant sur le couleur de chair, à zônes formées de hachures jaunes qui repréfentent, sur-tout vers l'aîle, des caracteres Chinois, à tête applatie, & composée de sept orbes se recouvrant l'un l'autre, & un peu tuberculeux, à aîle échancrée en haut & en bas : la troisieme différe des deux premieres, en ce que la tête est un peu plus élevée, & que l'aîle n'en

\* séba, pl;

#### 182 COQUILLES UNIVALVES

est pas bien formée, ce que la plûpart des Na-VII. FAM. turalisses jugent désigner le premier âge de la ROCHERS. \* Seba, pl. 61. n°. 13: de chevrons souci, à tête un peu élevée, à aîle échancrée comme celle des précédentes, & à bouche safran, à la lévre intérieure près, qui est

\* List. tab. d'un beau noir \*; quatre de même espéce, mais \$51. fig. 6.
Rumph. tab. du premier âge, dont deux dépouillées, & dety. list. s.

Séba, pl. 61. venues par-là blanc de lair.

\* séba, pl. en haut & en bas \* ; deux blanches nuées de 52. nº. 17. & gris & de verd de pavot, à l'exception du bord de l'aile, qui est brun-noirâtre, ainsi que la bouche, à tête élevée, composée de huit orbes tu-

\* List. tab. berculeux, & à petite queue, espéce qu'on \$ 67 sig. 13. nomme Gueule noire \*; une autre Gueule noire \$ 55 sh., pl. 61. fasciée de marron clair & de blanc; & sept au-

tres Aîlées de diverses couleurs & marbrures, & d'espéce approchante de celle des Gueules VII. FAM. noires \*.

316. Dix-huit Aîlées par pendans; fçavoir, 61. n°. 35-40. quatre marbrées & fasciées de blanc & de rougebrun \*; quatre petites Tourterelles, dont deux cannelle, à perites zônes blanches, & deux bian- 50 & 54ches nuées de fauve \*; deux Gueules noires; deux comme les troisseme & quatrieme de l'ar- tab. 36. lit. P. ticle 305; deux comme les quatrieme & cinquieme de l'article 314; & quatre comme celles de l'article 311, à la couleur près des deux premieres, qui est blanche.

317. Deux grandes Aîlées de la Jamaique, rares, blanches, marbrées par traits longitudinaux de roux, à trois grosses côtes longitudinales dans le corps, qui forment, dans la couronne du premier orbe, autant de gros tubercules oblongs, à dix orbes un peu creusés en doucine, & à aîle mince, sinueuse vers le bas,

& très-saillante.

318. Trois Aîlées de la Jamaique, peu communes; sçavoir, une grande blanche, nuée de roux, à deux rangs de petits tubercules inégaux dans le milieu du corps, & un troisieme de gros, couronnant le premier orbe, & se prolongeant sur les suivans, à aîle épaisse vers le haut, & finueuse vers le bas \*; une de moyenne grandeur, blanche nuée de couleur de rose, 62. nº. 6.

## 184 COQUILLES UNIVALVES

de l'espèce de la précédente, mais où les deux fas-VII. FAM. cies ne sont marquées que du côté de la lévre ROCHERS. intérieure, & à tubercules des orbes moins sail-

\* séba, pl. lants \*; & une de l'espéce de celles de l'article 62. nº. 8.

précédent, mais moins grande.

319. Deux Ailées en pendant, de l'espèce de la premiere de l'article précédent, un peu moins grandes, mais riches en couleur : leur robe est canelle, nuée de verd de terrasse, & marbrée

de blanc & de ponceau.

320. Quatre Aîlées en pendant; sçavoir, deux blanches tachetées de boun de diverses nuances, à huit zônes chargées de petits tubercules inégaux, à un cercle de bossages qui couronnent le premier orbe, & se prolongent en forme de tubercules sur les suivans, à aîle terminée en bourrelet épais, s'étendant vers le haut sur les quatre premiers orbes, à deux échancrures vers le haut, & autant vers le bas, \* Ibid. no de l'espèce nommée Tête de ferpent \*, & grandes dans cette espéce; & deux aurore très-vif dans

litt. A.

le corps, à tête blanche, à douze orbes, dont les premiers sont couronnés de clouds, & les autres de tubercules, à aîle échancrée dans le bas, & sinueuse dans le haut: on les nomme

\* Arg. pl. 15. Oreilles de cochon \*.

Chilt-tab.32. lit. D.

321. Cinq Ailées; sçavoir, trois Oreilles de cochon, dont deux semblables aux précédentes, mais de couleur plus foncée, & ornées chacune d'une large zone plus claire que le fond; la troisieme a une zone semblable, mais le premier VII. FAM. orbe est dépourvu de clouds, & les autres n'ont Rochers. que de petits tubercules peu prononcés; & deux Têtes de serpent.

322. Sept autres Aîlées; sçavoir, quatre Oreilles de cochon, dont une rare & singuliere, en ce que les clouds, au lieu d'être pointus, sont coupés quarrément comme les dents de certaines roues, une peu commune, en ce qu'elle est blanche en dessus, & pourpre en dedans; deux comme les premieres de l'article précédent, & trois Tête de serpent, dont une à aîle épaisse, une à aile papyracée\*, & l'autre sans \* Arg. pl. aîle ou du premier âge \*. \* Séba, pl. \* Séba, pl.

323. Quatre très-grandes Ailées d'Amérique, 62. nº. 40. revêtues de leur épiderme fauve-roux, à grosses stransversales, à orbes couronnés de tubercules très-faillants, & à bouche couleur de rose, nommées Lambis, dont une à aîle fort épaisse, deux à aîles plus minces, & la derniere du premier âge, c'est-à-dire, sans aîle \*.

% Gualt rabi

324. Trois gros Lambis du premier âge, 34. htc. A. dépouillés de leur épiderme, dont deux couleur de chair, & un couleur de rose.

325. Quatre Aîlées à peu près des couleurs & nuances des Lambis, mais moins grandes; elles en dissérent d'ailleurs en ce que la bouche n'en est point couleur de rose, que les tuber-

# 186 COQUILLES UNIVALVES.

ROCHERS.

cules du premier orbe en font plus gros à pro-VII. Fast. portion, & que ceux des autres orbes sont pr. sque entiérement cachés sous les extrémités des orbes précédens: l'aîle est fort épaisse dans l'une, & papyracée dans l'autre : les deux dernieres sont du premier âge ou sans aîle, à robe rosepâle dans l'une, ce qui l'a fait nommer Pomme d'Acajou, & violette dans l'autre, que l'on nomme l'Episcopale.

3 26. Deux Pommes d'Acajou en pendant, &

de couleurs très-vives.

327. Deux Episcopales aussi en pendant.

328. Six Aîlées de moyenne grandeur, par pendans; sçavoir, deux marron foncé, marbrées & tachetées par zônes de blanc & de brun, à grosses stries circulaires un peu onduleuses, à un rang de tubercules au haut du corps, dont les plus près de l'aîle sont les plus gros, à tête affez élevée, & à grande aîle épaiffe dans son bord, échancrée dans le bas, & s'éle-

\* séba, pl. vant un peu vers le haut \*; deux couleur de 62. nº. 5 & 9 tuile, femblables de forme aux précédentes, & qui en conservent la marbrure dans un petit cordon qui régne autour des spires; & deux du premier âge de cette espéce, des mêmes couleurs & dessein des deux premieres, mais sans

\* Ibid. nº. aîles \*.

35.

329. Six autres Aîlées par pendans, de fond & marbrure semblables aux premieres de l'article

précédent; sçavoir, deux du dernier âge, à aîle bien formée, & du reste plus épaisse dans VII. Fams. l'une, & papyracée dans l'autre; deux qui ne dissérent de celles-ci qu'en ce que la lévre extérieure, qui y est aussi papyracée, s'y éleve à peine en forme d'aîle, ce qui les fait regarder comme l'âge moyen de la Coquille\*; & deux \* \$564, pl. comme les dernieres de l'article précédent, à 62. n°. 37. lévre extérieure papyracée aussi, & ne tenant point du tout de la forme d'aîle; ce qui constitue le premier âge de cette Coquille. Ces trois variétés sont fort intéressants.

330. Sept Aîlées; sçavoir, deux du dernier âge de l'espéce des deux premieres de l'article 328, mais un peu différentes pour le fond; une de l'âge moyen, & quatre du premier âge, dont deux de la premiere variété du même article, & deux de la seconde.

331. Neuf Aîlées; sçavoir, deux bariolées de marron, de fauve & de blanc, à stries circulaires un peu onduleuses & granuleuses, à grande aîle épaisse dans son bord, échancrée en haut & en bas, & armée, au-dessus de l'échancrure d'en haut, d'une avance en forme de doigt, à petite queue échancrée & retroussée, nommées Oreilles d'âne \*; deux Oreilles d'âne, \* Arg. pl. dissérentes des précédentes, en ce que l'aîle en séba, pl. 61. est papyracée, & n'a ni échancrure, ni avance; 10-11 & 22. deux comme les première & troisseme de l'ar fig. 28.

#### COQUILLES UNIVALVES

ticle 328, & trois variétés du premier âge de VII. FAM. cette espèce \*.

ROCHERS.

\* 56ba, pl. 332. Les mêmes Coquilles que dans l'article EI. nº. 8-10. précédent, à cette différence près que l'une des Oreilles d'âne de la premiere espèce est blanche. nuée de couleur de rose.

333. Quatre grandes Aîlées marbrées de blanc, de fauve & de roux, dont deux ne différent des précédentes qu'en ce qu'elles sont 4. Ibid. pl. couronnées de plus gros tubercules \*; les aîles des deux autres s'élevent au niveau de la columelle, & jettent en avant une espéce de doigt qui se prolonge encore beaucoup plus loin, ce

\* Ibid. pl. qui les fait nommer Aile d'Ange \*.

62. nº, 1 & 2. Lift. tab. 874. Sg. 30.

\$2. nº. 4.

# GENRE QUATRIEME.

ROCHERS A BOUCHE AILÉE ET A PATTES.

334. ROIS grands Rochers des Indes, marbrés de blanc & de marron clair, à quatre falcies tuberculeuses, & de différens âges; sçavoir, un du dernier âge, à aîle armée de six grandes pattes crochues, creusées par dessous en canal presque sermé, à lévres chargées de petites stries \* Séba, pl. 81. aurore, nommé en France Araignée mâle, &

Gualt. tab. 35. en Hollande Griffe du Diable \*; un de l'âge litt. B.

moven, à pattes courtes fort larges & fort ouvertes, nominé l'Araignée femelle ; & un du VII. FAM. premier âge, à lévre papyracée, dépourvue Rochers. d'aîle & de pattes 2.

335. Idem, à quelques perites différences 35. Iu. B. près dans les pattes de l'Araignée male, qui sont 83. nº. 1. plus ouvertes que dans celle de l'article précé-35, lut, G. dent.

336. Deux Araignées mâles d'une autre variété, & peu communes : elles sont à six pattes comme les précédentes, mais à fascies plus élevées, & ont non-seulement les légres, mais encore tout l'intérieur de l'aîle chargés de stries onduleuses blanches & de cannelures brunes 3.

337. Quatre Araignées marbrées sur le corps 870. f. 24. des mêmes couleurs que les précédentes, & blanches seulement en dedans, à sept pattes, v compris la queue, nommées en Hollande Crabes communs, dont deux mâles ou du second âge, à pattes longues, étroites & sermées 4, & deux femelles ou du premier âge, à pattes courtes, 14 lett. E. Gualt, tab.35. larges & ouvertes 5.

338. Deux Araignées mâles à sept pattes, 866. i. 21. plus grandes que les précédentes, l'une blan-Rumph. tab. che marbrée de marron, remarquable par une grande queue recourbée, & l'autre blanche nuée de fauve, à petite queue. Plus une du premier âge de cette espéce.

3 39. Deux Araignées mâles de cette espéce,

Rumph, tab.

f Lift, taba

ROCHERS.

marbrées de fauve au lieu de marron, dont VII. FAM. une monstrueuse, en ce que trois de ses pattes partant d'un même pli, saillent fort en avant. & se replient même sur les autres; & une troisieme sans aîle, comme la derniere de l'article précédent.

340. Deux grandes Araignées mâles à sept pattes, d'une espéce rare : elles différent de toutes les précédentes, en ce que la clavicule comprenant les quatre derniers orbes, en est applatie, & que les tubercules en sont moins gros; l'une revêtue de son épiderme, & à grandes pattes fermées en dessous, l'autre dépouillée, à pattes un peu moins grandes & ouvertes, toutes deux du dernier âge de cette espéce.

341. Deux autres de même espéce, mais moins avancées en âge; sçavoir, une du moyen âge ou femelle, à aîle très-saillante, peu épaisse, bordée de grandes dentelures formées par le prolongement des fascies circulaires, & s'élevant jusqu'à la clavicule sur laquelle elle se replie; l'autre du premier âge, parfaitement semblable à la précédente, à l'aîle près dont elle est dépourvue, & nommée dans cet état, par \* Lift. tab. Klein , Racine de Brione \*.

382. f. 4.

342. Deux petites en pendant, de même espéce, à lévre extérieure papyracée, & qui paroiffent être d'un âge encore antérieur à la derniere de l'article précédent. Ces trois articles réunissent sous un seul point de vûe tous les changemens d'état de cette Coquille. VII. FAM. 343. Trois Rochers des Indes; scavoir, deux Rochers.

blancs marbrés de fauve - roux, différens des Araignées de l'article 337, en ce que les sept pattes en sont noueuses, la forme moins bombée, & la bouche striée, blanche & brune : on les nomme en Hollande Crabes à nœuds ou goutteux, & en France Scorpions \*; l'un mâle à longues pattes fermées, l'autre femelle à pattes 14. lett. B. Rumph. tab. courtes & ouvertes, & un différent des précé- 36. litt. K. dens, en ce que les pattes en sont à peine noueuses, que le dedans de la bouche en est orangé, & sans stries, nommé le Scorpion orangé.

344. Six Rochers; sçavoir, quatre petits fauves nués de gris, à orbes tuberculeux & à tête élevée, deux desquels ont l'aîle partagée en quatre longs doigts, & se nomment en Hollande Aîle de chauve-souris mâle \*; les deux \* Gualt, tab. autres à aîle armée d'un seul doigt peu long, & 53. litt B.C.

nommées Aile de chauve-souris femelle \*: ces no. 17. Coqu'lles sont encore connues sous les noms de 53. litt. A. List. tab. 865.

Hallebarde ou de Patte d'oie; & deux Scorpions fig. 20. mâles des variétés de l'article précédent.

345. Trois Rochers marbrés de blanc & de roux, à dix pattes, y compris la queue, à bouche couleur de chair, striée des deux côtés, nommés Mille-pieds, dont deux mâles à pattes

# 192 COQUILLES UNIVALVES

fermées 1, & le troisieme femelle à aîle papy VII. FAM. racée, garnie de pattes courtes & ouvertes 2. ROCHERS.

1 List tab. 346. Trois Rochers; sçavoir, deux Griffes 868 & 869. s. du Diable, dont une très-grande, & l'autre dé-Rumph. tab. coupée en spirale, pour saire voir l'intérieur de 36. litt, s.

2 Atg. pl. 15. la Coquille, & une Araignée femelle de la lett. 2. même espèce.



#### HUITIEME FAMILLE.

POURPRES.

dinairement moins grosses & moins VIII. FAM. POURPRES. renssées du milieu que les Murex. Elles sont encore caractérisées par une petite bouche à peu près ronde & unie, par des côtes longitudinales plus ou moins nombreuses, placées à égale distance les unes des autres, & chargées ou de tubercules, ou de petits clouds aigus, ou de feuillages à bords découpés & frisés, ou enfin d'épines longues & fines. Elles ont toutes une queue creusée en gouttiere plus ou moins longue, d'où nous tirerons leur division en deux genres; sçavoir,

- 1°. Les Pourpres à queue un peu large, courte & recourbée.
- 2°. Les Pourpres à queue plus étroite, longue & droite.

Tome I.

#### GENRE PREMIER.

POURPRES A QUEUE UN PEU LARGE; COURTE ET RECOURBÉE.

347. DEUX très-grandes Pourpres rameu-VIII. FAM. ses des Indes, blanches veinées de fauve, ren-POURPRES. slées, à stries sines circulaires, à trois côtes longitudinales, d'où naissent de grosses seuilles frisées, plus grandes dans l'une, & moins dans l'autre, sur le milieu des intervalles desquelles on voit un rang longitudinal d'assez gros tubercules, & à lévre intérieure teinte de couleur de rose, variété qu'on peut nommer Rameuse \* Arg. pl. triangulaire \*. C'est la Chausse-trape ou le Che-

val de frise de M. d'Argenville.

ze. lett. C. Séba, pl. 77.

348. Deux semblables, mais moins grandes.

349. *Idem*, à cela près que le fond des deux Coquilles est rayé ici de brun & de marron.

350. *Idem*, à quelque différence près dans la grandeur & les nuances.

351. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, blanches, fasciées dans les cannelures de brun, à stries fines circulaires, & autres plus grosses, dont le prolongement se termine, le long des grosses côtes longitudinales,

en feuilles frisées très-saillantes dans l'une \*, & fort peu dans l'autre.

VIII. FAM.

352. Deux Pourpres rameuses triangulaires Pourpres. des Indes, fauve nué de noisette & de marron, 77. n°. 2 & 3 à tête plus élevée que les précédentes, & à feuilles frisées très-longues, recourbées en arriere dans leur extrémité \*.

\*Ibid. no. I.

353. Quatre Pourpres rameufes triangulaires en pendans; scavoir, deux d'Amérique, couleur de suye, à seuilles très-serrées les unes contre les autres dans chaque rang longitudinal, & qu'on pourroit nommer Enfumées; & deux de l'espéce de celles de l'article précédent, mais plus petites, & à feuilles plus minces, plus allongées à proportion, & plus recourbées \*.

\* Arg. pl; 16. lett. E.

- 3 54. Quatre Pourpres rameuses triangulaires d'Amérique; sçavoir, deux blanches à clavicule marron clair, à stries circulaires très-fines; & deux Enfumées.
- 355. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, noires, à quelques endroits près, qui font marqués de blanc dans le corps, à grandes feuilles frisées & recourbées, à trois groffes bosses situées entre les trois rangs longitudinaux de ces feuilles, & à lévre intérieure couleur de rose, espéce qu'on nomme Brulée \*.

\* Ibid. lett-

356. Trois Pourpres rameuses triangulaires; Séba, pl. 77. sçavoir, une de l'espéce de celles de l'article ", 86 10,

## 196 COQUILLES UNIVALVES

352; & deux Brulées, où il paroît plus de VIII. FAM, blanc que dans celles de l'article précédent. POURPRES.

357. Quatre Pourpres rameuses en pendant. des deux espéces de l'article précédent.

358. Six Pourpres rameuses en pendant; sçavoir, deux blanches, semblables à celles de même couleur de l'article 354; deux Brulées, & deux comme les dernieres de l'article 353.

359. Deux Pourpres rameuses triangulaires des Indes, rares & en pendant, ventre de biche, à stries circulaires brunes, à feuillages peu saillans, mais bien dessinés, & d'un beau couleur de rose, à lévres bordées de même, de forme oblongue, & à tête fort élevée.

360. Deux autres, dont une de la variété des précédentes, mais plus grande, plus foncée en couleurs, & dont les feuilles montrent moins de couleur de rose; & une qui ne différe de la précédente qu'en ce que le fond & les cannelures en sont de couleur blanche, & que les

feuilles & les stries sont marron foncé \*. \* Séba, pl.

361. Trois Pourpres rameuses triangulaires: 77. n°. 11 & List. tab. 946. sçavoir, une semblable à la premiere de l'article précédent, mais plus foncée en couleurs, & à feuilles dont l'intérieur est lilas vif; & deux blanches à stries circulaires brunes, de la forme des précédentes, à cela près qu'on y remarque trois rangs de bosses longitudinales entre chaque paire de côtes feuillues.

362. Trois autres de la variété des articles précédens; sçavoir, une blanche nuée de fauve VIII. FAM. à feuillages couleur de role; une fauve à fires Pourness brunes, & à dessous des feuillages couleur de chair, & la derniere marron à stries noires & à feuillages lilas vif.

363. Quatre Pourpres triangulaires d'Amérique, à stries circulaires granuleuses, alternativement groffes & menues, à trois groffes côtes longitudinales, & à deux pet tes intermédiaires, sur lesquelles s'élevent les grosses stries du corps, formant sur celles-ci de petits tubercules, & sur les autres des seuillages très-courts & peu nombreux, toutes de couleur grise, maisdont deux à côtes blanches & bouche jonquille, & deux à côtes blanches & brunes, & à bouche couleur de rose:

364. Six Pourpres triangulaires en pendant: sçavoir, deux des Indes, rares, à stries fines circulaires, à trois groffes longitudinales, & à tubercules qui se continuent trois par trois dans chaque orbe, à petite queue armée de deux. épines, à lévres teintes en dedans de cérise. à coque très-épaisse & de forme renssée; deux de la Méditerranée, blanches, nuées de fauve, à grosses stries circulaires en forme de cordons granuleux, à profondes cannelures, à trois côtes longitudinales, chargées de plis affez faillans \*, l'une desquellee conserve son opercule; morph pl. 4.

#### 198 COQUILLES UNIVALVES

& deux de l'espéce des dernieres de l'article

VIII. FAM. 353.

365. Huit Pourpres triangulaires rares; sçavoir, quatre des Indes, dont une blanche, & trois blanches à taches peu nombreuses rousses plus ou moins foncées, à stries circulaires, & à trois groffes côtes longitudinales qui s'étendent sur tous les orbes, & dans l'intervalle desquelles on en remarque trois plus petites, de même extension, de forme oblongue, à tête très-élevée, à lévre extérieure en bourrelet applati & dentelé, avec une petite avance platte en forme de commencement d'aîle; & quatre petites du Sénégal, dont deux blanches, & deux blanches marbrées de brun brûlé dans les intervalles des côtes, qui font aîlées & tranchantes dans le premier orbe, arrondies dans les autres, & à queue fermée comme un tuyau. \* Adans Hist, nommées par M. Adanson le Jatou \*.

\* Adans Hist. nommées par M. Adanso du Sénég. pl. 366. Une Pourpre trie 9. fig. 21.

366. Une Pourpre triangulaire aîlée des Indes, très-rare, blanche, à firies circulaires très-fines, & à trois côtes longitudinales, de chacune desquelles, & principalement de celle qui borde la lévre, s'élevent de longues avances papyracées en forme d'aîle, à tête très-élevée, com osée de sept orbes un peu renssés, & à lévres en vive arrête; elle porte trois pouces trois lignes de long.

367. Une Pourpre aîlée différente de la pré-

cédente, en ce que les stries en sont plus prononcées, que les aîles s'y prolongent jusqu'à VIII. FAM. le clavicule, que la tête en est moins élevée, quoique composée de neuf orbes, que les intervalles des côtes aîlées y font, chacun chargés d'une bosse, que la queue en est recourbée en dessus, & divisée en une espéce de fourche, & qu'elle n'a que deux pouces de long.

368. Une Pourpre aîlée semblable à la pré-

cédente, à cela près que les aîles en sont fort contournées, que celle du côté extérieur de la bouche en est fort large, & que la queue en est à peine fourchue.

369. Une Pourpre rameuse des Indes, à coque mince, blanche, chargée de six rangs de feuilles noires très-déchiquetées, & connue sous le nom de Rôtie \*; elle est grande dans son es- \* Arg. ph. péce.

370. Deux Rôties en pendant, moins grandes que la précédente.

371. Deux Pourpres rameuses des Indes, à zônes alternatives blanches & jaune-foncé, à fix rangs longitudinaux de petites feuilles brunes très-frisées, ce qui leur a fait donner le nom de Chicorée \*.

\* Ibid: Text

372. Cinq Pourpres, dont trois rameuses, K. & deux épineuses; sçavoir, une rameuse brune, à fix côtes longitudinales, dont cinq chargées. de très-petites feuilles, & la derniere, qui borde

la lévre extérieure, d'autres très-grandes, lar-VII'. FAM. ges & applaties à l'extrémité; ce qui a fait Pourpres. donner en France, à cette espèce, le nom de

\* Arg. pl. Patte de crapaud \*, & en Hollande celui de sc. lett. D. Bois de cerf; deux petites Pattes de crapaud, n°. 13-16. dont une canelle à côtes peu prononcées, & à Valent. unideux rangs de longues feuilles, l'autre blan-\* Valent. ib. che \*, semblable du reste à la premiere; & deux

9.35. petites épineuses blanches nuées de fauve, à stries circulaires, & à six côtes longitudinales

un peu obliques, chargées d'épines peu longues, mais très-aigues, & à tête très-êlevée,

composée de neuf orbes.

373. Onze Pourpres de diverses grandeurs; sçavoir, la plus grande, rameuse d'Amérique, à coque mince fauve, à stries circulaires inégales, à fix côtes longitudinales chargées de feuilles grandes & petites marron, à fept orbes bombés, & à lévre intérieure teinte de couleur de rose; six de la Méditerranée par pendans, fasciées de blanc & de marron, à stries fines circulaires, à côtes longitudinales tuberculeuses, garnies d'un appendice couché dans le même sens en forme d'écorce, & à couronne de tubercules, se prolongeant dans les second \* Bonan. cl. & troisieme orbes \*; une qui ne différe des troisieme & quatrieme de l'article 364, qu'en

3. f. 272. C tal. tab. 31. lier. C.

ce qu'elle a fix côtes longitudinales; elle loge Bernard l'Hermite; deux Chicorées, & une Rôtie.

374. Une petite Pourpre épineuse des Indes, très-rare, fond blanc, à stries circulaires de VIII. FAM. même, à huit côtes longitudinales obliques, POURPRES. noires, hériffées de longues pointes aigues de même couleur, qui régnent de la tête à la queue, à tête bombée, composée de cinq orbes, à clavicule blanche, espéce qu'on doit regarder comme une variété de celle que M. d'Argenville appelle Radix à feuillages noirs \*, & qu'on \*Arg.append. peut nommer le Radix à pointes noires.

375. Une grande Pourpre rameuse des Indes, rare, blanche, veinée & fasciée de couleur de rose, à bouche & grand umbilic aussi couleur de rose, de forme ventrue, à tête assez élevée, & à neuf rangs longitudinaux de feuilles plus ou moins grandes, repliées en pointe dans les deux premiers orbes.



## GENRE SECOND.

POURPRES A QUEUE PLUS ÉTROITE LONGUE ET DROITE.

376. UNE Pourpre des Indes, couleur de VIII. FAM. chair, marbrée de noirâtre, de brun & de blanc, Pourpres. à stries fines circulaires, à trois grosses côtes longitudinales, & à trois rangs intermédiaires de petits tubercules, à bouche couleur de rose, & à très-longue queue, nommée Tête de bé-F \* Arg. pl. casse \*, très-grande dans son espéce, & de la séba, pl. 78. plus belle conservation.

n°.6.

377. Une grande Tête de bécasse, à queue moins longue que la précédente, & deux petites en pendant, blanches, nuées & tachées de fauve, à stries fines circulaires, à tête applatie, bordée d'une strie plus saillante, à clavicule en mammelon couleur de chair, & qui n'ont ni côtes, ni tubercules, comme l'espèce précédente.

278. Idem.

379. Une Pourpre des Indes, blanche, veinée de fauve, à trois côtes longitudinales chargées, dans toute leur longueur, d'épines fines ou arrêtes, longues, pointues & recourbées, à queue longue, creusée intérieurement en canal, espèce nommée en France la grande Bécasse = épineuse \*, & en Hollande l'Araignée; elle est VIII. FAM. grande & très-bien conservée.

380. Une Bécasse épineuse, de même espéce, 16. lett A. Séba, pl. 78. fauve-clair, moins grande que la précédente.

nº. 1 80 20

381. Une autre, gris-cendré, un peu moins

grande encore.

382. Cinq Pourpres; sçavoir, quatre Bécasses épineuses, d'espèce moins rare que les précédentes, dont deux des Indes, grises, nuées de fauve, à épines moins nombreuses & moins longues, mais du reste semblables à celles de l'article 379 \*; & deux d'Amérique, blanches, veinées de fauve, à épines plus courtes & plus 902. f. 22. séba, pl. 78. groffes, à queue fourchue & recourbée dans nº. 4. son milieu. La cinquieme est une grosse Tête de Bécasse de l'espéce déja décrite.

383. Six Pourpres; sçavoir, deux Têtes de Bécasse d'Amérique, l'une de moyenne grandeur, & fauve nué de verdâtre, l'autre petite & marron-clair, toutes deux à robe réticulée, & à côtes un peu épineuses \*; & quatre Bécasses épineuses comme celles de l'article pré- tab. 26. litt. F. cédent, à cela près que celles des Indes sont blanches.

\* Rumple.

384. Une grande Pourpre des Indes, rare, blanche, à stries circulaires légérement granuleuses, à six côtes longitudinales un peu applaties, chargées de deux rangs circulaires de

# 204 COQUILLES UNIVALVES.

grandes épines, celles d'en-haut plus fortes, & VIII. FAM. les autres moins, à deux rangs obliques de perourpresse tites épines fur la queue, à tête applatie, & à lévre intérieure faillante en dehors, espéce qu'on \* Séba, pi nomme la grande Massue d'Hercule \*.

385. Une Massue d'Hercule un peu plus grande que la précédente, mais à queue & épi-

#Ibid.no.8. nes moins longues à proportion \*.

386. Sept Massues d'Hercule, dont six par pendans; sçavoir, quatre de la Méditerranée, fauves de diverses nuances, dissérentes des précédentes, en ce que la tête en est plus élevée, qu'elles n'ont chacune qu'un rang d'épines sur la queue, & qu'outre les deux rangs du premier orbe, elles en ont un troisseme sur les deux or-

\*Gualt. tab. bes fuivans \*; l'une d'elles conferve fon oper-30. litt. F. Rumph. tab. cule; deux d'Amérique, peu communes, fau-26. n°. ves, nuées de gris & de blanc, qui différent de celles-ci, en ce qu'au lieu d'épines, elles

\*Ibidano.4. n'ont que des tubercules terminés en pointes \*; & une petite de la Méditerranée, fauve & rare, en ce qu'elle a sur le corps trois rangs d'épines, mais semblable du reste aux premieres de cet article.



# NEUVIEME FAMILLE.

TONNES OU CONQUES SPHÉRIQUES.

E sont des Coquilles à peu de volutes, rarement tuberculeuses, de forme IX. FAM, très-renssée, à bouche large & évasée, ordinairement dépourvue de dents, à tête petite ou peu élevée, dont elles sont même quelquefois entiérement privées. Leur bouche est entiere ou échancrée, ou garnie d'une petite queue, ce qui nous fournit leur division en trois genres, qui sont,

- 1°. Les Tonnes à bouche entiere.
- 2°. Les Tonnes à bouche échancrée.
- 3°. Les Tonnes à bouche garnie d'une petite queue.



#### GENRE PREMIER.

#### TONNES A BOUCHE ENTIERE.

387. I LUIT Tonnes par pendans; sçavoir, IX. FAM. fix différentes par leurs marbrures, mouchetures TONNES. & nuances, à coque mince, de forme ovale, à bouche évalée vers le bas, & à tête creusée en dedans en spirale en forme d'umbilic, espéce \* Gualt. tab. qu'on nomme la Muscade ou la Noix \*; & deux 12. litt. E. blanches nuées de fauve, de forme encore plus Séba, pl. 38. oblongue, à stries fines circulaires, & à bouche n°, 34-38. fort évalée vers le bas, nommées Oublies ou Papier roulé, toutes deux grandes dans leur

\* Bonan. cl. espéce \*.

3. f. 3. Lift. tab. 714. 288. Dix Noix de mer de moyenne gran-£. 71. deur : scavoir, deux blanches, de forme approchante de la sphérique, à stries circulaires très-fines, à coque papyracée, & à bouche débordant les deux extrémités du corps, variété

\* Arg. pl. nommée la Bulle d'eau \*; deux Muscades mouchetées l'une fauve & gris, l'autre fauve & 17, lett. Q. Séba, pl. 38. rouge - brun, & à deux petites zônes bleunº. 45.

\* Ibid, no. foncé \*; deux autres Muscades nuées & mouchetées de fauve, d'amaranthe & de couleur

\* 1bid. nº. de chair \*; deux autres nuées d'olive, mar-39 & 42.

brées par bandes longitudinales de bleuâtre, de forme plus oblongue, & à bouche plus IX. FAM. ! étroite que les précédentes \*; & deux Oublies Tonnes. couleur de paille. Plus, deux petites Tonnes 12. litt. F.
Bonan. cl. 3: papyracées, à larges zônes gris de lin, séparées fig. 3. altera, les unes des autres par de petits cercles noirs.

389. Vingt-deux petites Tonnes, scavoir, une rare, blanche, fasciée par zônes de taches rouges quarré - long, à stries circulaires bien prononcées, à tête un peu élevée, à petite bouche. & à lévre intérieure armée d'une dent; une peu différente de la précédente, non moins rare, à cordons circulaires fort serrés, semés de petites taches quarrées alternativement blanches & noires, & à deux petites zônes blanches, espéce qui vient de l'Isle de France, où on la nomme Pistache \*; Quatre Pistaches un peu plus petites, à taches blanches & grises 992. f. 14. moins marquées; deux Muscades rares, papyracées, à robe blanche, rayée de petits cercles ondés-bruns \*; deux rares encore, aussi papyracées, à larges zônes alternatives blan- 38. R°. 49. ches & couleur de rose, séparées les unes des autres par de petits cercles bruns; quatre Bulles d'eau blanches papyracées \*; fix Oublies blan- \* cualt. tabé ches papyracées \*, & deux Muscades de la va- 13. litt. D. \* Ibid. lit, E. riété des cinquieme & fixieme de l'article précédent.

\* Lift. tabi

\* Séba, pli

# GENRE SECOND.

#### TONNES A BOUCHE ÉCHANCRÉE.

390. LEUX très-grandes Tonnes couleur de noisette, umbiliquées, à tête peu élevée, à IX. FAM. TONNES. lévre extérieure unie & mince, & à pas des orbes creusés en forme de sillon, dont une à groffes & petites fascies circulaires, celles-ci placées dans les cannelures de celles-là; & l'autre à grandes cannelures sans petites fascies intermédiaires \*.

" Gualt. tab. 42. litt. A.

391. Deux autres moins grandes, dont une rare, fauve, à petites cannelures, & à larges fascies, tachées par chevrons quelquesois en zig-zag de blanc, de gris & de marron de diverses nuances\*; & une comme la premiere \* Séba , les deux grandes de l'article précédent, à la lévre extérieure près, qui est bordée d'une espéce d'excrescence

Coq. de l'angle gauche du haut de la pl. 69.

tuilée.

392. Trois autres un peu moins grandes; sçavoir, deux en pendant de l'espéce de celles de l'article 390; & une blanche \*, à larges can-

\* Ibid. les nelures, & à fascies ornées de taches fauves Coq. au def-quarrées, également distantes les unes des au-sous de celles tres.

citées dans la 393. Quatre autres par pendans; sçavoir, pl. 69. deux deux à fascies peu larges, sauves, & à larges cannelures blanches; & deux fauves à fascies IX. FAM. larges & applaties, à cannelures étroites, um-Tonnes. biliquées, & de l'espéce nommée Perdrix \*, dont une à taches blanches uniformes sur tou-17. lett. A. Gualt. pl. 313 tes les fascies, & une autre plus rare à cinq len F. zônes intermédiaires, où ces taches font disposées par intervalles beaucoup plus larges.

394, Quatre Tonnes; sçavoir, une blanche tachée de fauve de l'espéce de la premiere de l'article 391; une comme la derniere de l'article 392, mais à cannelures plus larges, chargées chacune de trois stries; & deux Perdrix de la variété de la premiere de l'article précédent.

395. Trois jolies Tonnes; sçavoir, une toute blanche, à fascies disposées comme dans la premiere de l'article 390, mais différente en ce qu'elle est à tête plus élevée, à clavicule marron, à lévre extérieure retroussée en bourrelet; & chargée en-dessous de plusieurs paires de dents; une qui ne différe de la précédente que par ses cannelures simples & par cinq larges zônes fauves qui se perdent à quelque distance de la levre extérieure; & une qui différe de la derniere de l'article 392, en ce que sa lévre extérieure est un peu retroussée & dentelée.

396. Huit petites Tonnes par pendans; sçavoir, deux b'anches marbrées de jaune-pâle & Tome I.

de fauve, à fascies circulaires un peu arron-IX. FAM. dies, à cannelures peu prosondes, à lévre ex-TONNES. térieure faillante & convexe en dehors, & ar-

\* Arg. pl. mée, ainsi que l'intérieure, de grosses dents \*; Gual. tab. 51. deux *Perdrix*, dont une fauve foncé, à petites dits. C.

dit. C.

\* 56ba, la taches grises \*, & l'autre entiérement blanche;
Couille du deux comme les premieres de l'article 393,
de la pl. 69. mais de couleurs moins vives, & deux comme

\* Arg. pl. la derniere de l'article précédent \*.

397. Deux très-grandes Tonnes en pendant, à robe lisse, canelle, à tête applatie, dont les trois premiers orbes, à pas concaves, sont couronnés de clouds tuilés, & les trois derniers saillent de la couronne intérieure en forme de mammelon, à bouche fort évasée, espéce nommée en Hollande Gondole mammillaire, & en

\* séba, pl. France Couronne d'Ethiopie \*.

65. n°. 1 & 2. 398. Deux Couronnes d'Ethiopie, moins Gualt. tab.29. grandes & de couleur un peu plus foncée que les précédentes, & à deux rangs seulement de

\* séba, pl. spires couronnées \*.

for.n°. 4.

Gualt tab.29.

Gualt tab.29.

dant, & peu communes; elles différent de l'efpéce précédente, en ce qu'elles font marbrées par grandes taches blanc de lait & canelle foncé, flottantes dans deux larges zônes; elles ont deux rangs de spires couronnées comme

\*55ba, pl. pl. celles de l'article précédent \*.

65. n°. 12. 400. Deux autres petites & non moins rares,

fauves, à taches brunes disposées en deux zônes, & à une seule spire couronnée \*.

401. Cinq petites Tonnes; fçavoir, trois Tonnes. Couronnes d'Ethiopie, dont une canelle à large 65: 20: 10. zône du milieu moins soncée, & à une seule s. 4. spire couronnée \*; une à zône blanche nuée de fauve, & la troisieme marbrée de blanc & de 17. lett. F. marron; ces deux dernieres ont un gros mammelon & un commencement de couronne : une rare, paille nué de jonquille, qui ne différe des Couronnes d'Ethiopie, qu'en ce qu'elle est plus oblongue, plus mince, sans couronne. & que le mammelon, qui en est plus gros, y est formé d'un seul orbe, variété qu'on nomme Prépuce, & un Prépuce qui ne différe du précédent qu'en ce que le pas de sa spirale en est un peu concave \*.

\* Séba, pl.

402. Deux Gondoles mammillaires très-ra- 66. nº. 13 & res, en pendant, à robe marron-clair, marbrée dans trois zônes, & par chevrons, de taches blanches, à fix révolutions de spire, se recouvrant l'une l'autre, & dont les cinq dernieres composent un mammelon fort élevé, peu différent de la clavicule du Prépuce \*.

\* Bonair, cl.

403. Une grande Gondole mammillaire peu 3. f. 10; commune, couleur de tuile, à trois rangs de larges taches brunes, disposées par zônes, de forme très-renslée, & à mammelon peu saillant \*.

\* Lift, tab: 799. 11 . 6. Séba, pl. 64. 29.5866

404. Quatre Gondoles; scavoir, une mam? millaire fauve-roux foncé, à quatre orbes, dont TX. FAM. les premiers font féparés par un fillon très-TONNES. \* Séba, pl. profond \*; une sans mammelon, veince de ₹4. nº. 3. blanc, de fauve & de gris de lin, à extrémité de la lévre un peu sinueuse vers le haut, nom-\*Ibid. pl. 65. mée Tasse de Neptune \*; une blanche à pas du premier orbe saillant en dehors en vive arrête. concave en-dessus, & à très-petit mammelon, espèce qu'on nomme à Paris Cuiller de Nep-\* Ibid, no tune \*, & une Couronne d'Ethiopie de la variété de celles de l'article 398.

405. Deux très-grandes Gondoles, ventre de biche, sans mammelon & même sans tête. mais dans le fommet desquelles un prolongement de la lévre extérieure se replie sur l'intérieure, & y forme une espéce de petit umbi-\* Lift. tab. lic \*. On a enlevé une portion du dessous d'une de ces Gondoles, pour en faire voir le dedans.

302, f. S.

406. Une Harpe très - rare, marbrée par zônes inégales, de rouge - pâle tirant sur l'aurore, de brun & de blanc, à un grand nombre de côtes longitudinales laissant entr'elles des cannelures très-profondes; ces côtes se prolongent vers le haut dans tous les orbes, formant au bord du premier, qui est un peu concave, une espèce de couronne de petits tubercules, & se terminant vers le bas à un bourrelet qui

naît de la lévre intérieure : on nomme cette espèce Harpe noble \*,

407. Deux grandes Harpes peu communes en pendant, à quinze côtes étroites, rayées de pend. pl. 20, traits en zig-zag blancs & bruns, placées à diftances égales, & laissant entr'elles de larges cannelures petit gris: c'est la belle Harpe, ou

le Harpa nobilis de M. d'Argenville \*.

408. Deux autres Harpes en pendant, à 17, lett. D. quatorze côtes plus larges & plus inclinées que celles des précédentes, marbrées, ainsi que les cannelures, de traits ou chevrons couleur de rose, fauves, blancs & marron, à large zône intermédiaire un peu plus foncée, & à deux grandes taches brunes en-dessous \*.

\* Séba, pla

409. Deux autres, l'une à douze, l'autre à 70. Bonan, cl. 34 treize côtes inégales; elles différent d'ailleurs f. 185. des précédentes, l'une par ses couleurs moins foncées, l'autre par des chevrons plus nombreux, placés les uns près des autres en zigzag, & par des stries longitudinales mieux prononcées.

410. Neuf Harpes, dont fix très-variées par feurs marbrures & leurs coulcurs; une de l'efpéce de celles de l'article 407, & deux donton a enlevé les cannelures & conservé les côtes, ce qui met leur columelle à découvert.

411. Six Tonnes par pendans; fçavoir, deux grifes à stries circulaires, à grand nombre de fascies étroites, sormées de petits quarrés longs IX. FAM, alternativement blancs & violet soncé, à large bouche & à lévre intérieure tirant sur l'aurore, espéce qu'on nomme en Hollande le Rodolphe,

elpèce qu'on nomme en Hollande le Roacipne, & en France Conque Perssque ou Pourpre de \*Arg. pl. 17. Panama\*; deux grises à stries sines circulaires, Gualt tab. 51 & grosses fascies chargées vers le haut de tuber-litt. L. 56ha, pl. 72. culer, ressemblantes d'ailleurs à la Conque Per-he. 10.

\*\* Gualt. tab. fique, & à bouche aurore-vif \*; & deux autres 51. litt. A. Lift. tab. 988. de même espéce, couronnées de plus gros tuf. 48. bercules, & dont la tête est recouverte de

glands de mer.

412. Deux très-grandes Conques Persiques, polies, de la variété des deux premieres de l'article précédent, & d'un très-grand éclat.

413. Treize Tonnes, dont douze par pendans; sçavoir, deux orangées, marbrées par zônes inégales de blanc, à stries circulaires un peu rabotteuses, de forme oblongue, & à tête \*5664, pl. presente conique \*; quatre Conques Persiques

\*566a, pl. pren de conque , quarre conques 1 oppques 73. lett. T. d'Amérique, dont deux grandes & deux perites à fascies tuberculeuses violettes plus nombreufes, à robe un peu marbrée de blanc, & à bouche de même couleur que le fond : c'est la Mûre

\*Arg.pl.17. de M. d'Argenville \*; deux à sassies légérelett. H. ment tuberculeuses, dont les taches sont alter-1.st. tab. 959. nativement blanches & marron, & à bouche

\* séba, pl. orangé \* ; deux de la variété des premieres de

trieme du même article, mais à fascies tuberculeuses plus prononcées \*; & une petite fort IX. FAM. jolie, dont les marbrures blanches, noires & Tonnes. jaunes imitent le point d'Hongrie. 52. nº. 13 85

414. Onze Tonnes, dont dix par pendans & des espéces ci-dessus décrites; scavoir, deux grandes Oublies, deux Prépuces de la variété du dernier de l'article 401; deux d'une autre variété plus renflée\*, desquelles on a enlevé une \* Lift. mbs portion de la base, pour en faire voir la colu-796.f. 3melle; une Cuiller de Neptune, deux grandes Harpes, & deux Conques Persiques qui ne différent des premieres de l'article 411, que par de petites fascies blanches moins interrompues de taches violettes \*:

\* Séba , pli 72. H°. II.



## GENRE TROISIEME.

TONNES A BOUCHE GARNIE D'UNE PETITE QUEUE.

415. a ROIS Tonnes; scavoir, deux blanches nuées de couleur de chair, à robe réticu-IX. FAM. TONNES. lée, à tête applatie & de forme un peu allongée, \*Gualt tab. nommées Figues blanches \*; & une blanche 26. litt. M. nuée de jaune, à stries circulaires qui ne sont Séba, pl. 68. nº. 1-4. bien prononcées que vers la queue, qui est étroite & un peu contournée, à coque mince,

renslée de corps, umbiliquée, & à tête platte,

\* Arg. pl. 17. espéce nommée le Radix \*.

416. Quatre Tonnes par pendans; scavoir Séba, pl. 68. nº. 7. & 8. deux fauve-clair nué de gris, à stries circulaires. dont trois plus grosses & tuberculeuses, à tête. un peu élevée, à pas applatis couronnés de tubercules, & séparés par un petit fillon, à co-

\* Lift. tab. que épaisse umbiliquée \*, & qu'on peut regarder 894. f. 14. comme une autre espéce de Radix; & deux Figues blanches plus grandes que les précé-

dentes.

417. Trois Tonnes; scavoir, deux Figues bariolées de gris, de jaune-pâle & de brun; à quatre zônes plus blanches, à rézeau très-fin & rès-serré, & à bouche violette, ce qui les a

fait nommer Figues violettes \*; & un Radix à coque mince de l'espéce de celui de l'article IX. FAM.

418. Un beau Radix plus grand que les pré-17. lett. O. Séba, pl. 68. cédens, à stries fines circulaires s'étendant sur no. 5. toute sa robe, & à queue couleur de rose.

419. Trois Figues; sçavoir, deux peu communes; à coque plus épaisse & à queue plus longue que les précédentes, dont une blanche nuée & flambée de jaune, à stries fines circulaires, à pas applatis, bordés d'un cordon dentelé, & séparés par un fillon; une qui ne différe de la précédente que par ses flammes plus foncées, & par les pas un peu moins applatis, dépourvus du bord dentelé \* ; & une qui différe de celles de l'article 417, en ce qu'elle 19 8 20. est à bouche blanche, à rézeau mieux prononcé, à robe grise nuée de jaune, & marbrée par grandes taches de brun-roux.



### DIXIEME FAMILLE.

VIS.

Te font des Coquilles contournées à grand nombre de spirales, de forme conique très-effilée, à bouche petite, oblongue ou arrondie, & à tête fort élevée. Elles sont ou lisses, ou tuberculeuses, & se divisent ainsi naturellement en trois genres, qui sont:

- 1°. Les Vis lisses.
- 29. Les Vis striées.
- 3°. Les Vis tuberculeuses.



## GENRE PREMIER.

#### VIS LISSES.

420. LEUX grandes & belles Vis, fond blanc, à zônes obliques suivant la spire, à raison de deux par chaque révolution. & formées de taches brunes nuées de rougeâtre, inégales entr'elles, qui représentent quelquesois des caracteres, à bouche un peu oblongue & échancrée, espéce qu'on peut nommer Vis à caracceres \* : c'est le Cloud de M. d'Argenville.

X. FAM. VIS

\* Gualt. tab:

421. Deux très-belles Vis à caracteres de 56; litt. I. grandeur moyenne, & semblables aux précé-nº.6. dentes, à cela près que les taches de chaque lett. A. révolution de spire y représentent des caracteres mieux formés.

422. Deux très-belles Vis de forme fort effilée; sçavoir, une trés-grande à vingt-deux révolutions de spire, blanche, à deux rangs de taches brunes fur chaque révolution \*; & une moins grande & moins effice qui en différe en- Gualt, tab., 6. core en ce que chaque révolution de spire s'y litt. B. amincit dans le tiers le plus élevé de sa hauteur. & est chargée de trois zônes de taches, toutes deux de l'espèce nom- mée Vis tigrées \*.

423. Deux très-belles Vis peu communes.

\* Seba . ph 56. no. 27.

#### 220 COQUILLES UNIVALVES

X. FAM. VIS.

de couleur fauve, à dix-sept révolutions de spire, dont la moitié supérieure est un peu renflée & chargée d'une zône de taches blanches. rondes dans l'une, ovales dans l'autre \*.

\* Rumph. tab.30. litt. D. Séba, pl. 56. Do. II.

424. Quatre Vis; scavoir, deux rares couleur de chair, à dix-sept révolutions de spire, flambées de traits longitudinaux blancs, exceptédans la partie supérieure qui est un peu rentrante, & forme une espéce de ruban de la couleur du fond; & deux Vis tigrées de la variété de la premiere de l'article 422.

425. Six Vis par pendans, dont deux de l'espéce des deux premieres de l'article précédent;

deux à caracteres, & deux tigrées.

426. Quinze Vis de moyenne grandeur & petites; sçavoir, quatre, dont deux blanches l'une fasciée en zig-zag, & l'autre ponctuée de canelle, & deux bariolées de blanc, de fauve & de brun, toutes de forme un peu cylindrique, à bouche très - oblongue, & s'élargissant vers le bas, espéce nommée la Tarriere ou l'Ai-\* Arg. pl. 11. guille à coudre \* ; une blanche ponctuée de ca-

Lit. 14b. 738. nelle dans le bas de chaque révolution, & de Arg. pl. sorme effilée, nommée le Poinçon \*; une encore plus effilée, à lignes longitudinales oran-

\* Ibid. let. Z. gées, nommée l'Alène \*; deux blanches à une large zône bleu-foncé, quelquefois interrompue,

\* 56ba, pl. régnant vers le haut de chaque révolution de 56. no. 35.66 spire \*; une à révolutions de spire un peu renAées vers le haut, où elles sont pointillées de marron, & à taches longitudinales de même X. FAM. couleur dans la partie rentrante des spires qui, avec les points supérieurs, imitent les caracteres Hébraiques; deux tigrées, deux à caracteres, & deux de l'espèce des premieres de l'art. 424.

### GENRE SECOND.

VIS STRIÉES.

427. VINGT-QUATRE Vis strices; sça. voir, deux marbrées de gris & de lilas, à douze orbes bombés diminuant proportionnellement. & chargés chacun de petits bourrelets longitudinaux qui se raccordent & tiennent ensemble d'un orbe à l'autre, comme dans la Scalata, sans cependant laisser de jour entr'eux, comme dans celle-là \*, à laquelle ces Vis ressemblent \* voy. l'art. d'ailleurs, ce qui les a fait nommer fausses Sca- 55 des Coq. de lata\*; deux fausses Scalata blanches de nos gue. \* Bonan. cl. mers \*; deux autres petites d'Amérique, lie de 3.f. 111. vin obscur; une autre aussi d'Amérique, grise 188. f. 51. nuée de blanc, & à stries plus en vive arrête que celles des précédentes; une plus petite, blanche, à moins de révolutions, & fort ventrue; deux fausses Scalata de l'espèce des se-

condes de cet article, à orbes découpés, &

X. FAM. VIS.

dont il ne reste plus que les stries, ce qui permet d'en voir l'intérieur; & quatorze Vis par pendans, de l'espèce nommée Enfant au maillot, dont deux rares d'Amérique, blancs, de forme cylindrique & bombée, à stries en forme de rides sur le premier orbe seulement, à bouche garnie de deux dents, à lévre extérieure retroussée en dehors, umbiliqués, & grands dans cette espéce; deux rares de forme courte & renflée, & à bouche dépourvue de dents; deux de forme un peu plus allongée, à bouche \* Lift. tab. garnie de deux dents 1; deux encore plus 88. 1. 47.
<sup>2</sup> Ibid f. 48. longs <sup>2</sup>; deux à stries plus nombreuses & moins prononcées 3; deux de nos mers 4; & deux rares des Indes, lisses & blancs, à trois larges bandes bleues, à bouche dépourvue de dents,

3 Ibid. f. 49. 4 Séba, pl. 59. no. 21.

téte tronquée.

988. f. 47.

428. Une Vis des Indes, marron - brun, à stries circulaires bien prononcées, à stries longitudinales fines en forme de rides, & à base presque platte, espèce nommée en Hollande la Boule, en France le Télescope, & grande dans cette espéce 5.

& qu'on nomme plus particuliérement Vis à

5 Arg. pl. 11. letti B. Séba, pl. 50. 12º . I-4.

429. Une Vis des Indes, brune nuée de fauve & de verdâtre, à révolutions de spire chargées chacune de trois stries circulaires & de plis longitudinaux qui les rendent onduleuses, à lévre extérieure fort évalée & un peu retroussée en dehors, espéce nommée à Paris la Cuiller à pot: celle-ci porte cinq pouces de long, & est d'une X. FAM. belle conservation \*. ,

430. Une autre Cuiller à pot un peu moins so. nº. 13 & grande que la précédente.

431. Un Télescope, & une Cuiller à pot de

moyenne grandeur.

432. Une très-belle Aiguille des Indes de plus d'un demi-pied de long, marron s'éclairciffant de plus en plus depuis le bas jusqu'à la clavicule qui est blanche, à trente-quatre orbes bombés, chargés chacun de six stries séparées par de profondes cannelures, & à bouche presque ronde, nommée par Séba Aiguille faite en vis de tambour \*.

433. Deux Aiguilles en pendant de l'espéce n°. 12. Gualt. tab. 58. de la précédente, mais de forme moins allon-litt. A. Arg. pl. II. gée, de couleur fauve, & de vingt-trois orbes lett. D.

Leulement.

434. Une grande Vis blanche nuée de fauve. à orbes chargés de stries circulaires très-fines. & de trois plus marquées, dont une très-saillante en vive arrête, à pas des orbes formant avec leurs voisins des angles rentrans, & à bouche semblable à celle des précédentes, espéce que l'on connoît sous le nom de Vis de presfoir\*.

\* Gualt. tab, 435. Deux Vis de pressoir en pendant, moins 18. litt. B.

grandes que la précédente, & qui en différent

# COQUILLES UNIVALVES

X. FAM. VIS.

d'ailleurs, en ce qu'au-dessus de la grande arrête qui forme la sommité de chaque orbe, on y en remarque une seconde un peu moins sorte, laissant entr'elle & l'autre une large cannelure\*.

\* Arg. pl. ii. lett. C.

litt. C.

436. Treize Vis, dont douze par pendans; Gualt, tab. 18. scavoir, deux peu communes, & grandes dans leur espéce, nuées de blanc, de fauve & de bleu, à bouche oblongue, à révolutions de spires séparées chacune en deux par un fillon vers les deux tiers de leur hauteur, & chargées de cannelures longitudinales très-serrées \*; deux marbrées de brun, de blanc & de fauve-roux, à stries circulaires grosses & fines, à révolutions

\* Ibid. tab. 57. litt. N. List. tab. 837. £. 642

4 Gualt, tab. 78. litt. E. Seba, pl. 56. nº. 33 & 34.

de spires applaties & séparées par un léger fillon, à bouche presque ronde, & grandes dans leur espéce \*; deux de forme à peu près semblable, à dix retours de spire, chargés chacun de trois cordelettes noires, féparées par des cannelures blanches; deux blanches de la variété de celles de l'article 433; deux petites grifes de la même espéce; deux grifes nuées de fauve, qui n'en différent que par des stries plus grosses au haut de chaque orbe \*; & une Vis

\* Liff. tab. \$91, fig. 56.

de pressoir de la variété de l'article 434, 437. Vingt Vis de dissérentes grandeurs dont seize par pendans; sçavoir, deux Aiguilles peu communes, à taches quarré-long, alternasivement rouges & incarnates, à stries circu-

laires

laires traversées de hachures longitudinales qui les rendent granuleuses, & à révolutions de X. FAM. spire, bordées chacune, tant en haut qu'en bas, d'une espèce de bourrelet \*; quatre autres pe- \*Rumph.tal; tites fond bleu ou verd de pavot, à révolutions de spire, chargées de stries longitudinales, & bordées dans le haut d'une zône blanche ponctuée de rouge-brun, espèce nommée le Perçoir ou le Fores \*; deux couleur de chair, tachées \*Arg. pl. 113 par zônes d'aurore; elles différent des précé-lett. R. Lift. tab. 9784 dentes par leurs stries moins prononcées, & f. 36. par leur bordure de même fond que le reste; une de même espéce, dont les stries ne sont sensibles que vers la tête; deux à robe réticulée, aurore nuée de blanc; une couleur de chair de l'espèce des premieres de l'article précédent; deux de l'espèce des troisieme & quatrieme du inême article, mais à stries circulaires plus fines; deux de même forme, blanc-sale, marbrées par traits longitudinaux de fauve-roux, à stries circulaires très-fines, & à deux groffes paralleles entr'elles sur chaque orbe \*; une blanche de la variété de celles de l'article 433; deux petites 592. f. 60; de la même espéce, fauve teint de gris de lin, & une Vis de pressoir.

\* Ibid. tab.



# GENRE TROISIÉME

VIS TUBERCULEUSES.

X. FAM. VIS.

438. UATRE grandes Vis des Indes par pendans; sçavoir, deux blanches bariolées de rouge & de bleu foncé, à stries circulaires, à douze orbes chargés de gros tubercules, à lévre extérieure épaisse & dentelée, & à pe-\* Gualt, tab, tite queue \*; & deux qui ne différent de cellesci qu'en ce que la lévre extérieure en est mince, recourbée en dedans & sans dentelures.

57. litt. G. Lift. tab. 1023. fig. 87. Séba, pl. 50. nº. 15 85 16.

439. Cinq Vis, dont quatre par pendans; scavoir, deux blanches tachées & pointillées de brun, à orbes garnis d'un rang de tubercules, à lévre extérieure épaisse, & à petite queue retroussée, espèce que l'on nomme Chenille bariolée \*; deux gris-de-fer, chargées de deux rangs de tubercules, l'un sur le milieu de chaque orbe, l'autre vers le haut, à lévre extérieure moins épaisse, & petite queue moins retroussée que les précédentes, espéce nommée Chenille

\* Arg. pl. 11. lett. H. Séba, pl. 50. 11°. 37.

fig. 82.

\*Gualt. pl. noire \*; & une comme les premieres de l'arti-56. lett. L. cle précédent. Bonan. cl. 3.

> 440. Quatorze jolies Vis de moyenne grandeur par pendans; sçavoir, deux marron-brun, à révolutions de spire, formées de cordons gra

nuleux d'inégale grosseur, & nommées le Clocher ou l'Obélisque Chinois \*; une qui différe X. FAM. des précédentes, en ce que le haut de chaque orbe est couronné de tubercules blancs, & le lett. F. milieu ceint de deux stries granuleuses fauves, espéce qu'on nomme l'If \*; un If marron-brun \*Ibid.let.&. en entier; deux Vis peu communes, marron, l'une clair, l'autre plus brun, à côtes longitudinales, & à stries circulaires quelquefois granuleuses, à bouche presque ronde, à lévre extérieure renssée, très-saillante en dehors, & se repliant sur l'intérieure en avant de la petite queue qu'elle ferme en tuyau, ce qui la rend très-singuliere \*; deux autres non moins rares, \*Rumph.tab. fauve-noirâtre, réticulées, à huit orbes bom- 30. litt. T. bés, à bouche ronde échancrée, à lévre extérieure relevée en dehors en bourrelet, & à clavicule tronquée; deux blanches réticulées & granuleuses dans les angles du rézeau, à bouche ovale finissant par une petite queue retroussée, espéce qu'on peut nommer Chenille blanche réticulée \* ; deux fauve-grisatre, à stries circulaires granuleuses, & nommées Chenilles gra- 1020. f. 84. nuleuses\*; & deux Chenilles bariolées.

\* Lift. tab.

\* Ibib. tab.

441. Neuf Vis de moyenne grandeur, peu 1018.f. 80. communes; fçavoir, une fauve, à douze orbes formés chacun de quatre rangs de stries granuleuses, à six côtes longitudinales granuleuses aussi, qui en rendent la forme approchante de

X. FAM. VIS.

celle d'une pyramide hexagone, à une couronne de tubercules plats sur le premier orbe, à bouche ronde & à lévre extérieure fort saillante, espèce nommée le Clocher Gothique: on en trouve l'analogue fossile à Courtagnon; un Clocher, verd-clair, à stries circulaires très-fines. à révolutions de spire, chargées chacune de huit gros bossages, à bouche ovale, & à lévre extérieure mince; deux blancs, tachés par zônes inégales de marron clair, à dix orbes bordés dans leur milieu de tubercules aigus, & féparés les uns des autres par de larges pas en doucine, de forme conique vers le bas, à bouche oblongue, & à lévre extérieure mince, échancrée vers le haut ; une Vis marbrée de marron, de blanc & de bleu clair, à côtes longitudinales, & stries fines transversales formant un rézeau, à bouche oblongue, à lévre extérieure échancrée en haut & en bas, & dentelée: trois blanches, dont une marbrée de fauve, à stries circulaires, à dix orbes tuberculeux, & à bouche semblable à celle de la premiere de cet article; & une blanche à stries circulaires granuleuses, à neuf révolutions de spire, concaves vers leur milieu, & bordées vers le haut de cercles tuberculeux plats, à un rang de petites côtes longitudinales sur le premier orbe, à lévre extérieure échancrée vers le haut, & à umbilic.

442. Neuf Vis peu communes, dont huit par pendans; fçavoir, deux blanches à quinze ré- X. FAM. volutions de spire, couronnées de plis longitudinaux peu faillans, à bouche oblongue finissant par une petite queue retroussée, grandes dans leur espèce, & nommées Chenilles blanches \*; \* Arg. pl. 12. deux fond blanc, à révolutions de spire, tachées Gualt. tab. vers le bas de couleur de chair, entre deux cer- 17. litt. D. cles ponctués de même, & couronnés vers le F. 83. haut de petits tubercules, à bouche oblongue & échancrée dans le bas \*; deux d'Amérique, blanches, à vingt retours de spire concaves, 56.10° 9 & tes chargées dans leur milieu de feuilles inclinées, bordées en haut & en bas d'une cordelette, & séparées par un sillon, à bouche presque ronde, & qu'on peut nommer Vis feuilletées; deux Vis feuilletées blanches, tachées & fasciées de fauveroux; & une blanc de lait, très-rare, assez semblable de forme aux précédentes, dont elle differe en ce qu'on apperçoit, au lieu de feuilles, des enfoncemens irréguliers qu'on croiroit faits à coups de marteau, ce qui lui peut faire donner le nom de Martelée \*.

443. Quatorze Vis, dont dix par pendans; 585. f. 53. fçavoir, deux Chenilles granuleuses blanches, nuées & tachetées de brun-roux, & à stries circulaires très-sines entre les stries granuleuses \*; \* séba, plane marron obscur, de forme effilée, à révolu-51.n°. 26, tions de spire, composées chacune de trois petits.

une de trois petit

## 230 COQUILLES UNIVALVES

cordons granuleux; deux fauves de l'espéce des X FAM. V15.

Chenilles noires; une de même forme, mais à tubercules plus allongés; une Chenille bariolée; une Chenille blanches réticulées; deux Ifs, & deux grandes Tigrées, des orbes desquelle les intersfices ont été enlevés pour mettre à jour la columelle & la rampe un peu concave qui tourne autour.



### ONZIEME FAMILLE.

VOLUTES.

Nous rangeons sous ce nom toutes les Coquilles dont les spires compri- XI. FAM. mées & roulées les unes sur les autres, se terminent d'un côté en une tête applatie ou peu élevée, & forment de l'autre tantôt une pyramide plus ou moins conique, ce qui constitue le genre des Cornets, & tantôt une espéce de cylindre, ce qui constitue celui des Rouleaux. Toutes ont une bouche étroite & longue; mais, dans les Rouleaux, la lévre intérieure est ou cachée en dedans comme celle des Cornets, cas où nous les appellerons simplement Rouleaux, ou cette lévre se montre en dehors, & est alors garnie de dents avec une échancrure vers le bas, ce qui caractérise les Rouleaux proprement dits, appellés Olives. Nos trois genres de Volutes font donc,

Piv

### 232 COQUILLES UNIVALVES

- XI, FAM. NOLUTES. nets.
  - 20. Les Volutes cylindriques, ou Rouleaux.
  - 3°. Les Volutes échancrées, ou Olives.

## GENRE PREMIER.

VOLUTES CONIQUES, OU CORNETS.

444. Un Cornet des Indes, très rare, blanc nué de couleur de rose, à deux larges zônes orangées, & à grand nombre de petites du fond, tachetées de rouge brun, à stries fines, à tête élevée, & à pas un peu concaves, connu sous le nom d'Amiral d'Orange, & grand dans

\* Arg. Ap- son espèce \*.

pend. pl. 1. 445. Un autre Amiral d'Orange, de cou-Rumph. tab. leurs plus foncées, de forme plus oblongue, & 34. litt. A. 2 pas moins concaves que le précédent.

446. Un Cornet marbré de larmes blanches fur un fond rouge-brun, & à trois larges zônes jaunes, dont une fur le haut du corps, l'autre en bas, & la troisseme au milieu; celle-ci est divisée en deux par une bandelette de la mara

brure du fond : on nomme cette Coquille l'Amiral \*.

447. Un *Amiral* de même espéce que le précédent.

Séba, pl. 48;

448. Un Amiral de même fond & marbrure, no. 5. & à trois larges zônes jaunes comme le précédent ; il en différe seulement en ce que celle d'en haut est suivie d'une autre petite zône de même couleur, & que celle du milieu est chargée de deux bandelettes, dont une de la marbrure du fond. & l'autre formée de simples traits bruns, ce qui met cette Coquille dans l'espéce de celles qu'on nomme Amiraux à deux bandes \*.

\* Ibid. nº. &

449, Un Cornet de même fond & marbrure que les précédens, qui ne différe de l'Amiral de l'article 446, qu'en ce que la zône du milieu n'y est point chargée d'une bandelette; on le nomme Vice-Amiral \*.

450. Un Vice-Amiral de même espèce, mais lett. H. à taches blanches plus grandes.

451. Un Cornet des Indes, rare, de même fond & marbrure que les précédens, mais différent en ce qu'on n'y remarque que la zône jaune du bas, & un léger vestige de celle du milieu, ce qui pourroiele faire nommer Amiral masqué.

451. bis. Un très-beau Cornet des Indes, rare. peu différent des précédens pour le fond & la marbrure, mais d'un volume beaucoup plus

XI. FAM. VOLUTES.

fort, à clavicule élevée, & à une zône de trois petites bandelettes de points vers les deux tiers de sa hauteur, nommé l'Amadis, & grand dans

\* Ar. App ·cette espéce \*. pl. 1. lett. 5.

452. Quatre Cornets; scavoir, deux d'Amérique, blancs nués de couleur de rose, à flammes longitudinales aurore, interrompues dans le milieu par une zône irréguliere du fond, à stries circulaires, & à pas des orbes un peu con.

48. nº. 26.

\* Séba, pl. caves, nommés Amiraux d'Angleterre \*; & deux des Indes, marron, marbrés de larmes blanches, sur-tout dans une zône près du milieu, à pas un peu concaves, & nommés Vice-Amiraux de Rumphius \*.

4 Rumph. tab. 34. lit. F. Arg. App. pl.

453. Quatre Cornets; scavoir, un blanc de forme effilée, à stries circulaires peu prononcées, nommé le Bout de chandelle; un Amiral d'Angleterre, & deux Vice-Amiraux de Rumphius, un peu moins grands que les précédens.

454. Un Cornet à robe ornée de zônes inégales, jaune clair, blanches & couleur de chair, marquetées de taches brunes, nommé en Hollande Volute de Guinée, & en France l'Aîle de Papillon; il est des plus grands de cette es-

\* Arg. pl. 12. péce \*. lett. V.

455. Une Aile de Papillon, un peu moins Rumph. tab. 34. litt. G. Séba, pl. 48. grande & de couleurs un peu plus foncées. mº. 1-3.

456. Une autre, dont les zônes mouchetées font un peu moins larges.

457. Idem, à cela près que les zônes en sont plus multipliées.

. VOLUTES.

458. Quatre jolis petits Cornets par pendans; sçavoir, deux blancs, à deux zônes formées d'un réseau canelle très-fin, l'une large, fituée au haut du corps, & l'autre étroite, placée un peu au-dessous du milieu \*; & deux Aîles \* Arg. pl. 123 de Papillon.

Lift. tab. 188.

459. Deux Cornets rares, à tête élevée, dont f. 41. un marron clair, marbré vers le haut par bandes longitudinales peu régulieres de blanc, & à une zône blanche ponctuée dans son milieu de même couleur que le fond, ce qui le peut faire ranger parmi les Amiraux; & un marron marbré par flammes longitu inales étroites de blanc, à petites fascies circulaires, dont les cannelures sont piquetées de très-petits trous.

460. Quatre jolis Cornets par pendans; sçavoir, deux peu communs, à tête élevée, à robe marron clair tirant sur le roux, marbrée de taches blanches nuées de bleu, & à deux zônes de même couleur, chargées de traits en zig-zag du fond, espéce nommée par quelques - uns faux Amiral de Guinée; & deux à pas des orbes un peu concaves, à clavicule élevée & aiguë, à robe fasciée de trois zônes blanches, & de deux plus larges, intermédiaires, canelle, chargées les unes & les autres de bandes longitudi-

## 236 COQUILLES UNIVALVES

nales ondées pourpre foncé, & nommées Flam-XI. FAM. boyantes \*.

Volutes.

\*Ag. pl. 11.

461. Quatre autres des mêmes espéces; sçatett. T.

Gualt tab. 10. voir, deux faux Amiraux de Guinée, à tête un

litt. G.

peu moins élevée, & à taches plus blanches;
& deux Flamboyantes à bandes longitudinales

plus fines, & à zônes moins larges que les pré
cédentes.

462. Quatre autres des mêmes espéces; sçavoir, deux faux Amiraux de Guinée, dont un comme ceux de l'article 460, & un qui en disfére en ce que le bleu domine davantage dans sa robe, qui est fasciée de deux larges zônes marron clair, marbrées du sond, & d'une petite zône blanche intermédiaire, toutes ponctuées de marron dans les parties de la robe, qui ne sont point de cette couleur; & deux grandes Flamboyantes, à zônes brunes plus larges à proportion que celles des précédentes.

463. Six Cornets des Indes par pendans, tous à tête élevée; fçavoir, deux peu communs, blancs marbrés de taches fouci en forme de nuages, à cercles légérement granuleux vers

\* 566a, pl. le bas, & à spirale de dix orbes tuberculeux \*;

44. n°. 20 & deux de forme à peu près semblable, sasciés & tachetés de blanc, de verd de terrasse, & de rouge soncé, avec quelques cercles rougeâtres presque imperceptibles; & deux Flamboyantes.

à zônes brunes comme les précédentes, mais dont les zônes blanches, sur-tout celle du mi- XI. FAM. lieu, ont un ou deux rangs de points bruns Volures. plus ou moins distans les uns des autres.

464. Quatre Cornets rares des Indes & à tête élevée; sçavoir, un blanc à grosses stries & profondes cannelures circulaires, chargées vers le haut de stries onduleuses très-fines, & à dix orbes, dont les pas sont un peu renflés, formant une seconde variété de l'espéce nommée Bout de Chandelle; deux blancs à deux zônes jaunes interrompues, dont celle d'en hau beaucoup plus large, à un grand nombre de cercles granuleux, & à dix orbes tuberculeux, nommés la Peau de chagrin \*; & un à zônes alternatives inégales en largeur, les unes blanches, bariolées 12. lett. R. de rouge foncé & de bleu pâle, les autres vertes. chargées de quelques cercles légérement granuleux.

465. Six Cornets des Indes par pendans; sçavoir, deux peu communs, blancs nués de bleu, à trois rangs de petites taches longitudinales vertes ondées, ponctués par zônes de marron clair, & à tête peu haute, mais dont s'éleve une clavicule très-fine \*; deux blancs, \*Rumph. à deux zônes fauve clair, à stries fines & larges séba, pl. 43. cannelures circulaires, & à bas du corps violet; nº, 32, & deux Flamboyantes.

466. Six autres par pendans; sçavoir, deux

blancs à gros traits longitudinaux en zig-zag XI. FAM. orangés, le réunissant quelquesois, & formant Volutes. des espéces de caracteres bizarres, à fillons cir-

\* List. tab. culaires peu prononcés, & à coque très-mince \*;
783. s. 50.
Rumph. tab. deux de l'espéce des deux premiers de l'article
92. litt. S.
précédent, mais un peu dissérens pour les couleurs; & deux Flamboyantes, des zônes de l'une
desquelles la moitié de dessus est rouge-brun,
& celle de dessous jaune.

467. Six autres par pendans; sçavoir, deux orangés, à deux zônes, l'une de taches blanches dans le haut, l'autre toute blanche vers le bas, à quatre stries granuleuses au-dessus de cette derniere zône, & à pas des orbes un peu concaves \* : deux de l'espéce des premiers de

\* 56ba, pl. concaves \* ; deux de l'espèce des premiers de 42·n°·40·42·l'article précedent ; & deux *Flamboyantes* comme la dernière du même article.

468. Deux Cornets des Indes, très-rares & en pendant, blancs, à deux zônes de taches rouge-brun, celles d'en haut un peu déchiquetées, & à grand nombre de petits points de même couleur, rangés circulairement sur tout le corps & sur la spirale.

469. Neuf petits Cornets; sçavoir, un blanc à deux larges zônes orangé, & à trois bandes blanches, chargées chacune de deux rangs de points de la couleur du fond, mais dont celles du haut & du bas sont presque masquées, à pas des orbes un peu concaves, & qu'on peut ran-

ger parmi les Amiraux 1; deux verds de diverses nuances, à stries longitudinales très-fines, XI. FAM. formant avec les transversales, qui sont mieux prononcées, une espéce de rézeau, à tête ap- 14. n°. 11 & platie, à clavicule aiguë, & à dix orbes tuberculeux; deux qui peuvent se rapporter aux deux premiers de l'article 458, mais différens, le premier, en ce que les mailles du rézeau des zônes y sont plus grandes, le second, en ce que le rézeau s'y étend presque sur tout le corps; deux de l'espéce de ceux de l'article précédent; une Aîle de Papillon, & un Amiral d'Angleterre.

470. Douze petits Cornets par pendans: sçavoir, deux à robe verd-de-terrasse & granuleuse vers le bas, violets en dedans, à spirale de dix cordons tuberculeux, & nommés en Hollande Fromages verds; deux de même espéce, mais dépouillés, dont la moitié supérieure du corps est devenue violet couronné de blanc, & la moitié inférieure est restée verd de terrasse; deux blancs, marbrés par zônes de taches quarré-long orangé vif, & nommés en Hollande Nattes d'Italie 2; deux blancs à taches 2 Ibid. pl. 55% irrégulieres souci, disposées par zônes, & ponc- nº.4-10. tués de même dans les intervalles; deux blancs à trois zônes de taches larges un peu oblongues, violet foncé, à stries granuleuses dans le bas, & à spirale chargée de taches semblables,

Espéce nommée l'Hébraïque ; & deux blancs XI. FAM. marquetés par zônes de petites taches quarrées Volutes. Arg. pl. 12. noirâtres 2.

tit. Trois Cornets, dont deux d'Amérique Gualt. tab. 15.

List. tab. 179. cles ponctués de fouci, & à deux zônes de bandes de fouci, & à deux zônes de même de constant de la constant de

<sup>2</sup> List. tab. longitudinales, larges & irrégulieres, de même 7,4.f. 20. couleur, à pas des orbes un peu concaves, & tachés de même que le corps; & un Fromage verd dépouillé, inarbré par larges bandes longitudinales de fauve & de gris nué de violet, à une zône partie blanche, partie violette, située dans le milieu du corps, & très-grand

dans l'espéce.

472. Douze petits Cornets; sçavoir, cinq variétés d'Hébraique, dont une comme celles de l'article 470; une qui en différe par ses taches rouge-brun; une dont les taches du premier rang sont longues & ondées, & celles du second rang ne sont au contraire que de simples points sort distans les uns des autres; une couverte presque en entier de taches longitudinales ondées, violet-noir, & à cannelures circulaires; & une qui dissére de cette derniere, en ce que les taches en sont interrompues dans le haut & vers le milieu par deux petites zônes blanches 3; un Cornet couleur de chair, à une

Jibid. f. 26. Dianches 3; un Cornet couleur de chair, a une Gualt, tab. 25. zône blanche au-deflous du milieu, à ftries cirlitt. Q. culaires,

culaires, à tête élevée & tuberculeuse; un blanc bariolé de canelle foncé, à deux zônes de mê- XI. FAM. me, & à pas des orbes un peu concaves; deux VOLUTES, Nattes d'Italie, une très-jolie Flamboyante à zônes jonquille, & deux comme les derniers de l'article 470.

473. Trois Cornets des Indes, peu communs; fçavoir, deux blancs à trois zônes fauves peu prononcées dans l'un, à flammes longitudinales brunes, étroites & ondées, striés vers le bas & dans toute la spirale \*; & un blanc couvert en \* quale talls entier de points orangés, gros & petits, dispo-25. litt. S. sés par zônes nombreuses, à stries circulaires très-fines, à pas des orbes un peu concaves, & à clavicule élevée, espéce qu'on pourroit nommer Cornet ponctué.

474. Un très-grand & beau Cornet des Indes, souci, tacheté par zônes de points rouge= brun, à tête applatie, formée d'orbes un peu bombés, & tachetés de lignes ondées de même couleur, à clavicule aiguë, & nommé Pelotte on Tine de heurre \*.

475. Deux Tines de beurre, moins grandes 14. 18°. 1-4. Rumph. tabi que la précédente, l'une paille à points plus ;i.litt. C. distans & moins nombreux, & l'autre jonquille foncé à taches plus grandes.

476. Deux Cornets des Indes en pendant l'un fauve clair, rayé transversalement, & fort serré de brun, à tête applatie & clavicule aiguë

Tome I.

### 242 COQUILLES UNIVALVES

nommé Minime \*, & grand dans cette espèce; XI. FAM. & une Tine de beurre de moyenne grandeur, VOLUTES. \* Arg. pl. jaume pâle, & rare en ce que les cercles de ra. lett. A. Rumph. tab. points y font fort près les uns des autres. 12. lett. A.

31. litt. V. Seba, pl. 540 11° . 3 & 4.

val. nº. 34.

litt. D.

477. Deux grands Cornets des Indes, peu communs, l'un aurore, l'autre marron clair, tous deux cerclés de raies fines plus foncées, semblables à celles du Minime, ornés vers le bas d'une zône blanc-sale, assez large, & d'une autre plus étroite dans le haut \*.

\* Thid. no. I Si 2.

478. Quatre Cornets par pendans; sçavoir, Valentyn.unideux blancs à zônes formées de grandes & petites taches irrégulieres, d'espéces de caracteres, de lignes interrompues & de points rougebrun, nommés Spectres, & grands dans leur

4 Arg: pl. espèce \*; & deux Minimes. 12 lett. C.

479. Quatre autres par pendans; sçavoir, Séba, pl. 44. deux rares bleuâtres, à grand nombre de zônes nº. 24 & 25. Gualt. tab. 21. formées de lignes interrompues ou traits rouge - brun qui se répondent mutuellement en longueur, & à une zône blanche dans l'un, qui ne paroît point dans l'autre, à tête applatie, ta. chetée d'amaranthe, & qu'on nomme Minimes

\* séba, pl. bleus \*; & deux Spectres moins grands que ceux de l'article précédent, & de dessein un peu dif-54. nº. 5. férent.

> 480. Quatre Cornets des Indes par pendans; sçavoir, deux peu communs, dont un blanc nué de couleur de chair & de bleu pâle, à

grandes taches verd foncé, étendues sur la robe en forme de nuages, dans deux zônes interrom-XI. Fam. pues; & un verd foncé, à une zône de taches VOLUTES. blanches nuées de bleu, & quelques autres taches semblables vers le haut, tous deux â tête applatie, couronnée de tubercules, à clavicule élevée, & à quelques stries circulaires granuleuses peu prononcées \*; & deux Spectres à \* 55ba, pte zônes de points plus nombreuses que dans les 44. n°. 165 précédens.

481. Quatre Cornets par pendans; sçavoir, deux de l'espéce des deux premiers de l'article 471, mais dont un n'est composé presque en entier que de cercles ponctués de rouge-brun; & deux Tines de beurre de moyenne grandeur.

482. Quatre autres par pendans; sçavoir; deux blancs nués & veinés d'orangé, en forme de filamens un peu onduleux, & à deux larges zônes brunes, dont la plus basse termine la Coquille, à tête peu élevée, & à révolutions de spire comme collées l'une contre l'autre, espèce nomnée le faux Amiras ou Navet\*; & deux \*Arg.pl. 12. qui ne dissérent des deux premiers de l'article seta, pl. 425. 471, qu'en ce que leurs taches & leurs points not couleur brune.

483. Un Cornet des Indes de cinq pouces quatre lignes de long, blanc, à deux larges zônes jonquilles, interrompues du fond, & cerclé dans les intervalles de traits, de taches & s

XI. FAM.

de points plus ou moins gros de même couleur, à tête applatie, & nommé la Spéculation\*.

VOLUTES. \* Séba, pl. 45. nº. 9. Gualt tab.22. lit. B.

484. Quatre Cornets par pendans; sçavoir, deux Navets, différens de ceux de l'article 482, en ce que les deux premieres révolutions de spires, au lieu de se trouver dans le plan des suivantes, s'en retirent en spirale, particularité qu'on remarque rarement dans les Volutes; & deux Spéculations de moyenne grandeur.

485. Trois Cornets des Indes; sçavoir, deux en pendant, jaune-roux, marqués vers le haut, à la tête, & dans une zône du milieu, de taches blanches, à tête peu élevée, à pas des orbes un peu concaves, striés circulairement, & à pointe brune un peu recourbée, nommés Aumusses \*; & une grande Spéculation, remarquable en ce que certains de ses cercles, sur-tout ceux d'en haut, paroissent formés d'une suite de caracteres, parmi lesquels on dissingue des A, des X & des Y très-bien formés.

\* Séba , pl. 44. nº. 8-11. Gualt. tab. 21. litt. E.

486. Deux très-beaux Cornets des Indes, blancs, cerclés de plusieurs rangs de points, de traits & de taches rouge-brun, imitant des caracteres, sasciés dans les intervalles de cordons jonquille pâle, dont quelques-uns sont aussi ponctués de rouge-brun, nommés fausses de Papillon, & des plus grands de cette es-

\* Arg. pl. péce \*.

<sup>72.</sup> lett. Q. Séba, pl. 44. 487. Cinq Cornets de moyenne grandeur; nº, 5.

scavoir, une fausse Aile de papillon, deux Spéculations, un Navet, & une Tine de beurre.

488. Deux grands Cornets des Indes en pendant, blancs, à taches violet foncé, de forme à peu près quarré-long, distribuées par zônes, à tête platte, & nommés Damiers \*.

489. Quatre grands Cornets; sçavoir, deux Gualt. tab.21, vet.

Damiers en pendant, une Aumusse, & un Na-litt, O.

490. Quatre autres par pendans; sçavoir, deux Damiers ornés chacun de trois zônes jaunes, sur lesquelles les taches noires ne s'étendent pas moins que sur le fond, & nommés pour cette raison Damiers à bandes; & deux Aumusses qui différent dans leur marbrure des précédentes \*.

Séba, pla

491. Quatre Cornets des Indes par pendans; 45. n°. 16 & sçavoir, deux noirs parsemés de grandes taches blanches, à peu près triangulaires, à tête applatie, à pas des orbes concaves & légérement tuberculeux, espéce nommée Tigre noir \*; & deux Damiers à bandes jaunes, nués de cou-22. litt. D. leur de chair.

Séba, pl. 46, nº . 3 & 4.

492. Quatre autres comme les précédens, à cela près que les bandes de l'un des Damiers font jonquille tendre.

493. Deux très-grands Tigres noirs en pendant, dont quelques-unes des taches blanches

### 246 COQUILLES UNIVALVES

XI. FAM. tre ondées & dentelées.

VOLUTES.

494. Un très-beau Tigre, dont le fond est jaune-orangé, & qu'on nomme par cette rai-

\*Arg. pl. 12. fon Tigre jaune \*.

pendans; fçavoir, deux Damiers à bandes jaunes, deux Tigres noirs, rares en ce que les taches y font moins fréquentes, fur-tout vers le

\* Ibid. no haut \*, & deux Spéculations.

496. Dix Cornets de moyenne grandeur, par pendans; sçavoir, deux Tigres d'un roux-noir, rares en ce que les taches blanches ne paroiffent que dans deux zônes, ce qui les a fait \* Ibid. n° nommer Amirales par quelques Hollandois \*;

5 & 6.
\*Arg. pl. 12. un Tigre à fond roux, appellé Tigre rouge \*;
un Tigre jaune; deux Damiers à bandes jaunes;
deux Tines de beurre, & deux Nattes d'Italie.

497. Six Cornets par pendans, sçavoir, deux Damiers à bandes jaunes; un Tigre noir, remarquable par une perite bandelette jaune, située vers le haut, & interrompue par les taches; un Tigre rouge & deux Aumusses.

498. Deux Cornets d'Amboine, rares, même dans le pays, blancs, couverts dans tout le corps d'un dessein de traits recourbés jonquilles, laissant entr'eux des taches du fond en forme d'écailles, & à tête applatie, chargée de taches

<sup>\*</sup>stba, pl.43. quarrées de même couleur que les traits \*.

499. Deux grands & beaux Cornets blancs
à pointe violette, à tête peu élevée, où les ré-XI. FAM.
volutions des fpires ne font marquées que par
des traits, espéce nommée en Hollande la Mennonite, & en France l'Onix, le Cigne ou le
Cierge blanc\*.

\* Seba, pl.

peu moins grands que les précédens.

10 47. n°. 9.
Rumph. tab.
31. lift. E.
Lift. tab. 754.

blancs, cerclés dans toute leur longueur de lignes interrompues, & de points noirs, quelquefois verds ou fauves, chargés de plus de deux larges fascies vertes & fauves, à tête applatie & couronnée de crenelures qui vont en diminuant jusqu'au sommet, ce qui leur a fait donner le nom de Couronnes impériales \*.

502. Deux Couronnes impériales en pendant, lett. F. Séba, pl. 47. un peu moins grandes que les précédentes, & n° 18-10. Rumph. tab. un peu différentes en nuances de couleurs.

503. Deux autres moins grandes.

504. Deux Couronnes impériales de moyenne grandeur, rares, & qui ont cela de particulier que leurs zônes, verd de terrasse foncé, sont comme déchiquetées, cerclées de lignes rougeâtres, & que les intervalles des déchiquetures sont ponctués de rouge-brun\*.

505. Six Cornets, dont quatre par pendans; fçavoir, un Cierge ventre de biche clair, nommé le Cierge jaune; une Couronne impériale;

\* Ibid. lit. 1.

deux Damiers à bandes, & deux Tigres noirs.

XI. FAM. VOLUTES.

506. Un très-gros Cornet, rare, blanc, bariolé de petites lignes fauves, se joignant de diverses manieres en forme de fils de toile d'araignée, à deux zônes de taches marron foncé, à tête peu élevée & chargée de petits tubercules, nommé en Hollande la Toile d'Araignée, & en

\*Arg. App. France l'Esplandian\*.

507. Un semblable qui peut servir de pendant au précédent.

508. Un autre un peu moins grand.

509. Deux autres en pendant.

5 10. Deux Esplandians différens des précédens, en ce que le rézeau en est moins serré & brun-clair, & qu'ils offrent jusqu'à trois zônes brun-foncé.

511. Huit Cornets de moyenne grandeur,

par pendans; scavoir, deux verd-jaunâtre, à deux zônes blanches, l'une en haut, l'autre un peu au-dessous du milieu, bordées l'une & l'autre de raches noires oblongues & un peu obliques, mais qui, dans celle d'en haut, s'étendent sur tous les orbes de la tête, qui est platte, & dont le fond est blanc aussi, espèce nommée \* seba, pl. Queue d'hermine \*; deux semblables à ceux-ci, 42. nº, 31 & à cela près que les taches des zônes y sont plus nombreuses & moins régulieres, que le fond en est de plus chargé, dans les intervalles des zo-

nes, de cercles ponctués bruns, & que la forme en est plus renslée, variété nommée simplement Hermine \*; deux Tigres rouges, & deux Da- VOLUTES. miers à bandes.

5 12. Dix autres par pendans; sçavoir, deux séba, pl. 42. orangés, à quelques taches blanches dans le Lift. tab. 780. haut, à une zône de même au-dessous du milieu, plus prononcée dans l'un, & moins dans l'autre, à stries granuleuses dans le bas, & à tête peu élevée, marbrée du fond & de blanc \*; \* séba, pl. deux Hermines, deux Minimes, deux Damiers 42. 10. 41 & à bandes & deux Tigres noirs; plus un Cornet coupé en deux transversalement, pour faire voir les révolutions intérieures des spires.

513. Dix autres Cornets, dont huit par pendans ; sçavoir , une Couronne impériale , un Cierge jaune, deux Damiers à bandes, deux Hermines, deux Tigres noirs & deux Flamboyantes.

514. Tieize Cornets des Indes; sçavoir, un paille à stries circulaires très-fines, orangé foible, à une zône blanche peu prononcée, & à clavicule élevée, nommé la Fileuse \*; deux \* Guale, tais, blancs marbrés par grandes taches longitudi- 20. litt. B. nales irrégulieres marron, à tête peu élevée, & légérement striés vers le bas\*; un violet à deux \* Rumpli. zônes blanches, l'une en haut, l'autre au mi-tab. 32. lit. Q. lieu, à tête applatie & clavicule peu élevée \*; \* Séba, pl. un jaune clair à une zône blanche dans le mi- 42. n°. 39.

## 250 COQUILLES UNIVALVES.

VOLUTES.

44. D°. 19.

lieu, & à tête platte; un jaune foncé, à trois XI. FAM. zônes blanches, l'une large en haut, l'autre trèsfine un peu plus bas, & la troisseme au-dessous du milieu, à tête platte & blanche, tachetée de marron; un de l'espéce des deux derniers de l'article 470; un comme les deux premiers de l'article 466; un comme ceux de l'article 468, un faux Amiral de Guinée; une Flamboyante, & deux Hermines.

515. Vingt-six petits Cornets; sçavoir, deux verd de terrasse, marbrés par taches longitudinales interrompues de blanc, à pas des orbes \* Séba, pl. tuberculeux, & nommés Papiers marbrés \*;

deux blancs à petites cannelures circulaires & à tête peu élevée; deux citron, & deux fouci, à tête platte & clavicule peu élevée; un marron teint de bleu, à deux zônes étroites blanches; un gris nué de bleu, à deux zônes blanches & à tête platte; & les seize autres des variétés déja décrites, entr'autres, un Vice-Amiral de Rumphius, un Tigre jaune, une Queue d'hermine, une Hermine, deux Navets & deux Nattes d'Italie: plus un petit Cornet coupé en deux pour en faire voir l'intérieur.

516. Quarante petis Cornets fort jolis, des espéces déja décrites, très-variés dans le dessein.

la forme & les couleurs.



#### GENRE SECOND.

VOLUTES CYLINDRIQUES, OU ROULE AUX.

517. LEUX très-grands Rouleaux des Indes, blancs, à raies longitudinales en zig-zag, brunes XI. FAM. & rouge-languin, se joignant fréquemment les unes aux autres, & laissant entr'elles quantité de petits vuides du fond en forme d'écailles ou de cœurs, & chargés de plus de trois larges zônes jonquille, ce qui les a fait nommer Drap d'or fascié\*.

518. Un très-grand & beau Drap d'or fascie, lett. I. & un de même espéce, dépouillé, devenu par-no. 14 & 15. là du plus beau blanc.

Séba, pl. 47. Runiph. tab. 12. lict. P.

\* Arg. pl. 13.

519. Deux Draps d'or fasciés, moins grands que les précédens, mais qui ne leur cédent en rien pour la beauté.

520. Deux Rouleaux qui ne différent des précédens qu'en ce que les taches jonquilles n'y sont point jettées tout-à-fait par zônes, & qu'on nomme par cette raison simplement Draps d'or \*.

\*Arg. pl. 13;

521. Trois beaux *Draps d'or*, dont un rare, lett. F. Séba, pl. 47. différent des précédens, en ce que le fond en n°. 16 & 17. est bleu, que les zig-zags y sont nombreux,

## COQUILLES UNIVALVES

très-ferrés & d'un beau rouge-sanguin, variété qu'on nomme Drap d'or à fond bleu; & deux XI. FAM. VOLUTES. dont un à bandes, de forme plus renflée & plus courte, mais d'ailleurs semblables à ceux des

\* Séba, pl. articles précédens \*.

12.

522. Six Draps d'or par pendans, formant trois autres variétés; scavoir, deux à fond bleu, mais moins chargés de cette couleur que les précédens, & à trois zônes mieux prononcées; deux Draps d'or ordinaires, à rézeau moins ferré, & à taches blanches, plus grandes que dans ceux de l'article 520; & deux de forme très-allongée, dont le rézeau fort serré ne laisse paroître en certains endroits que de très-petits

\* Ibid. pl. points blancs \*.

47. nº. 13. Rumph. tab. 523. Trois grands Draps d'or, dont deux à peu près semblables à ceux de l'article 530; & 3 2. litt, O. un de la derniere variété décrite dans l'arricle précédent, mais à rézeau moins serré.

524. Un grand & rare Rouleau fond blanc, à rézeau jaune foncé, & à grandes taches de même couleur, répandues principalement en deux zônes, de forme un peu renflée par le haut,

\* Ibid. tab. & nommé Drap d'or de la Chine \*.

525. Un grand Rouleau de la Chine, peu commun, fond jonquille marbré de taches blanches, à stries fines circulaires, de forme oblon-

\* Arg. pl. gue & effilée, à tête un peu élevée, & nommé Séba, pl. 43. Drap orangé \*.

33. n°. 4.

526. Deux Draps orangés en pendant, à fond moins vif, à taches plus fréquentes, & à XI. FAM. tête moins élevée que le précédent \*.

527. Six Rouleaux par pendans, peu communs; sçavoir, deux blancs à stries circulaires chargées à distances égales de points rouge foncé qui se répondent aussi en longueur, à taches longitudinales orangé brun, & de forme essilée, espèce nommée Drap d'or piqueté de la Chine \*; deux Drays orangé à taches blanches, petites & peu nombreuses, & à grand nombre 741. sig. 35. de bandes longitudinales étroites orangées sur un fond jonquille; & deux Draps d'or à fond blen.

\* Lift. tale:

528. Deux rares & jolis Rouleaux en pendant, fond blanc nué de bleu, marbrés l'un par taches longitudinales ondées, l'autre par taches disposées en deux zônes de verd foncé nué de marron, & cerclés de plus de fines zônes & de points rouges-bruns, à tête élevée, & nommés Tulipes \*.

529. Deux Rouleaux; sçavoir, un rare, fond 13. lett. B. gris de lin, teint de blanc & de bleu, marbré nº. 39 & 40. par trois larges zônes & par bandes longitudinales de fauve roux nué de verd, & cerclé comme les précédens \*; & un fond blanc, par-\* lbid. no. semé d'assemblages de petites taches noires, 36. plus serrées dans deux espéces de zônes, espéce

## 254 COQUILLES UNIVALVES

nommée Piqure de mouches, ou Drap d'ar-

gent\*.

30.

43. nº. 34.

VOLUTES. 530. Huit jolis Rouleaux par pendans; sça-\* Arg pl. voir, deux blancs bariolés de taches aurore, 13. lett E. Gualt, tab. 25. & à deux zônes de même couleur, nommés litt. O.

\* Arg. pl. Omelette \*; deux blancs un peu tachés de bleu, à grandes taches longitudinales verd foncé, interrompues par une zône blanche peu pronon-

cée dans l'un, tous deux cerclés, sur-tout vers le bas, de traits & de points bruns, à tête assez élevée, terminée par une clavicule couleur de chair, espéce nommée la Nébuleuse ou les Nua-

\* Séba, pl. ges \*; deux Tulipes & deux Draps d'argent. 44. nº. 29 85

531. Six Rouleaux peu cominuns; sçavoir, deux rouge-sanguin, nué de rouge plus clair & de gris de lin, légérement marbrés, l'un principalement dans une zône du bas, l'autre par bandes longitudinales ondées & en zig-zag de 4 Ibid. pl-blanc \*; deux blancs nués de bleu & de gris de \* Ibid. no. diverses nuances \*; & deux, dont un brun nué

de gris de lin, & un bariolé des mêmes couleurs, 35tous de l'espèce nommée Papier de la Chine.

532. Un très-grand Rouleau des Indes, marron, à suites ou traînées longitudinales, transversales & obliques, de taches blanches, en \* Arg. pl. 13. forme d'écailles, laissant entr'elles de grands es-

lett. G. Séba, pl. 47. paces du fond, espéce nommée Brunette \*. nº. 10.

533. Deux grandes Brunettes en pendant, Rump. tab. 33. nº. 3.

dont une peu commune à fond canelle & à taches plus larges, l'autre fond rouge-brun, à XI. FAM. taches plus nombreuses.

534. Quatre Rouleaux par pendans; sçavoir, deux Brunettes de forme plus effilée \*; & deux \* séba, pl. 47. nº. 11 82 Draps d'or.

535. Trois Rouleaux; sçavoir, deux en pendant, blancs nués de couleur de chair, à grandes taches en forme de nuages, formées d'un assemblage de raies brunes ou bleu soncé, à tête peu élevée, dont les orbes sont concaves & marbrés comme le corps, nommés l'*Ecorchée*\*, \* Arg. pl. & très-grands dans leur espéce : & une *Bru-* 13, lett. C. Séba, pl. 476 nette.

n°. 22 & 23. Rumph. cab.

536. Quatre Rouleaux par pendans; fçavoir, 31. litt. F. deux Ecorchées un peu moins grandes que les précédentes, & deux Brunettes.

537. Six Rouleaux par pendans; fçavoir deux Ecorchées différentes des précédentes, en ce que l'une n'a qu'un petit nombre de taches brunes, en forme de flammes longitudinales diftribuées en deux zônes, & que la seconde est bariolée de taches noirâtres, déchiquetées en forme de lambeaux, à deux zônes près, où elles font plus larges; deux Draps d'or & deux Draps d'argent.

538. Deux grands Rouleaux de l'Isle de France, en pendant, gris de lin nué de couleur de chair, à bandes longitudinales de taches

## 256 COQUILLES UNIVALVES

Touge - brun, en forme de rézeau, & à deux zônes de grandes taches de même couleur, à tête applatie, à pas des orbes tuberculeux, & à coque mince, espèce nommée le Brocard de

Arg. pl. Soie \*.

13. lett. A. 539. Quatre Rouleaux par pendans, dont ne. 1-2. List. tab. 747. deux Brocards de soie & deux Ecorchées.

540. Quatorze Rouleaux par pendans; sçaveir deux blancs, pointillés sur tout dans deux zônes, & par bandes longitudinales ondées de points bruns, à côtes longitudinales peu prononcées, à pas des orbes tuberculeux, & nom-

\*Arg.pl. 12. més *Moires* \*; quatre autres, dont deux marlett. S. Séba, pl. 55. brés de blanc & de fouci, & deux de marnº. 12. Gualt. tab. 25. ron & de violet, tous les quatre ceints du haut litt. P. jusqu'en bas de traits & de points bruns, variété

\* séba, pl. nommée le Taffetas \* ; deux Nuages, deux 42. n°. 16 & Ecorchées, & quatre Draps d'or, dont deux fasciés, & deux de la variété des derniers de l'article 5.22.

541. Seize autres, dont quatorze par pendans; sçavoir, deux petits verd soncé, ceints de traits alternativement bruns & blancs, & à une petite zône blanche vers le bas, deux petites Brunettes rares, en ce que les traînées de taches blanches y serpentent dans quatre bandes longitudinales régulieres; un Drap d'or jonquille, marbré dans trois bandes longitudinales & trois zônes de blanc teint de gris de lin, & veiné

veiné du fond ; trois autres Draps d'or , dont un à fond bleu. & deux de la variété de l'arti- XI. FAM. ele 520; deux Taffetas de la premiere des deux VOLUTES. variétés de l'article 540; deux Deaps d'or piquetes de la Chine, deux Nuages & deux Moires.

## GENRE TROISIEME.

VOLUTES ÉCHANCRÉES, OU OLIVES.

542. LEUX Olives des plus rares, en pendant, blanches, ponctuées de gris, semées çà & là de traits transversaux brun-foncé, la plûpart en zig-zag, à plis longitudinaux peu prononcés, à carne circulaire peu saillante vers le tiers de la hauteur, à petite tête, dont les spires sont creusées en gouttiere, à lévre extérieure applatie en dehors, & intérieure couleur de chair. Cette Coquille ne se trouve pas même dans les Cabinets de Hollande.

543. Trois Olives des Indes; sçavoir, une couleur de chair, à bandes longitudinales ondées, & un peu en zig-zag, orangé ombré de bleu pâle, & à tête élevée \*; une verd céladon, ornée dans toute sa robe de chevrons couchés 13. lett. 0. violet noir, imitant le point d'Hongrie, à petite sête, dont les premieres révolutions rentrent

Tome I.

## 258 COQUILLES UNIVALVES

l'une dans l'autre, & nommée en Hollande Drap mortuaire 1; & une verd de terrasse, semée de XI. FAM. VOLUTES. quelques zig-zags violet-noir, & à tête ap-1 Rumph.

tab. 39. nº .4. platie 2.

737. f. 29.

lett. a.

544. Deux grandes Olives de la mer du Sud; Séba, pl. 53. couleur de chair nué de bleu, couvertes d'un grand nombre de traits orangé-brun, qui, defcendant d'abord de la tête en forme de chevelure, se prolongent ensuite dans tout le corps en divers zig-zags plus ou moins grands & serrés, laissant des intervalles triangulaires du fond à peu près comme dans les Draps d'or, à tête peu élevée & à pas des orbes creusés en fillon, espéce nommée Porphyre ou Olive de Pana-

5 Arg. pl. 13. ma 3.

545. Deux Olives de Panama, un peu moins lett K. Gual. tab. 24. litt. P.

grandes que les précédentes.

546. Quatre Olives par pendans; sçavoir; deux grandes jaune pâle, marbrées de traits longitudinaux en zig-zag bruns, & à trois fascies de taches de même couleur, à tête élevée, à pas des orbes creusés d'un profond fillon, & AArg. pl. 13. légérement dentelés, & à bouche aurore vif 4;

Séba, pl. 53. deux Olives de Panama de moyenne grandeur. lett. A. B. 547. Quatre autres par pendans; sçavoir, Gualt. tab.24. litt. O.

deux comme les premieres de l'article précédent, & deux qui en différent par leur marbrure

5 Séba, pl. plus brune, & leur bouche blanche 5. 548. Huit Olives par pendans; sçavoir, deux Rumph. tab. 39. no. 3.

blanches, teintes par traits longitudinaux & en zig-zag de ventre de biche, à une zône blanche XI. FAM. oblique vers le bas, & à une petite fascie au- VOLUTES. dessous, qui se termine à l'échancrure de la bouche, de forme renflée, ainsi que le haut de la lévre intérieure, & à tête blanche peu élevée; deux de même espéce, mais dépouillées, & dont la robe est devenue par-là marron foncé, bariolée de blanc; mais la zône, la fascie & la tête font restées blanches \*; deux ventre de biche \*Arg. pl. 15; clair, ornées d'un dessein en rézeau violet pâle, lett. M. List. pl. 723. plus foncé dans deux espéces de zônes, & deux fig. 10. de la variété des dernieres de l'article précédent.

549. Huit Olives par pendans; sçavoir, deux très-brunes, appellées Moresques ou Négresses \*; \* Séba, pla deux jaune-souci, dont une tirant un peu sur le \* 1 bid, lett. & verdâtre \*; deux blanches, & deux dépouillées, de la variété des premieres de l'article précédent.

550. Seize Olives par pendans; scavoir; deux peu communes, teintes de gris & de verd de pavot dans les deux tiers de leur hauteur, & noisette dans le reste, de forme effilée, & à tête très-élevée \*; deux blanches tachetées de fauve \* Lift, tab. & de lilas, à tête peu élevée, & à carne cir-722. fig. 9. culaire peu saillante vers le tiers de leur hau-lett. P.Q. teur \*; deux verd d'olive, marbrées l'une par \* Gualt. tab. taches en zig-zag peu nombreuses, l'autre par 23. litt. L. séba, pl. 53.

Rii

XI. FAM. VOLUTES. \* Séba, pl. 53. lett. M.

zônes interrompues de brun obscur, à quelques côtes longitudinales peu prononcées & à tête applatie \*; deux blanches marbrées par traits obliques & en zig-zag de cannelle & à tête éle-\*Ibid.ler.y. vée \*; deux nuées de verd céladon & de jon-

23. litt. PP.

quille, marbrées de violet, & du reste sembla-\* Gualt. tab. bles aux précédentes \*; deux de l'espèce des premieres de l'article 548, dont une dépouil-

lée, deux Négresses & deux olivâtres.

551. Onze Olives peu communes: sçavoir; deux blanches à bandes longitudinales en zigzag cannelle; une de même couleur, mais à simples traits en zig - zag cannelle foncé; une blanche presque entiérement recouverte de grands traits longitudinaux, verdâtres, nués de jaune, à tête élévée, à pas des orbes plats, & à une strie oblique en vive arrête dans le bas ; une verd céladon clair, à espéce de flammes transversales lilas & noisette; une gris de lin à trois zônes vertes, dans les intervalles desquelles \* 566a, pl. est un dessein en treillis de même couleur \*; une gris verdâtre, & une verd de terrasse, tachées dans deux zônes de violet noir ; une Né-

53. lett. V.

nieres de l'article 547. 552. Dix Olives des Indes, d'une belle gran-

gresse, & deux grandes de la variété des der-

deur & d'un très-beau choix. 553. Trente-fix petites Olives par pendans; sçavoir, deux jonquilles ponctuées par comparcimens de brun, & à bouche violette \*; deux àpeu-près semblables, mais de couleur plus son- XI. FAM. cée, de forme plus oblongue, & à points distri- Gualt, tab. bués moins réguliérement \*; deux de forme 23. list. T. bombée, blanches, semées de petites taches peu 721. f. 7. apparentes gris de lin, à deux zônes brunes dans l'une, cannelle dans l'autre; deux de forme àpeu-près semblable, blanc-verdâtre, à traits en zig-zag, & grandes taches longitudinales brun obscur \*; deux blanches ornées de traits en zigzag violet foncé, & à bouche rouge-brun; 735. f. 25. deux blanches bariolées de traits, le plus souvent en zig-zag gris de lin; deux blanches nuées de ventre de biche, terminées par une large zône orangée; deux couleur de chair pâle, bariolées de traits fauves en forme de chevrons; deux, dont une blanche & une verte, fasciées debrun obscur; deux bariolées de gris & de verd foncé, à deux larges zônes brunes, & lévre intérieure orangée \*; deux blanches nuées de ci- 48662, pl. 53. tron, marbrées dans trois zônes interrompues lett, o. de verd de pavot; deux grises nuées de jaune pâle, chamarées de traits en zig-zag verds, imitant le point d'Hongrie; deux Négresses; deux gris de souris; deux blanches; deux blanches ponctuées de bleuâtre, à une large zône de même couleur dans le haut : deux comme les neuvieme & dixieme de l'article 550: & deux blanches marbrées de cannelle clair. & du reste

## 262 COOUILLES UNIVALVES

semblables aux troineme & quatrieme de l'ara XI. FAM: ticle 548.

VOLUTES.

554. Trente-neuf petites Volutes échancrées: scavoir, une blanc de lait, à tête élevée formée de fix orbes en doucine granuleux, teints d'orangé; une blanche de forme bombée, à stries circulaires, & à six orbes reticulés & granuleux; une blanche tachée par zônes & par bandes longitudinales de fauve - roux, de forme moins bombée, mais du reste semblable à la

es. litt. O.

\* Gualt, tab, précédente \*; une petite de même espéce, mais de forme très-effilée; une peu commune blanche, ceinte de diverses zônes de très-petits points verds se répondant exactement en longueur d'une zône à l'autre, à lévre extérieure en bourrelet, & jaune d'or, ainsi que le haut de l'intérieure, qui est armée de très-grosses dents, à tête se confondant avec le corps, & à petite \* rift. tab. clavicule jaune \*; quatre autres de forme à-peu-

\$03. fig. 11.

Sualt tab. 28.

litt. B. 803. f. 10.

litt. D.

791. f. 44. Gualt. tab.22. litt. I.

près semblable à la précédente, dont deux blan-\* tbid. f. o. ches fasciées de petites zônes orangé \*, & deux

ponduées par compartimens de même cou-\* List. tab. leur \*; deux blanches marbrées de brun de di-803. 1. 10. Gualt. tab. 28. verses nuances, à trois grosses sascies circulai-

res, & à fix côtes longitudinales, tuberculeuses \* Lift. tab. dans les points où elles se croisent \*; & vingt-

5:

huit Olives par pendans d'un joli choix.

#### DOUZIEME FAMILLE.

#### PORCELAINES.

CE font des Coquilles de forme ovoide applatie en dessous, ne montrant que NII. FAM. peu ou point de spirales. Leur bouche NES. oblongue est plus ou moins étroite, & nous servira à les diviser en deux genres; sçavoir,

- 1°, Les Porcelaines à bouche moins étroite, dépourvue de dents, ou n'en ayant qu'à l'une des deux lévres.
- 2°. Les Porcelaines à bouche plus étroite, en forme de fente, dentée des deux côtés.



## GENRE PREMIER.

Porcelaines a bouche moins étroite, dépourvue de dents, ou n'en ayant qu'a l'une des deux lévres.

XII. FAM. blanche, à lévre extérieure en bourrelet, & PORCELAI- dont les extrémités fe prolongent en deux longues avances creusées en gouttiere, nommée Navette de Tisseand, & grande dans cette es-

\* Arg. pl. péce \*.

rs. lett. I.

16. 16. 711.

556. Deux Porcelaines en pendant, papyta16. 63.

565a, pl. 55.

dont les extrémités ne se prolongent que peu en
dehors: dans l'une, la lévre extérieure se recourbe un peu en dedans, tandis que celle de
l'autre, qui paroît être du premier âge, finit en
tranchant: toutes deux rares & grandes dans

leur espéce, nommée l'Œuf papyracé.
557. Deux Porcelaines en pendan, plus grosses que les précédentes, dont elles dissérent d'ailleurs en ce que la coque en est plus épaisse, la lévre extérieure renssée & dentée en forme

\*Arg. pl. 18. de rides, & le dedans orangé: variété que l'on Life tab. 711. nomme fimplement l'Œuf.\*

£. 65.

Gualt. tab. 15. 558. Sept Porcelaines peu communes: sça-

Voir, une petite papyracée blanche nuée d'incarnat, formant une seconde variété de Na- XII. FAM. vette plus effilée que la précédente \*; deux blanches, à un pli en forme de bosse vers le milieu \* List. tab. du corps, à extrémité des lévres couleur de rose, au-dessus desquelles sont deux boutons ou verrues, & à lévre extérieure garnie de dents, espéce nommée la Bossue\*; deux blanches \* Arg. pl. nuées d'aurore, à un anneau très-saillant sur le Lift, tab. 712. milieu du corps, & à bouche dépourvue de séba, pl. 55. dents, autre variété de Bossues, nommée Bos- nº. 17. sue sans dents, & deux Eufs papyraces des \* Arg. pl. deux variétés de l'article 5 56. Lift. tab. 711.

559. Trois Porcelaines peu communes : sça- f. 64. Séba, pl. 55. voir, deux marron, marbrées principalement no. 18. dans quatre zônes & vers la tête de taches blanches, à lévre extérieure en bourrelet, & garnie de dents, à petite bosse sur le dos, à coque min-

ce, & à petite clavicule \*; & un œuf de la va- \* List. tab.

riété de l'article 5 57.

560. Onze Porcelaines, dont dix par pendans : sçavoir, une grise nuée de bleu, mouchetée par zônes de grandes taches brunes & rousses de diverses nuances, à lévre extérieure tranchante, à coque mince, & à clavicule applatie; deux de forme plus oblongue & moins bombée, tachetées de fauve & de roux, & du reste semblables à la précédente \*; deux fauves de forme encore plus al-748. f. 42. 85

#### 266 COQUILLES UNIVALVES

ongée, & fasciées, l'une d'orangé, l'autre de XII. FAM. verdâtre; deux basiolées de gris & de brun, à PORCELAI- deux fascies gris de lin, à bouche violette, & à clavicule un peu elevée : c'est le Potan de M.

\* Lift. tab. Adanson \*; deux petites brunes de même esoé-741. f. 37. Adanf. Hist. péce ; deux mouchetées de canelle, de la vadu sén. pl. s. riété des premieres de cet article \*. Plus, un \* List. tab. grand nombre de petites Porcelaines blanches, 749. f. 44. enfilées en façon de collier, toutes de la variété

31º 2.

\* Adanson, que M. Adanson a nommée le Falier \*, connue ibid. pl. 5. aussi sous le nom de Monnoie de Guinée; & deux petites de même espéce, attachées ensemble, dont une a la bouche à gauche, & l'autre à droite, & forment ainsi l'Unique & la Contre-unique de cetre espèce. Toutes les Porcelaines de cet article peuvent être rangées dans le genre que M. Adanson a nommé le Mantelet,



## GENRE SECOND.

PORCELAINES A BOUCHE PLUS ÉTROITE, EN FORME DE FENTE, DENTÉE DES DEUX CÔTÉS.

561. DEUX Porcelaines fauve pâle, ornées de traits longitudinaux, fins, ferrés & hachés, XII. FAM. canelle, interrompus dans le milieu par une PORCELAIbande longitudinale ondée, d'où partent de côté & d'autre de petits rameaux, à taches rondes plus ou moins grandes vers le bas, & nommées Cartes Géographiques ou Mappemondes \*; toutes deux grandes dans cette ef- \* Arg. pl. 18; péce.

Rumph, tab,

562. Quatre Porcelaines par pendans : sça-38. litt. B. voir, deux à coque mince, blanche nuée de gris de lin, à taches nombreuses brunes & rousses, à deux espèce de fascies, & à petite tête applatie \*; & deux Géographiques moins grandes que les précédentes.

672. f. 18.

563. Deux très-grandes Porcelaines couleur de chair pâle nué de bleu, à taches condes brunes & noires, à une bande longitud nale étroite & ondée tirant sur le jaune, à coque épaisse, & nommées Peaux de Tigre \*.

564. Quatre grandes Peaux de Tigre, dont Rumph. tab.

\* Ibid. tab. 682. fig. 29. . 38. lit. A.

XII. FAM. PORCELAL-NES.

deux blanches, à taches plus petites & moins nombreuses : une à fond blanc teint d'orangé, & la derniere remarquable par une large tache rouge-brun sur le dos.

565. Quatre autres par pendans, dont deux à taches petites & nombreuses, & deux de la

variété de celles de l'article 563.

566. Six Porcelaines par pendans: sçavoir .. deux Peaux de Tigre, à large bande longitudinale blanche sur le milieu du dos ; deux des variétés déja décrites; & deux de l'espéce des deux premieres de l'article 562.

567. Dix Porcelaines: sçavoir, deux fauvebrun parsemées de taches blanches, à deux fascies peu prononcées, & nommées Neigeu-\* List. tab. ses \*; deux brun foncé parsemées dans le milieu du corps de taches rondes à-peu-près égales, grises, & blanc sale, interrompues par une petite bande longitudinale de même couleur, à coque épaisse, & à base plate, espéce nommée \* Ibid. tab. par Rumphius Porcelaine à tête de serpent \* ; une

703. f. 52. Rumph. tab. \$8. litt. E.

876. f. 23.

autre variété de cette espéce, recouverte en entier de taches, à coque mince, & à base plate du côté de la lévre extérieure, mais arrondie de l'autre ; deux fauves, marbrées de marron, à extrémités des lévres fort faillantes & applaties, s'enfonçant vers le bas dans l'intérieur de

587. f. 34.

\* List. tab. la Coquille, nommée le Lapin; un autre Lapin gris-bleuâtre & à coque mince ; & deux Peaux de Tigre.

568. Seize Porcelaines par pendans: sçavoir, deux peu communes fauve nué d'orangé, à tête XII. FAM. applatie & enfoncée, à lévre extérieure un peu PORCELAIsaillante vers le haut, à dos élevé, & à deux fascies presque imperceptibles \*; deux marron \* Lift. tab. clair & foncé, à deux zônes blanchâtres bien 670, f. 16. prononcées, à lévre extérieure tranchante dans litt. I. l'une, recourbée & dentée dans l'autre \*; deux à large base, bariolées sur les slancs de blanc & de fauve clair, ayant sur le milieu du corps une large bande longitudinale blanche, tachetée dans toute sa longueur de brun-noir, espéce nommée le Léopard\*; deux à bouche, base & bords du corps noir, à dos blanc teint de bleu tab. 39. lit. 31 pâle, à une bande longitudinale fauve dans le milieu, & nommées Agates \*; deux blanches, \* Arg. pl.18; teintes en quelques endroits de bleu pâle & de fauve-roux, à taches brunes peu nombreuses sur les côtés, & à cannelures des deux lévres aurore, espéce nommée Truitée \*; deux fauves nuées de noisette, à trois larges zônes plus clai- 683. t. 30. res que le fond, & à petite tête applatie; deux Neigeuses, & deux Porcelaines à tête de serpent.

569. Deux grandes Porcelaines de forme oblongue, marbrées par grandes taches de blanc & de brun, & dont la robe est en plusieurs endroits comme saupoudrée de blanc : on remarque sur le dos de l'une, quelques taches blanches & relevées, semblables à des gouttes de

# Lift. tabi

## 270 COQUILLES UNIVALVES.

fuif figées : toutes deux font de l'espèce nom-XII. FAM. mée Lièvre 1, mais la seconde est appellée Liè-PORGELAI- vre à gouttes de suif.

RES.
Rumph.
170. Trois grandes Porcelaines, dont deux tab.; 8. litt. c. fauves nuées dans deux zônes & fur les côtés de petit gris, chargées de cercles grands & petits, canelle vif, & à deux grandes taches brunes

tits, canelle vif, & à dux grandes taches brunes fur chacune des lévres, espéce qu'on nomme le \* Arg. pl. Grand Argus \*; & une olivâtre chargée dans 18. lett D. Rumph. toute l'étendue de sa robe de taches rondes & toute l'étendue de sa robe de taches rondes & blanches, ou de taches brunes cerclées de blanc, & dans son milieu, d'une bande longitudinale plus claire que le fond, espéce nommée faux

1 List: tab. Argus \*.

571. Idem.

572. Trois Porcelaines, dont deux Argus de couleurs très - vives; & un faux Argus dépouillé, devenu par-là violet obscur.

573. Quatre Porcelaines, dont une rare, blanche nuée par intervalles de fauve ou de gris-bleu, ornée dans toute sa robe de traits souci, qui laissent un grand nombre de taches rondes ou polygones du sond, serrées les unes contre les autres, & à bande longitudinale de même couleur, espéce que l'on nomme Arlequine de couleur que de co

\* Life. tab. quine \*; deux qui ne différent de celle-ci, qu'en 259. fig. 51. ce que les traits qui font entre les taches, y font rouge-brun, jettés comme par bachures, la plûpart longitudinales, que les taches y font

moins régulieres, moins serrées, & séparées par des hachures de même couleur que les XII. FAM; taches, variété nonumée fausse Arlequine, & Porcelaiqui est très-bien représentée dans l'appendice de M. d'Argenville \*; toutes très - grandes dans \* Arg. And leur espéce ; & une fausse Arlequine différente pend. pl. 2. des précédentes par son dos en forme de bosse. Rumph. tab.

574. Dix Porcelaines par pendans: sçavoir, deux gris de lin, à quatre larges zônes grisbrun, interrompues en forme de taches quarrées, & nommées la Taupe \*; deux Taupes \* Arg. pl. d'une autre variété, à robe fauve-roux, fasciée 18. lett. H. Gualt. sab. de trois zônes blanchâtres, & à base brun- 16. litt. O. noir\*; deux aurore foible, à trois zônes gris- \* Gualt. ibid. blanc, & à bouche lilas, nommées Caffé au Rumph. tab. blanc, & a nouche mas, nonmices en tab. 38. lit. I lait, & grandes dans leur espèce \*: deux faux tab. 38. lit. I \* Gualt. tab. Argus, dont un de la variété de l'article 570, 13. lett. H. l'autre en différe en ce qu'on n'y voit point de taches brunes cerclées de blanc, mais de simples taches blanches; & deux fausses Arlequines.

575. Idem.

576. Dix Porcelaines par pendans: sçavoir deux grises tirant sur le fauve, à deux zônes gris plus clair, & à deux taches rouge - brun en forme d'yeux à chaque extrémité, espéce nommée la Souris \*; deux, dont une gris de lin, & l'autre fauve, chargées de traits longitudi-18. lett. C. naux & hachés violet foncé, à extrémités des 671. f. 17.

lévres couleur d'or, & nommées l'Isabelle 1; XII. FAM. deux jaunes tirant sur le verd parsemees de ta-PORCELALches blanches, rondes & à-peu-près égales en-Arg. pl. 18. tr'elles, nommées le Petit Argus 2; deux mar-Rumph, tab, brées principalement par zônes & par chevrons 39. litt. G. couchés imitant le point d'Hongrie, de noisette 2 Arg. pl. 18. & de blanc bleuâtre, à coque mince, & à lett. X. List. tab: clavicule un peu élevée 3; une Arlequine, & 505.f. 42.

3 Arg. ibid. une fausse Arlequine. lett. G. List. tab.

577. Les mêmes Coquilles, avec cette différence que l'une des deux Souris est gris-brun & fans zônes.

578. Trente petites Porcelaines par pendans: scavoir, deux rares, canelle, parsemées de petites taches rondes blanches, au centre de quelques unes desquelles se trouvent de trèspetits points noirs, & à bande longitudinale 4 Lift. tab. verd céladon 4; deux blanches, parsemées dans les flancs de points violets, bariolées dans le dos de jaune pâle, à bande longitudinale du

14. litt. E.

696. f. 43.

662. f. 6.

5 Gualt. tab. fond, & à bouche orangée 5; deux marron nué de bleu pâle, à cinq zônes de chevrons 6 Arg. pl. 18. blancs couchés en forme de point d'Hongrie 6; deux souci tachetées principalement sur le dos

lerc. N. List. tab. 661. f. s.

Is. litt. BB.

de petits points blancs, & à base jonquille; 7 Gualt. tab. deux qui ne différent de cell s-ci qu'en ce que le fond de la robe & les côtés en font rouge-

brun, & que les points blancs laissent des pe-\* Rumph. tab. 39. litt. 2, tites taches du fond en forme d'étoiles 3; deux petites petites Porcelaines à tête de serpent, formant la troisieme variété de cette espéce 1; deux verd XII. FAM, de pavot bariolées de gris, sur le milieu du dos PORCELAIdesquelles est une large tache irréguliere jaune Rumph. foncé, représentant, suivant M. d'Argenville, tab. 38. litt. F. List. tab. 702. la figure d'un animal 2; deux blanches, à trois f. 50. larges zônes brunes, nommées le petit Ane 3; lett. Y. & quatorze Pucelages ou Coliques, formant 39. litt. E. sept variétés : sçavoir, deux blanc de lait par- sarg. faitement lisses 4; deux blanches, ceintes dans Rumph. tab. 39. litt. M. le milieu du corps d'un petit cordon jonquille 5; 4 Ibid. litt. deux semblables, à cela près que le cordon en est Dis Gualt, tab. plus large & d'un beau violet ; deux, dont le 14. nº. 2. dos est devenu entiérement violet par le dépouillement, & dont le bas de la robe est resté blanc 6; deux blanches, bossues sur les slancs, Bonan, cl. nommées plus particuliérement Thorax ou 3. f. 241. Kauris des Maldives 7; deux Kauris, l'un jon- 7 Arg. pl. quille, & l'autre foufre; & deux dépouillés, 18. lett. K. Gual. tab. 14. à flancs & extrémités blanches, & dos d'un nº.; & 4.
List. tab. 709, beau lilas.

. f. 59.

579. Quinze Porcelaines : sçavoir, une qui différe du Léopard, décrit article 568, par une bande longitudinale plus étroite, presque entiérement brune, & par une large tache de même couleur, placée entre deux petites bosses, variété que quelques-uns nomment le Crapaud: une blanche parsemée d'un grand nombre de raches & de points fauve - roux, à deux zônes

Tome I.

274 COOUTLLES UNIVALVES

XII. FAM. PORCELAI-

16. litt. R.

697. fig. 44.

du fond tachées de même, & à coque minee \*: une comme les septieme & huitieme de l'article 576; une peau de Tigre; deux Porcelaines "Gualt. tab. à tête de ferpent, de la premiere variété de l'ar-

ticle 567; un Lapin; deux Taupes des deux variétés de l'article 574; un Caffé au lait ; une Neigeuse; deux fausses Arlequines; deux de la même espéce, dépouillées & devenues par-là d'un très-beau violet. Plus, deux Porcelaines coupées, l'une dans sa longueur, l'autre transversalement pour mettre à découvert les spirales intérieures.

580. Huit grandes Porcelaines : sçavoir, un faux Argus de la grande espéce, différent de \* List. tab. tous les précédens \*; deux Porcelaines à tête de serpent; deux Peaux de tigre, & trois Porcelaines dépouillées, dont une violette & deux blanches. Plus, un faux Argus coupé transver-

salement pour en faire voir la spirale.

581. Trente-cing petites Porcelaines trèsintéressantes, dont trente-quatre par pendans: Içavoir, deux marron nué de jaune, à deux zônes plus claires que le fond, à petites taches de même peu prononcées, à base & côtés oran-\*Gualt. tab. gés\*; deux rares blanches, à grandes taches

13. litt. P.

iaune foncé tenant les unes aux autres, & difposées sur la robe en saçon de parterre; deux papyracées, blanches ponctuées principale-

\* 1bid. tab. ment dans quatre zônes de jaune foncé \*; deux ir lice, P.

grises ponctuées de noir, & à deux zones plus claires que le fond \*; deux de forme bombée, XII. FAM. dont une roux foncé, à deux zônes blanc sale, NES. & une fauve-roux, à deux taches brunes à chaque \* List. tab. extrémité; deux verdâtres ponctuées de gris, 660. f. 4. à lévre extérieure renflée & tuberculeuse, & à base blanche tachetée de violet \*; deux de for- \* qualt. tab; me à-peu - près semblable, grises ponctuées de 15, litt, X. jaune, & à deux fascies plus claires, nommées Peau d'âne \*; deux de forme bombée à extrémités des lévres, un peu saillantes en dehors, dont une blanche \*, & une fauve ponctuée de rouge \*; deux bleues, mouchetées de marron, \*!bid.litt. N. à flancs blancs tachetés de brun, à quatre petits yeux placés comme dans la Souris, & de forme semblable à celle du Petit-ane \*; deux blanches, mouchetées de canelle, & à coque tab.39. litt. O. mince \*; deux de l'espéce des treizieme & quatorzieme de l'article 578; deux Truitées; deux Petit - ane; deux très-petites grifes, à trois rangs de taches brunes, à stries circulaires, & à sillon longitudinal dans le milieu du dos, nommées le Pou de mer \*; deux Poux de mer blancs nués \*Arg. pl. 186 de couleur de chair, à stries circulaires comme lett. L. les précédens, mais sans sillon longitudinal \*; f. 56. \* List. tab. une rare, fauve tirant fur le gris, à dos très-707.f. 57. élevé, à stries circulaires fortsaillantes, noueufes le long du fillon longitudinal qui est fort large, ainsi que les intervalles des stries, & à

A . bid. litt.

\* Rumph.

684. f. 31.

## 276 COQUILLES UNIVALVES

base platte, dont les bords sont renssés en es XII. FAM. péce de bourrelet, nommée la Tortue \*; deux PORCELAI- blanches, à stries circulaires granuleuses oblines. \* List. tab. ques, & se croisant l'une l'autre, à sillon lon-706. f. 55; giudinal verse la milion du deu 82.

\*Arg.pl. 18. ville, \*Petite vérole\*; & deux gris de lin de la let. V. forme des précédentes, mais plus petites, gra-

Gualt. tab.14. nuleuses fans stries, & jaunes dans les deux
\*Arg. pl. 18. bouts. C'est le Cloporte du même Auteur \*.

lett. S. Gualt. tab. 14, litt. T.





# COQUILLES DE MER.

## CLASSE SECONDE.

BIVALVES.

On range dans cette classe toutes les Coquilles composées de deux piéces à peu près égales, nommées Valves ou Bivalvas. Battans, & où l'on ne remarque aucun repli sensible qu'on puisse regarder comme des spires. Nous les diviserons en six familles, qui sont,

1°. Les Huitres. 4°. Les Cœurs.

2°. Les Peignes. 5°. Les Tellines.

3°. Les Cames. 6°. Les Moules...



## PREMIERE FAMILLE.

HUITRES.

- I. FAM.
  HULLRES.
  L'excès plus ou moins grand de l'une de leurs valves sur l'autre, & par la propriété générale & constante de s'attacher entr'elles ou à d'autres corps.
  Toutes celles que nous connoissons peuvent se rapporter à l'un des quatre genres suivans; sçavoir,
  - 1°. Celles dont les valves sont composées de plusieurs couches ou lames, formant une surface quelquesois lisse & le plus souvent raborteuse: ce sont les Huitres proprement dites.
  - 2°. Celles qui sont couvertes de seuilles relevées, plissées, comme frisées & finissant en sestons, nommées par cette raison Huitres seuilletées.
  - 3°. Celles qui sont chargées de stries. longitudinales, hérissées d'épines gran-

des & petites, & dont le sommet de la valve inférieure est applati, prolongé I. FAM. en dehors, & plus ou moins recourbé, nommées Huitres épineuses, Spondiles, ou Huitres à talon.

4°. Celles enfin dont le sommet de la valve inférieure est percé d'un petit trou, & recourbé en forme de bec sur celui de la valve supérieure, nommées généralement Anomies ou Térébratules.



#### GENRE PREMIER.

HUITRES PROPREMENT DITES.

I. FAM. HUITRES.

582. UNE Huitre des Indes, rare, brune nuée de blanc & de verdâtre, nacrée tant en dedans qu'en dehors, de forme presque ronde; à larges sinuosités & plis dans son contour, à stries longitudinales très - fines, à valves se colant presque l'une sur l'autre, & à charniere composée de deux élévations étroites, qui forment un angle aigu dans le haut de la valve supérieure, & se logent dans deux cavités semblables de l'inférieure, espèce nommée Selle Polonoise, & portant plus de cinq pouces de dia-

, la metre \*.

Bldma -09. du milieu de la pl. 90. 104. litt. B.

583. Deux Huitres de moyenne grandeur: Gualt, tab. sçavoir, une Selle Polonoise, presque entiérement platte & papyracée, & une variété de cette espéce, blanche, à angle de la charniere plus aigu, & de forme encore plus ronde que les précédentes, nommée en Hollande Trans-\* Séba, la parente, & en France Vitre Chinoise, parce qu'effectivement les Chinois & les Indiens s'en

Coquille du milieu du bas de la pl. 90. Lift. tab. 225

8: 226. f. 60. 861.

584. Trois Huitres: scavoir, une petite Selle

fervent pour cet'usage.

Polonoise, & deux Vitres Chinoises, dont une grande. Plus, deux carreaux de ces Vitres, Huttres, taillés par les Indiens.

585. Deux Huitres de la Méditerranée, à valves nacrées, transparentes, un peu rabotteuses, dont la supérieure est blanche, percée près du sommet d'un grand trou ovale, & l'inférieure blanche sur les bords, mais partie jaune clair, partie rougeâtre vers le fommet, à charniere formée d'une petite patte ovale située au-dessus du trou de la valve supérieure, & correspondant à une cavité de même forme de la valve inférieure, nommées Pelures d'oignon \*, & très-grandes dans cette espéce. Plus, \* Arg. pl. 19. un très-joli groupe de quatorze Pelures d'oi-lett. C. Bonan. cl. 2. gnon, jaunes nuées de lilas, & de moyenne fig. 56. grandeur, adhérentes à un Burgau dans lequel f. 38. est logé Bernard l'hermite.

586. Vingt & une Pelures d'oignon de différentes grandeurs, & très-intéressantes : sçavoir, deux verd d'eau, plus rares que les précédentes, en ce qu'on y remarque des côtes & cannelures partant, non de la tête, mais du côté gauche de la circonférence : ces côtes & ces cannelures font accidentelles, & dues à celles des Peignes, sur lesquels ces Coquilles se trouvent souvent adhérentes; quatre grandes de la variété des premieres de l'article précédent; huit de même espéce, mais de formes très -va-

I. FAM. HUTTRES. riées, dont quatre blanches, trois lilas, & une jonquille; un groupe de cinq autres, lilas clair. adhérentes à un Burgau dépouillé; une trèsgrande, couverte de vermiculaires, & une qui différe de toutes les précédentes, en ce que la fenêtre en a été bouchée par l'animal.

587. Une très-grande Huitre des Indes, blanc fale en dessus, d'une très - belle nacre en dedans, de forme applatie, à bords supérieurs des deux valves dépourvus de charnière, mais seulement un peu caves sur-tout vers le milieu pour recevoir le ligament, dont la partie qui reste, a été coupée transversalement, & chatoie comme la plume de paon. Cette Coquille est de l'espèce qui fournit les plus belles \* Lift, tab, perles, ce qui l'a fait nommer Mere-Perle \*.

221. f. 56. & tab, 222. litt. F.

588. Une très-belle Huitre des Indes, un Gualt. tab. 84. peu moins grande que la précédente, à robe écailleuse verd foncé, à bandes longitudinales. blanches partant du sommet en forme de rayons. d'une très belle nacre en dedans, blanche, excepté vers la circonférence où elle est jaunâtre. & fur les bords qui font d'un verd tirant fur le noir. Cette Coquille, qui du reste est semblable à la précédente, est nommée par Klein Mere-Perle stérile, & connue en France sous celui de

\*Arg. pl. 20. Pintade: celle-ci est très - grande dans son eslett. A.

Lift. tab. 223 - péce \*. F. 57. & 224.

589. Deux Pintades, dont une dévouillée. f. 18. Gualt. tab. 84. 590. Idem. litt. G.

591. Trois Pintades: sçavoir, deux d'Amérique, différentes des précédentes en ce que les I. FAM. écailles de leur robe sont un peu saillantes, en Huitres. forme de petites feuilles pointues très-ferrées; & une des Indes, de couleurs très-vives, dont le sommer est verd d'éméraude.

592. Six Huitres : sçavoir, une Pintade des Indes, différente des précédentes en ce qu'elle est de forme plus étroite & en demi - croissant; une d'Amérique, rougeâtre, teinte de blanc vers la tête; un groupe de trois petites Pintades d'Amérique, sur une espéce d'Alcyonium; & deux valves de petites Meres - Perles, au dedans de chacune desquelles adhére une Perle ronde d'un bel orient, & d'une belle grosseur.

593. Deux belles Huitres des Indes, à valves. très-inégales entr'elles, à charnière montrant dans la valve inférieure une petite dent, avec un long fillon, & dans la supérieure une cavité qui reçoit la dent, & un petit filet qui engraine dans la rainure de l'autre valve, nommées l'Hirondelle ou l'Oiseau, à cause de leur forme, qui, lorsque la Coquille est ouverte, imite assez la tête, les aîles & la queue d'un oiseau : l'une est violet-noir en dessus, à aîles assez grandes, & 1 queue médiocrement longue \*; l'autre est \* Arg. pl. 19. canelle très-finement rayée de marron foncé, Guilt. tab 94. à queue très-longue, à petites aîles & très-pe-litt. A.

fig. 55.

I. FAM. HULTRES. \* Rumph.tab. 44. litt. G.

tite tête \*; toutes deux d'une très-belle nacre en dedans.

594. Quatre Hirondelles : scavoir, deux d'Amérique, semblables à la premiere de l'article précédent, à cela près que la nacre de l'une est d'un éclat un peu moindre, & que celle de l'autre est dorée : cette derniere est chargée de vermiculaires ; une de Malthe, grise en dessus, blanche & nacrée en dedans , à queue courte . à tête presque de même grandeur, & à trèsgrandes aîles un peu arquées; & une petite des Indes, qui différe de la derniere de l'article précédent, en ce que la queue en est moins longue, la tête plus large, & le corps plus petit.

595. Une Huitre des Indes, rare, blanche nuée d'incarnat, à stries longitudinales fines & granuleuses, à coque mince, à valve inférieure arquée des deux côtés, & échancrée prèsde la tête, à charniere formée d'un très - petit filet de la valve inférieure, qui s'enchasse dans une légere rainure de la supérieure, & d'une entaille longitudinale dans la tête applatie des deux valves, laquelle est destinée à recevoir le ligament.

596. Une Huitre des Indes, rare, blanche nuée de fauve, à deux faces, l'une triangulaire, l'autre en demi-cœur allongé, presque planes & à équerre dans la valve supérieure, convexes dans l'inférieure, contournées l'une sur l'autre, de maniere à se joindre, quoique peu exactement, à stries longitudinales partant du HUITRES. sommet, & à charniere formée d'un grand nombre de petites hachures ou entailles, régnant dans presque toute l'étendue du sommet de chaque valve \* : c'est l'Ostreum tortuosum, nommé en Hollande le Devidoir, & en France la Bistournée.

Rumph. tab. Gualt, tab.950

597. Quatre petites Huitres oblongues blan- lit. B. ches teintes de rouge pâle, à stries longitudinales onduleuses peu prononcées, à coque mince un peu arquée, à une échancrure plus ou moins marquée au côté gauche de la tête, & à charniere composée d'une rangée de quatre à cinq dents ou entailles qui régnent dans toute la largeur du sommet applati de chaque valve; trois de forme plus ronde & plus platte, à charniere où l'on compte jusqu'à huit dents; un groupe de vingt autres de cette derniere espéce, liées ensemble par une espéce de By sus; & deux des Indes, dont une revêtue de son épiderme, l'autre polie, toutes deux violettes, & à charniere comme les précédentes, mais composée de dix dents dans l'une \*, & de quatorze dans l'autre: en tout vingt - neuf huitres nacrées, 227. f. 62. dont vingt-sept d'Amérique.

\* Lift. taba

598. Une Huitre des Indes, rare, violetnoir en dessus, nacrée en dedans, & où l'on

voit même des Perles, à deux branches à-peuprès d'équerre l'une sur l'autre, dont une étroite, courte & finissant en pointe, l'autre large, longue & arrondie à fon extrémité, arquée dans son milieu, à charnière comme les précédentes, mais comprenant jusqu'à vingtquatre dents, espéce nommée en Hollande l'Equerre, & en France la Cuisse : celle-ci porte

tab. 47. lit. I. plus de sept pouces de long \*.

Gual. tab. 97. 599. Deux Cuisses, dont une de l'espèce de litt. A. séba, pl. 91. la précédente, mais moins grande, & une plus nº. 6 & 7. Valent, biy, rare en ce qu'elle n'a qu'une seule branche, fig. 3. blanche vers le haut, violet foncé dans le reste,

& à charniere composée de douze dents.

600. Une grande Huitre des Indes, ra e, & d'une belle conservation, violet-noir en dehors, plombée, brillante & nacrée en dedans, de la forme d'un T un peuplié & contourné, à charniere formée dans le milieu de la va've inférieure, d'une large dent triangulaire applatie. chargée eile-même d'autres très-fines, correlpondantes à de petites cavités de même forme dans la valve opposée, & à profonde échancrure dans les deux valves, destinée à recevoir

\* Arg. pl.19. le ligament, espéce nommée le Marteau \*. lett-A. Gual. tab. 601. Un Marteau moins grand que le précé-95. litt. D.

séba, pl. 93. dent, & d'ailleurs un peu fruste. nº. I.

602. Un beau groupe de trois Huitres des Indes, rares, à robe marron clair granuleuse & comme chagrinée, de forme presque ronde, à larges plis disposés de maniere que les angles HULTRES. saillans d'une valve s'enclavent exactement dans les angles rentrans de l'autre, à charniere formée d'un simple pli à peine visible, parallele au sommet de l'une des valves, & s'adapant avec le ligament dans un léger enfoncement de l'autre valve, espéce nommée Crête de cog ou Oreille de cochon\*.

603. Un autre groupe de trois Crêtes de co 7 Rumph. tub. semblables aux précédentes, à la couleur près 47. litt. D. qui en est violette de diverses nuances.

\* Arg. pl. 20.

604. Deux Huitres des Indes: sçavoir, une marron, de forme oblongue, à valve supérieure chargée dans son milieu d'une forte côte longitudinale, plus faillante que large, à valve insérieure divisée par un fillon de même largeur que la côte opposée, & par où la Coquille adhéroit à quelque branche, à larges plis & cannelures obliques naissant de la côte & du fillon, & s'adaptant exactement d'une valve à l'autre, à charniere comme dans la Crête de coq, espéce nommée la Feuille \*; & une Crête \* Arg. pl. de coq lilas clair, à plis d'une de ses valves chargés de longues pointes applaties \*.

\* Gualt, rab. 104. litt. C.

605. Deux Feuilles, dont une rose seche, de forme moins oblongue, à côtes & fillon plus larges que dans la précédente \*, & une vio- \* Arg. pl. lette de forme très-allongée, adhérente, ainsi Rumph. tab.

que plusieurs valves d'Huitres de la même espéce, à une petite branche d'arbre.

606. Un groupe de deux Huitres des Indes très-rares, & adhérentes l'une à l'autre, grises, de forme oblongue, à tête en pointe & ressemblante à un petit bec, à valves supérieure & inférieure, chargées comme celles de la Feuille, d'une côte & d'un fillon, à plis réciproques d'une valve à l'autre, semblables à ceux de la Crête de coq, mais beaucoup plus nombreux. & naissans, non de la tête, mais de la côte & du fillon; variété que M. d'Argenville dans fa \*Arg. Conch. Conchiliologie \* a jugé être non - seulement l'analogue marin du Rastellum (ou Rateau)

pag. 126.

fossile, mais l'unique qui eût été trouvée jusqu'alors. 607. Une grande & belle Huitre des Indes

rare, marron fale, de forme ronde, à grands plis réciproques d'une valve à l'autre comme ceux de la Crête de coq, dont elle ne différe qu'en ce qu'elle est de forme plus bombée, & que les valves en sont composées de divers feuillets placés l'un sur l'autre, qui dans le tranchant des plis, s'allongent en forme d'épines

\* Arg. App. tuilées \*.

Rumph. tab. 608. Un groupe de trois Huitres des Indes, 47. litt. C. Gualt. tab. & rarcs, grises nuées de verd de diverses nuan-103. ces, à valve supérieure applatie, rabotteuse par ondes vers la tête, feuilletée vers le bas, &

inférieure

inférieure fort profonde, se terminant en pointe recourbée en dessous vers le sommet, & garnie I. FAM. de groffes côtes longitudinales tuilées, de cou-HUITRES. leur blanche en dedans, excepté vers lesbords qui sont violet - noir, & plissés comme dans la Crête de coq, mais moins fortement, à charniere formée de stries nombreuses très-fines, & d'un ligament s'étendant dans toute la largeur du sommet de l'une & l'autre valve, espéce nommée Corne d'abondance.

609. Une grande Corne d'abondance, à prolongement de la tête hors de la valve inférieure, se portant plus loin que dans les précédentes.

610. Un groupe de trois Huitres des Indes, fauve-blanc & rose séche, oblongues, à coque formée de divers rangs de feuilletures papyracées, à valve inférieure en forme de cuiller trèsprofonde, & supérieure convexe en dedans, à charnière comme dans la Crête de coq., & une Corne d'abondance.

611. Neuf Huitres des Indes: sçavoir, deux couleur de rose teint de lilas vif, de forme demicirculaire, à valve supérieure platte, & inférieure un peu courbée à équerre vers ses bords. toutes deux à côtes qui finissent en plis réciproques comme dans la Crête de coq, dont elles ont aussi la charniere, & de l'espéce nommée Corbeille\*; une grife en dessus, rose sale en dessous, \* Gualt, tabs de forme oblongue arquée vers les deux extré- 104. litt. D.

mités; une Monc sale veiné de marron, de forme un peu triangulaire, & à groffes côtes longitudinales finissant en plis réciproques d'une valve

à l'autre \*; trois petites de forme presque ronde, à côtes & plis réciproques comme les précé-197. fig. 32. dentes, mais à charniere formée de trois dents, qui engrainent dans autant de cavités correspondantes : l'une est blanche & adhére à un brin de madrepore, les deux autres sont blanches, marbrées sur les côtes de violet foncé, l'une desquelles adhére à un tuyau vermicu-

laire \*; une Feuille gris-verdâtre, à côte large, 4 Gualt, tab. 99. litt. E.

& une Corne d'abondance.

612. Deux Huitres des Indes en pendant, blanches & fauve-rougeâtre, de forme oblongue, à valve supérieure arquée vers le dedans, & inférieure composée de trois plans, dont les deux latéraux portent presque à plomb sur celui du milieu, à intérieur de la Coquille violet foncé, blanc, & verd-jaunâtre jouant l'opale, & à charniere comme celle de la Corne d'abondance, à cela près que l'un & l'autre bord de la valve supérieure est de plus garni de sept à huit dents, qui engrainent dans autant de cavités de la valve inférieure.

613. Une grande Huitre de la Virginie, rare, quoique d'espéce commune, verdâtre en dehors, blanche en dedans, à l'exception de l'endroit où étoit attaché l'animal, qui est violet obscur, à charniere semblable à celle des précédentes, & de sorme allongée très-étroite, ce I. Fam. qui lui peut saire donner le nom de Pirogue\*: Huitres. une de ses valves est chargée d'une petite Huitre 200. sig. 34. de même espéce.

614. Deux autres Huitres de la Virginie, d'espéce commune, remarquables par leur grandeur, blanc sale en dehors, blanches en dedans à l'exception d'une grande tache violet-noir sur chaque valve, comme dans la précédente: elles ne dissérent de celle qui est représentée dans Lister \*, que par leur sorme plus large & moins allongée.

\* Ibid. tab.

615. Vingt & une Huitres de différentes grandeurs: fçavoir, deux blanches papyracées adhérentes à des moitiés de Moules violettes; trois d'Amérique, grisâtres, à coque mince formée de plusieurs couches seuilletées; une grande de même espéce, qui a adhéré par fa valve inférieure à quelque grosse branche, & dont les deux valves sont en conséquence arquées, conformément au corps que celle du dessous a embrassé; deux petites des mêmes Mers, violet obscur, de forme applatie, à stries longitudinales, & à valves très-minces; une de forme semblable, mais dont la valve supérieure est ornée de deux larges rayons blancs; quatre petites des côtes de Bretagne, blanches, papyracées, transparentes comme le tale, de la for-

me d'un demi-cœur, & à valve supérieure platte; un groupe de trois des mêmes Mers, violet-noir & lilas, semblables pour la forme à celles de l'article 610; deux groupes, l'un d'une Huitre rabotteuse marbrée de blanc, de grisâtre & de lilas, chargée de trois glands de mer, l'autre de deux rabotteuses gris de lin, & lilas nué de blanc; une Corbeille, & une Huitre de l'espéce de deux de l'article 612: toutes, excepté celle-ci, ont la charniere comme la Créte de coq.

616. Une branche de Manglier à trois jets, chargée de petites Huitres oblongues d'Amérique; une grosse masse de terre glaise verdâtre, desséchée & durcie, sur laquelle sont groupées plusieurs grandes Huitres d'espéce commune, avec des vermiculaires; & treize Huitres, ou groupes d'Huitres de nos Mers, de sorme trèsvariée \*.

\* Gualt. tab. Variée \*.

102. dit. A. B.

617. Une grande Trompe marine montée sur un pied, chargée de plusieurs Huitres de l'espéce des premieres de l'article 610; un trèsgros groupe d'Huitres communes, de Pétoncles, de Vermiculaires, d'Éponges, & d'autres Polypiers.

618. Deux groupes, dont un très-joli, formé d'un grand nombre de petites Huitres d'Amérique, papyracées, blanches mêlées de fauve, de violet & de jaune, adhérentes à une bran-

che de Manglier, & montées sur un pied; & l'autre d'Huitres communes, adhérentes avec I. FAM. quelques vermiculaires à un petit vase de terre Huitres. cuite.

619. Une Bouteille de verre, sur laquelle sont groupées des Huitres d'espéce commune, un Pétoncle, des Vermiculaires, &c.

## GENRE SECOND.

HUITRES FEUILLETÉES.

620. NE Huitre des Indes, nommée Gâteau feuilleté, & très-grande dans son espéce: elle est blanche, de forme ronde bombée, à feuilles circulaires profondément découpées, & recouvrant les deux valves, dont la supérieure est ornée de trois bandes longitudinales un peu courbes, couleur de rose, à charniere formée dans chaque valve, d'une double moulure, dont la plus grande est garnie de petites dents, qui s'engrainent réciproquement, ainsi que les moulures, dans les cavités correspondantes des deux valves \* : cette charniere est la même \*Arg. pl. 20. dans toutes les Huitres de ce genre.

Séba, pl. 88.

621. Un Gâteau feuilleté un peu moins Rumph. tab. grand, mais dont les rangs de feuilles sont valentyn, bival. f. 4.

T iii

dans l'une & l'autre valve, d'une belle couleur de chair. I. FAM.

HUITRES.

622. Deux Huitres d'Amérique, l'une jonquille, l'autre lilas, toutes deux vives en couleur, à plusieurs rangs circulaires de petites feuilles tuilées, plus longues dans les rangs inférieurs, à dedans des valves mêlé de pourpre, & nommées simplement Huitres feuilletées : la violette adhére à une petite branche de Madrépore oculé blanc.

623. Un beau groupe de cinq Huitres feuilletées, dont trois grandes, l'une jonquille, l'autre lilas, & la troisieme comme panachée de ces deux couleurs, & deux petites, dont une jonquille, & l'autre couleur de chair.

624. Deux groupes d'Huitres feuilletées: scavoir, un formé de deux Huitres, lilas, adhérentes à une portion de grosse branche de Manglier, & le second, de deux petites lilas sur une grande jonquille nuée de lilas.

625. Quatre Huitres feuilletées : sçavoir, deux grandes & deux petites lilas, & deux valves d'autres de même espéce, la premiere jonquille, la feconde blanche, groupées sur une très-belle Arche de Noé fasciée de canelle & d'incarnat. Plus, un groupe de deux autres, dont une lilas, & l'autre jonquille nuée de lilas.

626. Deux jolis groupes d'Huitres feuilletées: scavoir, un de deux grandes lilas, & l'autre de fix, quatre desquelles sont jonquille, une lilas, & une très-petite blanche.

I. FAM.

627. Deux autres groupes d'Huitres feuille-Huitres. tées: le premier composé d'une jonquille & d'une lilas clair; & le second de trois, dont une jonquille nuée d'incarnat & de lilas, une simplement jonquille, & l'autre lilas.

628. Cinq Huitres feuilletées : sçavoir, une jonquille nuée de violet, adhérente à une branche de Madrépore oculé; une blanche engagée dans une valve de Vieille ridée; une citron nuée de blanc & de pourpre, à feuilles étroites & dont une petite semblable à une fleur de luzerne. 88. nº. 8. pointues en forme d'ergots \*; & deux lilas,

629. Trois groupes d'Huitres feuilletées: sçavoir, le premier d'une lilas & d'une petite blanche sur une Arche de Noé reticulée ; le second d'une Huitre jonquille nuée de lilas, d'une lilas. & d'une Feuille de la variété de la feconde de l'article 605, sur une branche de Madrepore; & le troisieme d'une Huitre lilas, & de quelques vermiculaires fur une branche de Manglier.

630. Deux jolis groupes d'Huitres, & deux Huitres isolées : sçavoir , le premier groupe formé d'une Huitre feuilletée lilas, & de deux lisses, l'une blanche, l'autre marron, de l'espéce des dernieres de l'article 597; le second de deux Huitres feuilletées, dont une jonquille, & l'au-

Tiv

tre lilas, & d'une Huitre lisse, de l'espèce de la derniere du groupe précédent: les deux Huitres is isolées sont petites, blanches, mais rares, à valve insérieure très-convexe, sur laquelle on remarque six rangs de seuilles circulaires plissées en sorme de manchettes de semme, & à valve supérieure en sorme de cœur, platte, chargée de plusieurs rangs de seuilletures couchées.

631. Quatre petits groupes d'Huitres feuilletées: sçavoir, une jonquille sur un Astroïte; une jonquille vers la tête, lilas dans le reste, adhérente à une Moule verte striée; deux l'une sur l'autre blanches nuées de couleur de rose & de cérise, toutes deux à stries longitudinales; & trois, dont une lilas, une citron, & une blanche nuée de lilas sur une Arche de Noë réticulée.

632. Trois jolis groupes, dont un de deux Huitres feuilletées lilas; un de trois autres, dont une blanche & deux jonquille nuées de lilas, & le troifieme d'une blanche nuée de lilas, non nettoyée, & telle qu'elle est sortie de la mer, sormant une espèce de bouquet sur une branche de Madrepore oculé gris.

633. Cinq Huitres feuilletées: fçavoir, une très-grande jonquille, à feuilles circulaires, pliffées & couchées l'une fur l'autre, & logeant dans l'épaisseur de sa valve supérieure une *Pholade* blanche; & les quatre autres groupées, dont

de laquelle est nichée une petite *Pholade* mar- I. FAM. ron, nommée *Sapotille*; trois Huitres lilas, Huitress. & une petite jonquille.

634. Six Huitres feuilletées: sçavoir, une canelle foncé, marbrée en quelques endroits de blanc, & à trois rangs longitudinaux un peu courbes de feuilles tuilées se couvrant l'une l'autre; une blanche papyracée, à valve supérieure applatie; deux jonquilles nuées de lilas, adhérentes l'une à une valve d'Huitre lisse, l'autre à une branche de Madrepore gris; & deux lilas. Plus, quatre valves inférieures d'Huitres, cerise vis nué de blanc, à tête contournée comme la Gryphite, & nommées communément Huitres de la Mer Rouge, valves qu'on trouve presque toujours isolées, & qui paroissent avoir perdu leurs seuilles par le frottement.

\* Gualt. tabl



#### GENRE TROISIEME.

HUITRES ÉPINEUSES.

HUITRES.

635. U NE Huitre épineuse des Indes, rare, & de la plus belle conservation, à valve supérieure blanche ponctuée de lilas vers la tête, lilas dans le reste, à stries longitudinales, serrées & hérissées d'épines plus ou moins longues, fines & recourbées, à valve inférieure mi-partie de grosses épines citron, & de larges seuilles couleur de rose, à tête prolongée, formant un plan triangulaire marqué dans son milieu d'un trait longitudinal noirâtre, & dont le fommet se recourbe en dessous, à deux petites oreilles situées aux deux côtés de chaque valve, à charniere composée de quatre dents, dont deux grosses & deux petites, s'engrainant dans les cavités réciproques des deux valves, & à bord

\* séba, pl. intérieur orangé-brun \*, espèce nommée Spondile, ainfi que les suivantes, qui, quoique trèsvariées, lui sont d'ailleurs semblables par la forme de la tête & de la charnière.

636. Une Huitre épineuse différente de la précédente par ses stries moins serrées, & par ses épines citron, grosses & applaties sur un

<sup>\*</sup> Ibid. pl. fond lilas \*. 88. nº. 3.

637. Une Huitre épineuse de l'espèce des précédentes, à robe, épines & seuilles lilas I. Fam. clair, & à tête blanche ponctuée de lilas.

638. Une qui différe des précédentes en ce que la valve inférieure est blanche vers la tête, orangée dans le reste, & la supérieure mêlée de blanc & de couleur de rose: les épines de cette valve sont aussi plus courtes & plus étroites \*. \*séba, pl. Les Hollandois ont donné à ces Coquilles le 88. n°. 2. nom de Castagnettes.

639. Une Huitre épineuse des Indes, dont la valve supérieure est mi-partie blanche & violette, & dont presque toutes les épines sont orangé soncé: la valve inférieure est platte dans plus de la moitié de son étendue, pour avoir adhéré à quelque corps étranger.

640. Une autre à valve supérieure blanche, bordée dans les deux tiers de sa circonférence, & ponctuée vers la tête de brun, à épines trèscourtes, à valve inférieure chargée dans sa moitié gauche de petites épines blanches, de grandes épines & de feuilles jaune soncé, & adhérente par l'autre moitié à deux astroïtes, l'un à grandes, l'autre à petites étoiles, au premier desquels adhére aussi une petite Huitre blanche non épineuse.

641. Une Huitre épineuse des Indes, rare, dont la robe est totalement orangée, ainsi que

lett. G.

= les bords intérieurs des valves, & les épines ; qui sont plattes, larges & un peu couchées \*.

642. Une autre de même espéce, mais de \* Séba, pl. 28. nº. 1. couleur un peu moins foncée, & dont les pi-\* séba, pl. quans font moins applatis & plus droits \*.

\$8.nº. 6. 643. Une autre d'un bel orangé, dont les piquans tiennent de la forme des deux variétés précédentes : elle adhére à un caillou.

644. Deux Huitres épineuses des Indes: scavoir, une à valve supérieure violette tachée de blanc, & à stries des deux valves aurore, ainsi que les épines qui sont plattes & larges vers les \*Ibid. n°.5. bords \*; & une aurore vif, à un petit nombre d'épines ne se montrant que sur la valve supérieure, quelques-unes desquelles s'élargissent en forme de feuilles.

645. Une grande Huitre épineuse des Indes, cramoisi pâle, de sorme ronde, à stries inégales chargées çà & là de groffes épines, dont quel-\*Arg. pl. 20. ques-unes fe recourbent en dedans \*.

646. Une autre plus grande encore & trèsbelle, à robe nuée de blanc & de cramoisi, à groffes stries longitudinales, dont sept blanches donnent naissance dans les deux valves, à de grandes epines de même couleur, larges & déchiquetées, & à bords intérieurs cerise.

647. Une autre de forme plus allongée, à valve supérieure marbrée par traits fins de blanc & de lilas, garnie d'épines peu nombreuses & petites, à valve inférieure blanche & couleur I. FAM. HUITRES. de chair, recouverte d'un grand nombre de grosses épines plus ou moins larges, & à tête très-grosse recourbée en dessus en forme de bec de perroquet\*.

\*Arg. pl. 192 des Indes, de forme très-renflée, à valves lie de vin, à fix rangs longitudinaux, & également distans les uns des autres de grosses stries chargées d'épines longues & larges, à stries fines intermédiaires d'où naissent aussi quelques petites épines, à tête orangée, & recourbée comme la précédente.

649. Un groupe en forme d'arcade de deux Huitres épineuses des Indes, blanches, à stries chargées de grandes épines applaties, à cannelures peu profondes marbrées par hachures transversales fines & en zig - zag d'amaranthe foncé\*.

\* Séba, pl:

650. Une Huitre de l'espèce, & à-peu-près 88. nº. 9. des mêmes couleurs que celles de l'article précédent, adhérente à une pierre verdâtre.

651. Un groupe de deux Huitres épineuses des Indes, blanches & amaranthe, à valves chargées de peu d'épines, d'une moitié de même espéce, & d'une Huitre-feuille blanche & gris de lin, adhérentes à une pierre noirâtre.

652. Deux Huitres épineuses des Indes ;

adhérentes chacune à un caillou ; sçavoir, une blanche, à neuf rangs de groffes firies longitudinales chargées d'épines courtes & larges, à stries fines intermédiaires, amaranthe clair, chargées de très-petites épines de même cou-

38.n°.4.

\* séba, pl. leur \*, & une de la variété de celles de l'article 649, à valve inférieure garnie de feuilles, & supérieure épineuse, à laquelle tient une valve de l'Huitre-feuille.

> 653. Trois Huitres épineuses de moyenne grandeur; sçavoir, deux blanches, marbrées d'amaranthe pâle, adhérentes à une pierre, & une aurore foncé, à pointes peu nombreuses, mais longues & applaties.

> 654. Un groupe de deux belles Huitres des Indes, blanches, marbrées par traits en zig-zag d'amaranthe clair, d'orangé & de rose vif en quelques endroits, à grandes épines blanches dans l'une, couleur de rose dans l'autre, & inclinées vers le bas, à prolongation du fommet de la valve inférieure blanche, & s'étendant fort au loin, espéce nommée par M. d'Ar-

\*Arg. pl. 20, genville le Pied d'âne\*.

655. Deux Huitres épineuses des Indes, lett. E. dont une blanche tacherée dans ses cannelures de fauve roux, à un grand nombre de longues \* séba, pl. épines, larges sur-tout vers le bas \*, & une à larges bandes alternatives blanches & violet-28. n°. 7. noir, des premieres desquelles naissent quelques

épines peu longues, mais larges & de même = couleur.

I.FAM. Huitres.

- 656. Idem, avec cette différence que les épines de la seconde Huitre sont nombreuses, la plûpart applaties, couchées sur leur valve, & comme repliées.
- dont une blanche à firies longitudinales grosses & sines, celles-ci amaranthe, & celles-là garnies d'épines, dont une grande partie, sur-tout vers le bas de la Coquille, s'élargit en forme de seuilles accouplées, & quelquesois triplées l'une sur l'autre, frisées & tortillées; & une blanche nuée & veinée par traits en zig-zag gris de lin, armée de longues épines applaties dans les bords des deux valves, & recouverte dans le haut de la valve inférieure, par une valve d'autre Coquille de la famille des Cœurs.
- 658. Trois autres, dont une semblable à la premiere de l'article précédent, à cela près que les épines en sont moins longues, plus serrées les unes sur les autres, & plus tortillées; une blanche à traits en zig-zag nombreux imitant le point d'Hongrie, & d'un bel amaranthe, à épines longues & blanches, excepté quelques-unes vers la tête, qui sont violettes, courtes & ramassées; & une blanche tachetée des mêmes couleurs que les précédentes, à valve inférieure

feuilletée, & supérieure garnie de petites épines nombreufes.

659. Trois autres; sçavoir, une rouge-sanguin, à stries fines & serrées entre les grosses qui donnent naissance à des épines peu nombreuses & peu élevées; une blanc-sale, veinée dans les cannelures d'amaranthe, à épines peu longues & applaties, dont quelques-unes font fouci: & une blanche veinée & tachetée de rouge foncé, sur-tout vers le bas, où elle n'a que fort peu d'épines.

660. Trois Huitres épineuses des Indes, dont deux en pendant de la variété de la derniere de l'article précédent, mais plus chargées d'épis nes; & une couleur de cérise, à stries inégales, les plus grosses veinées de blanc, donnant naissance à de grosses épines, dont quelques-unes font affez longues, & à tête recourbée en-deffus en forme de bec.

661. Une Huitre épineuse d'Amérique, trèsrare & très-belle, couleur de rose marbré de blanc, à grandes épines incarnat s'élargissant à leurs extrémités, où elles forment autant de feuilles déchiquetées, à tête garnie, comme celles des Indes, de deux oreilles, & nommée Huitre à feuilles de persil\*.

88. nº. 10.

662. Une Huitre à feuilles de perfil, à tiges de feuilles plus longues, & feuilles moins larges que celles de la précédente, & à la valve inférieure de laquelle adhére un petit Buccin de I. FAM. l'espéce nommée Mûre; elle est représentée dans HUITRES. Séba avec le même accident \*.

663. Une autre plus grande & plus bombée, 89. nº. 5. à longues feuilles blanches & incarnates, sur un fond couleur de rose \*.

\* Arg. pl. 12

664. Une grande & belle Huitre d'Amérique, à robe nuée de couleur de rose, d'incarnat & de blanc, à valve supérieure presque platte, armée dans ses stries de six rangs d'épines longues & plattes, entre lesquels s'en trouvent plusieurs autres d'épines courtes & aigues, à valve inférieure très-bombée, striée aussi suivant sa longueur, & chargée partie d'épines. partie de feuilles minces & très-larges incarnates, entre lesquelles est engagée une petite branche de Madrépore oculé.

665. Une autre semblable à la précédente de couleurs plus vives encore, & armée d'un

plus grand nombre de petites pointes.

666. Une de même espèce, mais où le blanc domine davantage, à feuilles de la valve inférieure très-nombreuses, entre lesquelles, outre le Madrépore oculé, est engagée une valve d'Arche de Noë blanche.

667. Une autre différente des précédentes, en ce que la plûpart des épines sont plus grandes & plus larges, & amaranthe vif, que la tête

Tome I.

en est vermillon, que la valve inférieure, au lieu d'être bombée, est au contraire un peu applatie, & que les bords de cette valve se replient en dehors.

> 668. Un groupe de deux Huitres épineuses d'Amérique, blanches nuées de rouge & à tête aurore.

> 669. Une très-grande & très-belle Huitre d'Amérique, blanche nuée de couleur de rose, à tête citron, & à très-longues épines couleur de rose.

> 670. Une autre où le couleur de rose domine davantage, même sur la tête, & à grandes épines, moins longues que dans la précédente.

> 671. Une très-grande Huitre d'Amérique blanche, teinte en quelques endroits d'incarnat, à tête aurore, & hérissée, tant en dessus qu'en dessous, d'épines larges & très-longues.

672. Une semblable un peu moins grande.

673. Trois Huitres de l'espéce des précédentes ; sçavoir , une à valve supérieure cramoisi nué de blanc, & inférieure blanche teinte de jaune, bordée de rouge, tenant entre ses feuilles une branche de Madrépore oculé gris; & deux petites à peu près semblables, dont la moindre est engagée entre deux Tuyaux vermiculaires.

674. Trois autres, dont une à valve supérieure bombée, blanche & couleur de rose, &

inférieure recourbée en dessous, rose séche & aurore vif sur-tout vers la tête, à très-lon- I. FAM. gues épines, dont quelques-unes se couchent HUITRES! & s'engagent en partie dans les feuilles du bord; une petite à valves blanches vers les bords, & vermillon près de la tête; & une autre petite nuée de rouge & de blanc, adhérente à une branche de Madrépore oculé.

675. Une grande Huitre épineuse d'Amérique, nuce de blanc & de cramoisi, à tête aurore, & longues épines couleur de rose.

676. Une autre très-belle, blanche, à tête aurore, & à épines larges, fort longues, un peu recourbées en dedans.

677. Une autre moins grande, blanche, à tête cérise, à piquans nués de couleur de rose, & adhérente à une valve d'une autre Huitre chargée de Vermiculaires, & qui lui sert de pied.

678. Une grande & belle Huitre épineuse d'Amérique, blanche vers les bords, nuée d'aurore & de rouge vers la tête, à stries très-serrées, à épines grandes & petites plus nombreufes, mais moins longues que celles des précédentes, & à intervalles des feuilles de la valve inférieure remplis de petites branches de Madrépore oculé blanc.

679. Une autre blanche, à tête orangé vif, à épines de la valve supérieure peu longues, HUITRES.

excepté vers les bords, & celles de la valve inférieure couchées & entrelassées avec les feuilles, auxquelles adhérent plusieurs petites branches de Madrépore oculé.

680. Une semblable, à grosses épines plus nombreuses.

681. Idem.

682. Une très-grande Huitre épineuse de la Méditerranée, à valve supérieure pourpre, & inférieure blanche, à stries longitudinales très-serrées & hérissées d'épines, les unes plus grandes, s'élargissant vers le haut, les autres plus petites & rondes, & à valve inférieure chargée de quelques feuilles qui naissent entre les épines, où adhérent des Vermiculaires, & quelques Escares.

683. Une autre un peu moins grande, à feuilles de la valve inférieure plus nombreuses, & épines teintes de pourpre.

684. Un groupe de deux Huitres épineuses de la Méditerranée, à valve supérieure veinée de pourpre clair & de blanc, & inférieure blanche, hérissée d'épines plus grandes & plus nombreuses que la supérieure.

685. Une autre à valve supérieure blanche & lilas, chargée de nombreuses épines fines & grosses de même couleur, dont la plûpart de celles ci sont applaties, & à valve inférieure

blanche, presque entiérement seuilletée & un peu arquée.

I. FAM.

686. Deux autres en pendant, à valves su- Huitres, périeures veinées d'un pourpre très-vis.

687. Deux autres à valve supérieure totalement pourpre dans l'une, blanche veinée de pourpre dans l'autre.

688. Deux grandes Huitres épineuses de la Méditerranée, dont une à valve supérieure pourpre soncé, & inférieure blanche, seuilletée de souci, remarquable en ce que la plûpart des épines de la valve supérieure y sont couchées & comme colées sur cette valve; & une dont la valve supérieure est blanche, ponctuée le long des stries de pourpre, & à épines peu nombreuses de cette derniere couleur.

689. Trois autres de moyenne grandeur; fçavoir, une dont la valve inférieure fe releve, à équerre fur la fupérieure, en forme de corbeille, & dont les bords de celle-ci, recourbés en dehors, s'emboîtent exactement en forme de couvercle dans la cavité de l'inférieure; une adhérente à un groupe de Vermiculaires & de Tubipores; & une à feuilles de la valve inférieure fouci.

690. Une grosse Pierre d'environ un pied de haut, sans le support, revêtue de concrétions marines, & à laquelle adhérent trois Huitres épineuses de Malthe, dont une fort grande, des

310 COQUILLES BIVALVES

I. FAM.

Corallines, des Fucus, de petits Coquillages

691. Deux Huitres très-rares, dont une amaranthe clair, marbrée dans les deux valves par traits longitudinaux de blanc, à stries longitudinales larges & applaties, & à tête recourbée en dessous de gauche à droite, & l'autre à valve supérieure orangé soncé, marbrée par traits longitudinaux de blanc, & inférieure marbrée d'aurore, de blanc, de jonquille & de citron, à stries inégales serrées & arrondies, toutes deux dépourvues d'épines, mais de la forme totale des épineuses, ce qui détermine à les placer dans ce genre.



# GENRE QUATRIEME.

ANOMIES OU TÉRÉBRATULES.

692. UNE Anomie des Indes, très-rare, verd-noirâtre, à stries longitudinales très-fines, I. FAM. à avance de la valve inférieure sur la supérieure, en bec de perroquet, ce qui lui en a fait donner le nom, à trou triangulaire formant le dessous de ce bec ; à charnière composée dans la valve inférieure de deux petits crochets, qu'embrassent des sinus correspondans de la valve supérieure, & à deux petits appendices intérieurs fixés vers le haut de celle ci \*. Cette \* Arg. pl.235 Coquille est des plus grandes que l'on connoisse lett. O. dans cette espéce.

693. Un autre Bec de perroquet un peu moins grand que le précédent.

694. Une Anomie de Mahon, lisse, blanche tirant sur le verd d'eau, papyracée, à avance de la valve inférieure sur la supérieure moins faillante que dans la précédente, à trourond formant le dessus de cette avance, à large applatissement longitudinal dans le milieu de la même valve, mais peu prononcé sur-tout vers le bas, à charnière & appendice intérieur comme-

I. FAM. HHITRES. \* Ar. App. pl. 3. lett. E.

dans la précédente, & nommée Coq & Poulé ou Poulette\*: elle est grande dans cette espéce & tient par un petit nerf à une valve d'autre Anomie de même espéce.

695. Deux Poulettes blanches moins grandes que la précédente, dont une tient par un

petit nerf à un brin de Corail rouge.

696. Une grande Anomie des parages voifins du détroit de Magellan, blanche, à stries longitudinales, à trou du sommet rond & fort grand, à large élévation longitudinale en forme de carêne dans le milieu de la valve inférieure, à charniere peu différente des précédentes, mais montrant deux appendices latéraux longs & étroits partant du fommet de la valve supérieure, s'étendant vers le milieu de la même valve, où ils sont assujettis de nouveau par deux petits ligamens, pour se recourber ensuite vers la tête d'une façon trèssinguliere. Cette Coquille porte un pouce sept lignes de diametre.

697. Une Anomie Magellanique qui peut servir de pendant à la précédente.

698. Deux autres en pendant, dont une Magellanique, & l'autre de la variété de l'article 694, mais moins grande.

699. Treize Anomies : sçavoir, deux petites de Mahon, rares & en pendant, jaune-blond, gransparentes, à stries circulaires presqu'inperceptibles, à valve inférieure fort concave, & supérieure plus platte, débordant l'infé- I.FAM. rieure dans un grand triangle curviligne en for- HULTRES. me de lampe du côté de la tête, à petite queuë forée, & à deux espéces de petites aîles. Ces Coquilles sont du diametre d'un gros pois, & imitent assez la forme d'un Scarabée, ce qui leur en peut faire donner le nom; quatre autres beaucoup plus petites, qui différent des précédentes en ce qu'elles sont sans stries, que la valve inférieure en est moins concave, & qu'au lieu de deux aîles, on y voit deux tuyaux latéraux à-peu-près égaux, & semblables à celui du milieu qui forme la queue; deux petites de la Méditerranée, blanches, de forme ovale, peu convexes, à trou rond, & à stries longitudinales partant du sommet \*; deux autres blanc \*Gualt. tab. fale, à deux espéces de petites oreilles près du 96. litt. B. trou du sommet, à stries longitudinales & circulaires très-fines, & à appendice intérieur en forme de gouttiere, tenant au sommet & au milieu de la valve supérieure \*; une très-petite \* Ibid. lit. A: de même espéce, mais à stries moins serrées; une Magellanique & un Bec de perroquet.

700. Idem.



### SECONDE FAMILLE.

#### PEIGNES.

II. FAM.

Ce sont des Coquilles de sorme plus ou moins applatie, qui ne dissérent des Huitres du troisieme genre qu'en ce que leurs côtes ou stries longitudinales sont dépourvues d'épines, & que le sommet de leur valve insérieure ne se prolonge, ni ne se recourbe en dehors. Leurs caracteres généraux sont d'avoir le sommet comme coupé en ligne droite, d'aller ensuite en s'élargissant insensiblement pour prendre une figure arrondie, & d'être ordinairement pourvues d'oreilles. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

1°. Les Peignes à oreilles égales & à charnière composée 1°. d'un ligament à ressort placé dans une cavité qui occupe le milieu du sommet de chaque valve; 2°. d'un petit filet transversal

de la valve supérieure, se logeant dans une rainure correspondante de la valve PEIGNES. inférieure. On nomme vulgairement les Coquilles de ce genre, Pélerines ou Coquilles de Saint-Jacques.

- 2º. Les Peignes à oreilles inégales, à charniere comme les précédens, à valves supérieure & inférieure convexes, & nommés plus particuliérement Pézoncles.
- 3°. Les Peignes sans oreilles & à charniere formée d'un petit applatissement en forme de triangle obtusangle isoscele, sur lequel est placé le ligament, & de plusieurs petites dents rangées de part & d'autre en forme d'arc dans l'une & l'autre valve.



#### PREMIER. GENRE

PEIGNES A OREILLES ÉGALES.

II. FAM. PEIGNES.

701. N grand Peigne rare, quoique de nos mers, à valve supérieure blanche & platte, chargée de feize côtes longitudinales tachées de rouge de diverses nuances, & d'autant de larges & profondes cannelures blanches, à valve inférieure convexe presque entiérement blanche, chargée de côtes plus larges que celles de la supérieure, & dont la plûpart contiennent

\*Gualt. tab. quatre stries de même direction \*. 99. litt. A B.

702. Dix Peignes par pendans: sçavoir, deux très-grands, à valve supérieure marbrée de blanc & de rouge, & inférieure blanche, à deux zônes nuces d'orangé, d'aurore & de citron dans l'un, blanche nuée de jaune dans l'autre, tous deux à larges côtes & profondes cannelures, chargées de stries longitudinales & transversales, mais dont celles-ci sont plus senfibles dans le fecond, & celles-là dans le pre-

98, litt. A. B.

\*Gualt, tab, mier \*; deux blancs, & quatre marbrés de blanc & de diverses belles nuances de rouge & de jaune, de la variété des deux premiers de cet article, & deux de celle de l'article précédent, mais plus petits, & qui en différent d'ailleurs en ce que le sond en est rose séche.

703. Deux Peignes d'Amérique, à valve in- Peignes. férieure très-convexe, & supérieure un peu concave, chargées l'une & l'autre en dehors de stries applaties peu marquées vers la tête, & en dedans de paires de stries peu sensibles aussi vers le haut, espèce nommée Bénitier, l'un desquels est peu commun en ce qu'il est entiérement blanc, l'autre n'a que la valve inférieure qui soit blanche, la supérieure est lilas marbrée de fauve & de brun.

704. Deux Bénitiers, à valve supérieure marbrée de rouge-brun, de violet & de gris, & inférieure fauve nuée de blanc.

705. Deux Peignes des Indes en pendant, lisses en dehors, à stries longitudinales intérieures peu serrées, à valve supérieure rose séche en dehors, rayonnée de lignes longitudinales rouge - brun, & en dedans blanche, bordée de lie de vin, à valve inférieure totalement blanche, à coque mince, & de forme très - peu bombée, quoiqu'également dans chaque valve, espèce nommée Sole ou Eventail \*.

706. Une Sole des Indes de quatre pouces 24. lett G. Rumph. tab. & demi de diametre, à valve supérieure veinée 45. litt. A B. en dehors par cercles alternatifs de rouge-brun fig. 354. de diverses nuances & de blanc, à rayons blancs peu prononcés, & en dedans blanche

II. FAM. PEIGNES.

bordée de citron, à valve inférieure blanche nuée de citron en dehors, & semblable en des dans à la supérieure, variété que l'on nomme Sole de la rare espèce.

707. Une Sole de l'espéce de celles de l'article 705, mais rare en ce que sa valve supérieure est parsemée vers les bords de taches grandes & petites ventre de biche, & que l'inférieure est pareillement tachée d'un blanc plus mat que le fond, variété que l'on nomme Sole marquetée.

708. Deux autres variétés de Soles rares, l'une à valve supérieure rouge-brun, rayonnée sur-tout vers le haut de faisceaux jaunes, & de lignes brunes en dehors, bordée de pourpre en dedans, à valve inférieure comme les précédentes; & l'autre à stries longitudinales intérieures très-ferrées, à valve supérieure rougesanguin, & inférieure nuée par zônes de blanc & de couleur de rose de diverses nuances.

709. Deux Peignes d'Amérique en pendant. lisses en dehors, à stries longitudinales intérieures bien prononcées, à valve supérieure platte, rouge-brun en dehors, blanche tachée d'orangé-brun en dedans, & inférieure concave, blanche tant au dedans qu'au dehors dans l'un, fauve nuée de blanc dans l'autre. Cette espéce de Peigne que nous connoissons depuis peu, est de forme moyenne entre celles de la Sole & du Bénitier.

II. FAM: Pergnes.

710. Un Peigne Magellanique rare & trèsgrand, mais un peu dégradé, à robé nuée de blanc & de couleur de tuile en dessus, blanc nué d'incarnat en dessous, à stries longitudinales fines & serrées, à valve supérieure applatie, & inférieure un peu bombée, toutes les deux nacrées en dedans.

#### GENRE SECOND.

PEIGNES A OREILLES INÉGALES.

711. N grand Peigne d'Amérique, ponceau vers la tête, rouge-brun dans le corps, à stries longitudinales partie blanches, partie du fond, à grosses côtes comprenant chacune plusieurs de ces stries, & chargées en outre de tubercules disposés par zônes, qui dans la valve supérieure sont quelquesois en forme de tuiles arrondies, dentelées & relevées, à stries transversales très-sines & très-serrées, espéce que la ressemblance de sa couleur avec celle du corail, a fait nommer Coraline\*.

712. Une *Coraline* un peu moins grande & lett. F séba d'un rouge plus brun que la précédente.

lett. F. Séba, pl. 87.

713. Une autre de moyenne grandeur . a valve supérieure, d'un beau rouge-sanguin. II. FAM. PEIGNES. & inférieure couleur de rose vif \*. \* Séba, pl.

\$7. 11º . 3 8. 4.

714. Une autre à valve supérieure rougesanguin, teinte en quelques endroits de blanc & de rose séche, & à valve inférieure couleur de rose, blanche & aurore.

715. Une Coraline de moyenne grandeur. & tres - care en ce qu'elle est entiérement aurore.

716. Deux Peignes, dont un rare d'Amérique blanc en dehors, jonquille & violet en dedans, à neuf côtes dans la valve supérieure, & dix dans l'inférieure, chargées de tuiles plus ou moins recourbées en dessous, à oreilles trèsinégales chargées elles-mêmes de petites tuiles

\* Ibid. n°. espéce nommée Pélerine tuilée \* ; & un des 27. Indes, marbré en dehors par zônes ondées interrompues vers le haut, d'amaranthe & de blanc, bordé en dedans d'aurore & de cramoisi, à côtes longitudinales chargées, ainsi que les cannelures, de stries tuilées, nommé en Hol'ande Manteau Royal, & en France Man-

\* Arg. pl. 24. teau Ducal \*.

lett. I. 717. Un Manteau Ducal marbré en dehors Séba, pl. 87. de diverses belles nuances de rouge, de jaune nº. 8-12. & de blanc, presque entiérement jonquille pâle vers les bords, blanc bordé d'orangé en de-

dans, & grand dans cette espéce.

718.

718. Un Manteau Ducal plus grand que le précédent, dans la marbrure duquel n'entrent II. FAM. que le blanc & les plus belles nuances de rouge, Peignes. à bord intérieur couleur d'or, plus large que celui du précédent.

719. Un autre marbré en dehors par zônes ondées alternatives de rouge-brun & de blanc, teint dans les côtes de cerise pâle, & en dedans blanc teint de cramoisi, bordé d'orangé.

720. Un autre, dont le dessus est blanc tacheté de noir à la tête, marbré dans le reste de rouge de diverses nuances, de blanc & de noir, & dont le dedans est bordé d'aurore vif teint de cramoifi.

721. Un Peigne des Indes, à valve supérieure blanche, tachée par zônes d'orangé foncé, & inférieure blanche en entier, à groffes côtes longitudinales, chargées, ainsi que les cannelures, de stries fines en même sens, à oreilles peu inégales, & grand dans son espéce, nommé par quelques-uns Manteau Ducal blanc, & par d'autres la Gibeciere ou la Bourse \*.

722. Une Bourse, dont les taches sont oran-24. lett. gé, brunes & noires.

723. Un grand Peigne des Indes, rare, marbré en dehors de blanc, d'amaranthe & de lilas, teint en dedans des mêmes couleurs, à grosses stries & cannelures longitudinales, à

Tome I.

II. FAM.

oreilles fort inégales, & à la valve supérieure duquel adhére une belle *Crête de coq*.

724. Un Peigne des Indes, rare, ponceau nué d'aurore tant en dehors qu'en dedans, à stries longitudinales égales & un peu rabotteuses.

725. Idem.

726. Trois Peignes des Indes: sçavoir, deux Pétoncles rares, dont un marbré en dessus par larges zônes en zig-zag de brun & de blanc veiné vers la tête de bleu clair, à neuf côtes longitudinales, & à stries fines & serrées en même sens; l'autre à tête blanche veinée de rouge & de bleu clair, rouge-brun dans le reste, à cinq côtes peu saillantes chargées, ainsi que les cannelures, de stries sines en même sens \*; & un Manteau Ducal riche en couleurs.

# Gualt. tal

727. Trois autres: sçavoir, deux Pétoncles en pendant, marbrés par grandes taches de brun, de blanc & de rouge, mais du reste semblables au second de l'article présédent, & un très-beau Manteau Ducal.

728. Trois autres: sçavoir, deux Pétoncles de l'espéce des premiers de l'article 726, marbrés en dessus par zônes d'olive, de brun & de jaune de diverses nuances, jaunes en dessous; & un beau Manteau Ducal à tête blanche.
729. Trois Pétoncles peu communs: sça-

voir, un de la mer du Sud, rouge-fanguin nué d'aurore, & taché de blanc, femblable du II. Fam. refte à celui de l'article 724; & deux des côtes Pergnes. d'Espagne, à larges côtes peu nombreuses, marbrés en dessus, l'un de souci, de blanc & de brun, l'autre d'olive, de bleu clair & de gris, tous deux blancs en dessous \* Gualt. tab.

730. Six Pétoncles des côtes d'Espagne, à 74. litt. A. B. côtes peu s'aillantes, de couleurs & marbrures

très-variées.

731. Huit jolis Pétoncles par pendans, dont quatre des côtes d'Espagne; deux des Indes, à grandes taches blanches & rouge obscur; un Manteau Ducal marbré par zônes ondées de rouge-brun & de blanc, & un semblable d'un rouge plus vis.

732. Neuf Pétoncles: sçavoir, huit d'Espagne par pendans, dont deux nommés Brocatelle, à cause de leur belle marbrure blanche & rouge de diverses nuances dans l'un, rouge-sanguin, couleur de rose & aurore dans l'autre; & un Manteau Ducal.

733. Dix - huit Pétoncles d'Espagne, d'un beau cho x, & de couleurs très-variées, dont quelques-uns papyracés & transparens, d'autres à grosses côtes peu nombreuses, & le reste des espéces déja décrites.

634. Deux Pétoncles d'Amérique, peu communs, à grosses & petites stries longitudinales

un peu tuilées, à coque mince, lie de vin nuée II. FAM. de fauve & de fouci \*.

Peignes. \* 55ba, pl. 735. Dix Pétoncles de moyenne grandeur, & petits: sçavoir, quatre d'Amérique, de l'espéce des précédens, dont trois rouges un peu

\* Ibid.n°.13. marbrés de blanc sale \*, & un citron vif; quatre autres à stries longitudinales rudes au toucher, à tête blanche tachetée d'amaranthe, & le reste

\*Arg. pl. 24. ponceau \*; & deux des Indes, à petites côtes longitudinales, tuilées dans l'un, chagrinées dans l'autre; tous deux blancs tachetés d'orangé & de brun.

736. Deux Peignes des mers du Nord, papyracés, à stries longitudinales grosses & petites, à robe formée dans l'un de zônes aurore de diverses nuances, & dans l'autre de faisceaux alternatifs blancs & amaranthe clair; tous deux blancs nués de lilas endessous & vers le sommet.

737. Deux grands Peignes de l'espéce des précédens, dont les valves, quoiqu'affez semblables, ne sont point pareilles, & qu'il est très-rare de trouver complets; tous deux nués par zônes de couleurs très - vives, entr'autres d'incarnat, de couleur de rose, d'aurore, de

\* séba, pl. cerife, de violet & de ponceau \*.

738. Deux autres semblables, à quelques différences près dans les nuances.

739. Idem.

740. Vingt-quatre Pétoncles: sçavoir, vingtdeux de nos mers, du plus beau choix, qui par H. FAM. la richesse & la variété de leurs couleurs, ne cédent en rien à ceux des Indes, entr'autres un violet, un couleur de feu, deux blancs, un marbré de blanc & de couleur de rose, quatre de forme bizarre, qui leur vient d'avoir adhéré à d'autres Coquilles; deux tuilés, dont un marbré de jonquille & d'aurore, &c. \* & deux pe- \* Gualt. tab. tits Manteaux Ducaux.

74. lett. M-X.

741. Vingt-huit Pétoncles de nos mers, de couleurs très-belles & très-variées, dont deux grands chargés de tuyaux vermiculaires, & deux petits adhérans à deux valves d'Huitres d'espéce commune.

742. Quarante-cinq Pétoncles de nos mers, non moins variés, & non moins bien choisis que ceux de l'article précédent.

743. Deux Pétoncles rares : sçavoir, un de la Chine, à tête blanche tachée de brun, cerise vif dans le reste, de forme arrondie & bombée, à oreilles peu inégales, à stries & cannelures égales & bien prononcées; l'autre du Pérou, à valve supérieure marbrée de blanc, de couleur de chair, de jonquille & de brun, & inférieure blanche tachée en quelques endroits de brun, à oreilles très-petites, & du reste semblable au précédent.

744. Trois autres de même forme : sçavoir,

II. FAM. PEIGNES.

24. lett. E.

44. litt. D.

deux de S. Domingue, marbrés en dessus de blanc & de gris verdâtre, un peu tachés de fauve en dessous, & un de la Chine, semblable au premier de l'article précédent.

745. Cinq Peignes blancs de forme oblongue & évalée d'un côte, à très-petites oreilles inégales, & à valves un peu béantes au - dessous: sçavoir, deux des Indes, hérissés sur les stries de petites tuiles presque droites, qui leur ont \* Arg. pl. fait donner les noms de Rape ou de Ratissoire\*, & grands dans leur espéce; un de S. Domin-Rumph. tab. gue, à stries longitudinales fines & serrées, composées d'espéces de bâtons rompus qui se fuivent obliquement & régulièrement d'une strie à l'autre, & à une des oreilles retroussée d'un côté dans les deux valves, espéce nommée la Lime; un des mêmes parages, & semblable à cela près que les stries en sont plus fines . & les petits bâtons rompus plus contigus, variété que l'on nomme Lime douce; & un de la Barbade, à stries longitudinales peu serrées, de forme un peu renflée, & béant des deux côtés

\* Lift. tab, à la fois \*.

177. f. 14.



#### GENRE TROISIEME.

PEIGNES SANS OREILLES.

746. V N Peigne des Indes, blanc marbré par taches de brun, de jaune & de bleu, à côtes II. FAM. nombreules serrées l'une contre l'autre, arron-Plignes. dies & ficelées, à bords intérieurs applatis, de forme ronde & bombée, nommé Pétoncle sans oreilles, & grand dans sen espéce \*.

747. Cinq Pétoncles sans oreilles: sçavoir, List. B. deux d'Amérique en pendant, jonquille poin-f. 73. tillés de brun; un petit des Indes, nué de blanc & de couleur de rose, taché & pointillé de brun; & deux de la variété de celui de l'article précédent.



### TROISIEME FAMILLE.

CAMES.

III. FAM CAMES. CES Coquilles différent des Huitres par l'uniformité constante de leurs deux valves, & des Peignes, en ce qu'elles n'ont point d'oreilles. Leurs caracteres généraux sont d'avoir les deux valves égales, convexes & parsaitement semblables. Nous les diviserons ici, d'après le contour commun des bases de leurs valves, en quatre genres; sçavoir,

- 1°. Les Cames à bases rondes régulieres, qui sont les vrais Cames.
- 2°. Les Cames à bases rondes irrégulieres par quelque pli ou sinuosité.
- 3°. Les Cames à bases ovales régulieres, nommées vulgairement Palourdes.
- 4°. Les Cames à bases ovales irrégulieres, dont un des bords est ondé & comme replié, nommées aussi Lavignons.

#### GENRE PREMIER.

CAMES A BASES RONDES RÉGULIERES.

748. DEUX grandes Cames de S. Domingue, dont une blanche nuée de couleur de III. FAM. chair, & réticulée en dehors, citron clair, bordée de couleur de rose en dedans, & à charniere formée dans l'une des valves, de deux grosses dents fort proches l'une de l'autre, & de trois cavités qui reçoivent les trois dents correspondantes de l'autre valve, nommée le Rézeau blanc; & une de même espéce, mais polie, & devenue par-làblanche, rayée dans le bas, & par zônes de couleur de rose \*.

749. Deux Rézeaux blancs, l'un nué de ci-77. litt. A. Adanson, pl. tron en dehors, citron en dedans; l'autre poli, 16. fig. 3. & devenu citron bordé de trois zônes couleur de rose en dehors, & d'une seulement en dedans.

\* Gualt, tab.

750. Deux Rézeaux blancs, l'un teint de rouge en dehors, bordé de rouge en dedans, l'autre poli & devenu citron, bordé de couleur de rose tant en dedans qu'en dehors.

751. Trois Rézeaux blancs un peu moins grands, dont un teint vers la tête de citron, &

deux polis, l'un à deux zônes couleur de rose près des bords, l'autre à une seulement. III. FAM. CAMES.

752. Deux grandes Cames de même espèce polies, & en pendant.

753. Une autre très - belle, polie, blanche teinte de citron, ornée dans toute sa robe de plusieurs zônes rouges de diverses nuances en dehors, citron bordé de cerise vif en dedans.

754. Une Came de même espéce, très-grande, & du plus bel éclat, citron vif, ornée sur les bords près de la tête, de deux flammes cerise en dehors, & citron clair en dedans.

755. Trois Cames polies, dont une des Indes très - grande & peu commune, mais un peu fruste, blanche, de forme très-bombée, à charniere formée dans l'une des valves de trois grosses dents sous les sommets, & de deux latérales, s'engrainant dans autant de cavités correspondantes de l'autre valve; & deux de l'espéce des précédentes, dont une citron en entier.

756. Idem.

757. Trois Cames d'Amérique: sçavoir, une de la Jamaique, peu commune, blanche, de forme applatie, à stries circulaires très-fines, & à charniere composée de quatre dents dans \* Lift. tab. l'une & l'autre valve \*; & deux de S. Domin-

288. fig. 124. Gualt. tab. 76. gue, polies, de l'espéce des précédentes.

758. Six Cames par pendans: sçavoir, deux litt. F. Adanf. Hift. du Sénég. pl. de la Méditerranée, blanches, flambées par 16. fig. 5.

zônes de canelle foncé, à charniere comme celle des Peignes sans oreilles, & nommées Fu- III. FAM. ries \*; deux blanches, teintes de jaune vers la tête, à rayons peu prononcés couleur de rose, 2. nº. 60 & à stries circulaires fines & égales en dehors, Gualt. tab.72. blanc teint de citron en dedans, & à charn'ere Adant. Hift. composée de trois dents dont une latérale dans f. 19. une des valves, & de deux dans l'autre \*; & deux de S. Domingue, polies, de l'espéce des 299. f. 136. précédentes.

du Sén. pl. 18.

\* Lift. tab;

750. Deux Cames des Indes, très - rares, l'une marron foncé, de forme bombée, à stries fines longitudinales canelle, à bords dentelés en dedans, & à charniere comme les premieres de l'article précédent, espéce nommée en Hollande l'Eventail des Mennonités; & une plus petite, qui n'en différe que par sa couleur moins foncée, & deux grandes taches latérales blanches rayées par traits fins en zig-zag jonquille. Cette derniere a beaucoup de ressemblance avec l'Orpheline dont parle M. d'Argenville dans son appendice \*, & qu'il range parmi les Peignes fans oreilles.

pl. 3. lett. C.

760. Sept Cames : sçavoir, une de la Méditerranée, gris de lin nué de fauve foncé, à stries circulaires & longitudinales très-fines, à bords dentelés en dedans, & à charniere comme celle des premieres de l'article 758. Cette Coquille est aussi rare à trouver dans la mer, CAMES.

qu'elle est commune fossile; deux des Indes . de forme applatie, blanches marbrées en zig-zag d'orangé - brun, à stries fines circulaires, à charniere formée de trois petites dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, nom-

\* Arg. pl. mées le Point d'Hongrie \*; deux de forme Rumph. tab. moins applatie, ventre de biche, à un large \* Lift. tab. rayon blanc fur le milieu du corps \*; une en-292, fig. 128. core plus bombée, blanche, à grandes taches circulaires rougeâtres, interrompues dans cha-\* Ibid. tab. que valve par deux rayons du fond \* , & une

295. fig. 131. petite blanche & platte, à stries fines longitu-

\* Ibid. tab. dinales tuilées \*.

511. f. 147.

761. Huit Cames, dont fix par pendans: sçavoir, une rare des Indes, violette, nuée par zônes & par rayons longitudinaux de blanc tant en dedans qu'en dehors, à stries fines circulaires, à charniere formée dans une des valves de deux grosses dents, avec deux cavités sur les côtés, & une troisieme entr'elles, qui reçoivent les trois dents de l'autre valve: deux petites d'Amérique, peu communes, blanches, \* Ibid. tab. à stries fines onduleuses bien prononcées \*:

301. f. 142.

quatre petites de la Jamaique, à zônes rouges de diverses nuances tant au dedans qu'au dehors, & à stries onduleuses fines & serrées \*; & une des Indes, de l'espéce de la premiere

\* Ibid. tab. 539. £. 176.

de l'article 757. 762. Six Cames de forme très-bombée, & à coque épaisse : sçavoir, deux d'Amérique, blanc fale, à quatre flammes longitudinales fau- III. FAM. ves, à stries transversales nombreuses, minces CAMES. & ridées, laissant entr'elles de profondes cannelures, & à charnière comme celle de la premiere de l'article précédent, espéce nommée Clonisse \*; deux Clonisses de la Méditerranée, \* List. tal. qui différent de celle-ci en ce que les stries en 285. fig. 123. Adant. pl. 166 sont plus arrondies, traversées vers les côtés f. 1. d'autres cannelures, qui les rendent en cet endroit comme ficelées, & en ce que la robe en est couverte de petites marbrures très-fines en zigzag fauve-roux \*; & deux de même espéce, dépouillées de leurs stries.

284. f. 122. Gualt. tab.75.

763. Six groffes Cames par pendans : fça-litt. H. voir, deux du Sénégal, fauves, revêtues d'un épiderme noir, à stries ou rides circulaires trèsfines, & à charniere formée dans chaque valve de quatre dents: c'est le Pitar de M. Adanson, mais du double plus grand que celui dont parle l'Auteur \*; quatre de la Méditerranée, dont \* Hist. du deux couleur de tuile, à coque épaisse, à char-sénég. pl. 16. niere comme celle des Peignes sans oreilles, & List. tab. 272. à rézeau très-fin, revêtu dans l'une & dans l'autre d'un drap marin, qui imite le velours \*; \* Gualt. tab. & deux lisses fauve foncé, rayonnées de fauve 73. litt. A. Bonan. cl. 2. clair, à charniere composée de trois dents f. 80. dans chaque valve \*.

764. Quatre belles Cames des Indes, de 86. litt. A.

III. FAM. CAMES.

82. litt. H.

£. 98.

forme bombée, dont deux blanches marbrées en quelques endroits de violet pâle, & par larges traits en zig-zag de brun obscur, à stries circulaires très-fines, & à charniere composée dans l'une des valves, de trois dents, & de 1 \* Gualt, tab. quatre dans l'autre \*; une de même espéce, peu 82. litt. H.
Lift, tab. 262, commune en ce que les traits en zig-zag y sont orangé; & une fauve foncé rayonnée de marron de diverses nuances en dessus, citron, bordée de blanc en dedans, & à charniere

\* 1 \* 1 bid. tab. comme dans la premiere de l'article 757 \*. 251. f. 85. Gualt, tab. 71. Litt. C.

765. Huit autres de mêmes forme & charniere: fcavoir, denx blanches, à rayons formés de traits & de taches triangulaires rouge-brun. imitant des caracleres, & à stries circulaires \* Lift. tab. très-fines \*; deux blanches ornées par zônes 257. 1. 92. Gualt. tab.82. fines & serrées de traits en zig-zag canelle soncé.

257. f. 92. lirr. G.

à stries fines transversales, & jaune d'or en de-\* Ibid. tab. dans \*; deux blanches rayonnées de canelle clair; & deux de la variété des premieres de l'article précédent.

75. litt. O.

766. Six autres: scavoir, deux blanches, à rayons formés de taches & de traits fauvenoirâtre, & à stries circulaires bien prononcées; une blanche marbrée de taches & de chevrons fauve-roux, à stries circulaires plus fines, à charnière comme les précédentes \*; une des Indes, peu commune, polie, blanche teinte vers les bords, en partie de rouge pâle, & en

\* Lift. tab. 258. f. 94. Valent, biy, fig. 16.

partie de bleu tant en dehors qu'en dedans, & s à charniere comme celle de l'article 148; une blanche bariolée de traits pourpres for-CAMES. mant un rézeau à taches triangulaires du fond 2; 86. nº. 18. & une de l'espéce des premieres de l'article List. tab. 2711 précédent.

Ibid, tah.

259. f. 95.

#### GENRE SECOND.

CAMES A BASES RONDES IRRÉGULIERES.

767. DEUX grandes Cames des Indes, blanches, marbrées par grandes taches, & rayonnées de fauve brun, de forme bombée, à stries longitudinales & transversales, celles-ci plus faillantes, les autres plus fines formant un réfeau celluleux, à charniere composée dans chaque valve de trois grosses dents, & à valves garnies de deux lévres latérales fe recouvrant l'une l'autre, espéce nommée en Hollande le Rayon de miel \*.

768. Deux grands Rayons de miel de Saint-336.f. 173. Domingue, blanc fauve, à stries transversales très-saillantes, & en vive arrête, & du reste semblables aux précédens \*.

769. Deux Cames de Bengale, blanches, tab. 42. lit. F. ornées de traits fauves en zig-zag, réticulées, f. 178.

III. FAM. CAMES.

granuleuses, à charniere souci, composée dans l'une des valves de trois dents, & de deux dans l'autre, & à lévres latérales se recouvrant plus \* Lift tab. exactement que dans l'espèce précédente \*.

335 . f. 172.

770. Six Cames d'Amérique & par pendans: sçavoir, deux blanches, à coque épaisse, de forme presque sphérique, à stries & fascies circulaires peu prononcées, à double finuofité vers les bords de chaque valve, & à charniere formée de trois dents dans l'une des valves, & de quatre dans l'autre : c'est la Jamaique de M. \*Arg. pl. 21. d'Argenville \*; deux femblables, polies, d'un bel éclat, & nommées Billes d'yvoire; deux List. 12b. 305. f. 138. peu différentes des précédentes, quant aux plis latéraux des deux valves, mais de forme applatie, jaune clair en dehors, & souci en dedans, à charniere composée de trois dents dans l'une des valves, s'engrainant dans trois cavités correspondantes, l'une à stries circulaires fines & lamelleuses, l'autre dépouillée & polie : on les

\* Ibid. tab. 300. f. 137.

nomme Abricots\*.

771. Six autres ; sçavoir , deux blanches en dehors, jonquille en dedans, de forme bombée, à stries circulaires très-fines, & fascies peu marquées, à deux sinuosités de chaque côté des sommers, & à charniere formée d'un très-petit filet transversal se logeant dans une rainure correspondante \*; deux de l'espéce des premieres de l'article précédent, mais dans l'étar où elles

\* Ibib. tab. 260. f. 96.

ont

ont été tirées de la mer : leurs firies font fines & lame leuses; & deux Abricois, dont un peu III. FAM. commun, en ce qu'il est blanc, & l'autre poli CAMES. de la variété des précédens:

772. Huit autres; sça oir, deux peu communes, dont une blanche nuée d'amaranthe clair, & une blanche nuée de jaune, toutes deux papyracées, à stries fines transversales, serrées & peu marquées, & longitudinales fines aussi, mais plus distantes & mieux prononcées, à valves s'avançant & se relevant d'un côté, ce qui rend la Coquille béante en cet endroit où les bords sont dentelés, & à charniere composée dans l'une des valves de trois dents, dont une petite sous le sommet, & deux minces latérales s'engrainant dans les cavités correspondantes de l'autre valve; une de la Jamaique, blanche & lisse, à valves prolongées d'un côté, mais jointes exactement, & à charniere formée de trois dents dans les deux valves \*; une des Indes, blanche, de forme peu renssée, ornée 274. f. 110. d'un compartiment très-serré de petites tuiles de champ, à sinuosité dans un des bords latéraux de chaque valve, à charniere composée de deux dents latérales, & d'une sous les sommets dans chaque valve, nommée Guillochée\*, \* Gualt. tab. & grande dans cette espéce; deux petites ver- 76. litt. E List. tab. 302. tes, à bords finueux & à stries circulaires la-fig. 143.

Tome I.

### 338 COQUILLES BIVALVES

melleuses \*; & deux de l'espéce des premieres des articles 770 & 771.

III. FAM. CAMES. \* Gualt. tab. 77. litt. Q.

£91. f. 234.

773. Cinq Cames à bords finueux d'un côté; fçavoir, deux des côtes de Normandie, blanches, teintes légérement de citron, tant au dehors qu'en dedans, à stries & fascies transversales très-fines, & à charniere formée de trois dents dans l'une des valves, & de quatre dans l'autre\*; deux Guillochées tachées de sauve, & un Rayon de miel de la variété de ceux de l'article 767.



## GENRE TROISIÉME.

CAMES A BASES OVALES RÉGULIERES.

774. UNE grande & belle Came des Indes, peu com : une, blanc' e marbrée dans les deux III. FAM. tiers de chaque valve d'un beau violet, polie, CAMES. & à charnière formée de trois grosses dents sous les sommets, & d'une quatrieme latérale \*. Séba, pl.

775. Une Came des Indes, rare, marbrée 86. nº. 150 par grandes zônes de fauve, de couleur de chair & d'aurore, à rayons longitudinaux de nuences plus foncées que le fond de brun & de marron, interrompus en quelques endroits de blanc, à firies larges & applaties, à charnière comme celle qui a été décrite dans l'article 748, & très - grande dans son espèce, nommée Cedo 2771.117 \*

tift, tabe

776. Une belle Came des Indes, blanche, à stries longitudinales & transversales, celles-ci un peu ondée & formant avec les autres un rézeau granuleux vers la tête & les côtés, à bords épais, taillés en biseau, & très-finement dentelés, à charniere formée de deux dents dans chaque valve, & grande dans son espéce, \* Arg. pl.21. nommée la Tricotée ou la Corbeille \*.

Gual, tab. 75.

III. FAM. CAMPE.

777. Deux belles Cames un peu moins grandes que les précédentes; sçavoir, un Cedo nulli de couleurs très-vives, & une Corbeille teinte fur les côrés de couleur de rose.

778. Six Cames par pendans; sçavoir, deux du Brésil, lisses, couleur de chair, ornées de taches fauve brun, quarrées dans l'une, & en zig-zag imitant le point d'Hongrie dans l'autre, à charniere composée de trois dents dans cha-

86. litt. I. List. 1ab. 270. f. 106,

\* Gualt, tab. que valve, & nommées Cames truitées \*; deux des mêmes mers, de forme applatie, à zig-zags plus nombreux, diversement entrelacés, de couleur violette sur un fond blanc-jaunâtre, à stries plattes circulaires, à bords très-finement dentelés, & à une grande tache violette au dedans de chaque valve, espéce nommée le Zigzag \*; & deux blanches marbrées vers la tête & l'un des côtés de fauve brun, à groffes stries longitudinales granuleuses, & comme ficelées. devenant obliques vers le côté finueux, à charniere de quatre dents dans chaque valve, ef-

\* Arg. App. pl. 3. lett B. Lift. tab. 378. f. 221.

\* Arg. pl. 21. péce nommée Came-feuille ou l'Amande \*. lett. P. 779. Trois autres, sçavoir, une Corbeille List. tab. 312, teinte en dedans de citron, & deux Cedo nulli fig. 148. Gualt tab. 75.

en pendant. lit. A.

> 780. Quatre Cames des Indes; scavoir, une blanche à deux larges faisceaux de taches gris de lin, à cinq fascies circulaires peu prononcées, & peinte en dedans par les Chinois, pour servir

à un de leurs jeux, dans lequel il s'agit d'apparier, avec le plus de promptitude, les deux val- III. FAN. ves d'une même Coquille, mêlées à dessein C avec celles d'un grand nombre d'autres; deux Cames - feuilles marbrées presque entiérement de fauve roux, & teintes de bleu aux sommets; & une Came truitée: toutes, à l'exception d'une des Cames-feuilles, sont grandes dans leur espéce.

781. Cing Cames des Indes; sçavoir, une peu commune, fauve nué de gris, à un perit nombre de rayons étroits d'une nuance plus foncée, à stries circulaires égales & applaties comme dans le Cedo nulli, mais moins larges & à charnière formée de quatre dents dans les deux valves; deux à peu près semblables & de même fond, mais ornées de petits chevrons gris-verdâtre plus prononcés dans quatre rayons & vers le bas que dans le reste, & à charnière composée dans l'une des valves de trois petites dents, & de deux dans l'autre; & deux petites Cames-feuilles blanches.

782. Vingt-quatre petites Cames des Indes; sçavoir, dix-sept lisses & du brillant de l'agathe, de marbrure & couleurs fort variées, à rayons plus ou moins prononcés & de forme bombée, connues sous le nom général de Cames luisantes \*; deux Zig-zags de la variété de l'article 778; trois autres qui n'en différent qu'en 379. fig. 222,

\* Lift. tab.

III. FAM.

CANELS. 1 Lift. tab. 380. f. 223. Rumph, tab. 41. litt M. 2 Ibid. list. L. 86. lite B.

\* Lift, tab. 429. f. 2-3.

ce qu'ils sont lisses & à traits ca elle plus fins & plus nombreux 1; & deux Rayonnées 2.

783. Neuf Cames d'Amérique, scavoir, deux blanches nuées de citron & de violet 3: deux rayon ées de blanc & de violet 4: une à Gualt, 12b. failceaux alternatifs des mêmes couleurs : deux blanches à tête cerise nuées plus bes de couleur de rose, toutes les sept à stries longitudinales bien prononcées, & à stries fines circulaires formant, sur-tout vers les bords, un rézeau granuleux, à valves un peu béantes dans l'un des côtés, & à charniere composée dans l'une & l'autre valve de deux dents : une blanche à trois zônes couleur de rose, à stries longitudinales ondées, plus grosses que celles des précédentes, & à charnière formée d'une seule dent dans l'une des valves, & de deux dans l'autre; une de l'estéce des deux premieres de cet article. mais polie & blanche, bordée de violet; & une des Indes, qui ne différe des troisieme & quatrieme de cet article, qu'en ce qu'elle est plus grande & nuée de jaunâtre.

784. Douze Cames par pendans; sçavoir, dix de la Méditerranée, dont deux à stries longitudinales & transversales très-fines, marbrées & rayonnées de brun & de gris de lin, sur un fond blanc 5; deux peu différentes pour les couleurs, mais à fimples sfries circulaires applaties comme dans le Cedo nulli ; deux gris de lin,

Gual, tab. \$2. litt. H.

rayonnées de blanc, à stries circulaires trèsfines; deux à stries semblables, ornées d'un des- III. FAM. fein canelle en rézeau; deux autres à robe par-CAMES. tie blanche, chargée de traits fauves en zig-zag très-déliés, & partie marbrée par grandes taches de gris de lin, toutes à charniere formée de trois dents dans l'une & l'autre valve; & deux Cames violettes polies de l'espéce de celles de l'article précédent.

785. Deux grandes Cames des côtes de Bretagne, rayonnées de blanc & de sauve de diverses nuances, à coque mince, & à charnière composée dans l'une des valves d'un chevron fous le fommet, & de deux lames latérales qui se logent sous un chevron semblable, & entre quatre lames correspondantes de l'autre valve.

786. Douze Cames des mêmes parages, grandes & de moyenne grandeur; sçavoir, une blanche à une large zône verte près des bords. & une petite de même couleur sur les bords mêmes; une blanche à trois zônes souci, & à stries circulaires inégales; deux blanc sale à fascies circulaires inégales & peu prononcées; deux nuées de fauve & de gris; une blanche rayonnée de fauve, à tête & intérieur nué de violet \*; une blanche à zônes fauves peu prononcées; deux 387. f. 230. entiérement blanches, & deux de la variété de celles de l'article précédent, dont une blanche

en entier, toutes à charniere à peu près semblable à celle qui est décrite dans le même article. CAMES.

# GENRE QUATRIEME.

CAMES A BASES OVALES IRRÉGULIERES.

787. INE grande Came des Indes, à stries transversales fines & applaties, ornées d'un desfein de traits en zig-zag violet-noir, qui fe croifent diversement l'un l'autre, & forment plusieurs lozanges sur un fond blanc, à charnière composée de trois dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, espéce que l'on nomme

\* Arg. pl. 21, en France Ecriture Arabique ou Chinoise \*, &

lett. A. List. tab. 402, en Hollande la Natte de jonc.

fig. 246. 788. Une Ecriture Chincise de même gran-Gualt. tab. 86. deur & de même fond, mais peu commune en lict. F. Valenyn, biv. ce que la marbrure brune y est jettée partie par fig. 13. grandes taches, partie par chevrons, dont

\* Ibid. f. 10. que ques-uns se réunissent en zig-zags \*.

789. Une autre dissé, ente des précédentes. en ce qu'on n'y remarque aucun zig-zag, mais seulement de grandes taches noisette sur un \* Ibid. f. 7. fond paille \*.

790. Deux Ecritures Chinoises de moyenne

grandeur, l'une tenant à la fois des deux variétés décrites aux articles 787 & 788; & l'autre à III. Fam. zig - zags jettés par zônes, & à taches par faif- CAMES. ceaux de rayons.

701. Trois Cames rares: scavoir, une marron clair de la forme d'une amande revêrue encore de sa coque, à robe en rézeau granuleux, sur laquelle on remarque d'espace en espace des stries ou suites longitudinales de grains, plus élevées que les autres, & d'où naissent vers le bas des franges ou plumaceaux de petites feuilles flexibles; Coquille que l'on peut nommer l'Amande à cils, & dont Séba regardoit la pareille qu'il possédoit, comme unique \*; une \* séba, pl. des Indes, marbrée de jaune, de marron & 88. nº. 13. de brun-noirâtre, à l'exception d'une avance sin tab.6. f.x. vers la tête, qui est blanche, à stries longitudinales, à bords dentelés, & à charnière formée dans l'une des valves, de deux dents, dont une latérale & très-longue, lesquelles s'engrainent dans une cavité & une rainure correspondante de l'autre valve \*; & une fauve clair à rayons \* valent. bid'une nuance plus obscure, mais peu pronon-val. f. 27. cés, & semblable pour les stries, la forme & la charniere à l'Ecriture Chinoise \*. \* 1bid. f. 18.

792. Deux autres, dont une comme la feconde de l'article précédent, mais polie, & d'un grand volume pour son espèce; & l'autre comme la derniere du même article.

III. FAM. CAMES.

793. Huit Cames: sçavoir, fix petites des parages Magellaniques, rares, & parpendans, dont deux jongu lle, deux soufre, & deux olive. toutes de forme oblongue bombée, ressemblante à celle d'une petite féve. & nommées d' là Féverolles, & deux Ecritures Chinoises de moyenne grandeur, l'une de la variété de celles de l'article 787, & l'autre de la variété de la seconde de l'article 790.

794. Quatre Cames des Indes: sçavoir, une rare, blanche papyracée, à stries transversales très-fines & inégales, à grosse côte en forme de pli à l'un des côtés de chaque valve, mieux marquée dans l'une que dans l'autre, & à un fecond p'i moins sensible dans l'autre côté, ce qui donne à la Coquille une forme un peu tor-

405. f. 252.

\* Lift, tab, tueuse \*; deux blanches à tête couleur de rose vif, & rayons de même coaleur peu prononcés, à robe en rezeau fin, granuleux imitant le chagrin, à un large pli dans l'un des côtés de chaque valve, & à charniere formée de trois petites dents, dont une latérale, espéce nommée la Chagrinée ou le Chagrin, & par Rumphius la

\*Rumph.tab. Langue de chat \*; & une blanche de même 45. litt. G. litt. B.

Gualt tab 76. forme aussi rayonnée, mais à stries circulaires inégales & très-fines, & nullement granuleuses \*, \* Rumph.

22b. 45. litt. I. nommée simplement la Langue.

795. Quatre Cames par pendans: sçavoir, deux des parages Magellaniques, peu communes, blanc mat, à stries circulaires serrées, minces & tranchantes, à coque épaisse, & à III. FAM. charniere formée de trois dents dans une des CAMES. valves, & de deux dans l'autre; & deux Langues différentes des dernieres de l'article précédent, en ce qu'elles sont papyracées & entiérement blanches.



# QUATRIEME FAMILLE.

C Œ U R S.

IV. FAM.

- Les Coquilles ne différent des Cames qu'en ce que leurs deux faces latérales, ou tout au moins l'une de ces faces, représentent assez exactement la figure d'un Cœur. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,
- 1°. Celles dont les faces latérales représentent toutes deux à la fois, quand la Coquille est fermée, des cœurs bien formés, & dont les sommets sont fort près l'un de l'autre: on les peut nommer Cœurs proprement dits.
- 2°. Celles dont les faces latérales représentent toutes deux à la fois, quand la Coquille est fermée, la forme de cœurs, & dont les sommets, fort écartés l'un de l'autre, laissent entr'eux un espace rhombe ou lozange nommé Carenne; genre qui comprend les Arches.

3°. Celles dont une seule des faces VI. FAM. latérales représente bien un cœur, lors- Cœurs. que la Coquille est fermée, & que l'on distingue par les noms de Cames tronquées ou de Conques de Vénus.

### GENRE PREMIER.

CŒURS PROPREMENT DITS.

796. N Cœur des Indes, blanc & papyracé, à valves pliées chacune en demi-cœur applati, renslées vers le milieu, & montrant par leur réunion un cœur de forme très - élégante, garni de petites pointes dans tout son contour, à stries longitudinales granuleuses, courbées sur chaque face, à sommet se croisant un peu, & à charniere composée dans l'une & l'autre valve, de trois petites dents, espéce nommée Cœur de Vénus \*.

\*Arg. pl. 23:

797. Un très-grand Cœur de Vènus, blanc lett. I.
nué d'incarnat, ayant un côté de ses faces con-43. litt. E.
List. tab., 318.
cave, à une petite élévation près sous les f. 155
sommets, qui se croisent encore plus que dans litt. B. C. D.
le précédent, & à contour dépourvu de piquans, variété qu'on désigne par le nom de
Cœur de Vènus en bateau \*.

\*Arg. pl. 23:

let. D.

IV. FAM. CONTRS.

798. Un Cœur de Venus rare en e que l'ine de ses faces est ornée de petites fascies blanches & couleur de rose, suivant la direction des stries; le contour de ses valves est sans pointes comme dans le précédent.

799. Un Cœur de Venus en bateau, d'un beau couleur de rose, à la sommité près de la

partie convexe qui est blanche.

800. Un Cœur de Vénus peu commun, ponctué dans sa face convexe de couleur de rose, & bordé dans l'autre de petits traits de même couleur, à deux échancrures vers le bas, & à côtes destituées de piquans.

801. Un Cœur de Venus en bateau ; dont le centre de la face concave est beaucoup plus élevé que dans les précédens, moucheté d'un côté & rayé de l'autre de gros traits onduleux fauvejaune, & légérement dentelé dans son contour.

802. Trois Cœurs de Venus: sçavoir, deux de moyenne grandeur, dont un blanc, à côtes chargées de pointes, un couleur de rose, à côtes dépourvues de pointes, mais garnies l'une & l'autre de deux petites échancrures paralleles; & un Cœur en bateau blanc.

803. Un Cœur du Sénégal, grand, mince, & de forme presque sphérique, blanc tant au dedans qu'au dehors, excepté sept à huit larges cannelures qui sont canelle foncé, à côtes formées chacune de trois stries, dont celle du milieu est mince, élevée en vive arrête, & creu- IV. FAM. se intérieur ment en sorme de tuyau, à bords Cours. dentelés, la fant entr'eux un jour affez grand quand la Coqu'lle est fermée, & à charnière composée dans l'une & l'autre valve de deux dents sous les sommets, & d'une très-grande latérale. Cette Coquille, nommée Conque exotique, est très-rare à trouver complette comme celle-ci, dont les deux valves ont certainement appartenu au même Coquillage: c'est le Kaman de M. Adanson \*.

804. Une autre Conque exotique plus grande, pl. 18. f. 2. & à valves bien afforties quoique dépareillées. lett. A.

805. Un très-grand Cœur de la baie de Cam- 48. 11 . 6. pêche, peu commun, blanc sale, taché de litt. D. rouge pâle en dehors, & de pourpre en dedans, à stries longitudinales bien prononcées, chargées en quelques endroits d'anneaux minces , à charnière formée dans l'une des valves de trois dents s'engrainant dans trois cavités de l'autre valve, & à faces latérales représentant des cœurs inégaux ; le plus grand des deux est teint de rougeâtre, & le mieux formé \*.

\* Adanfon ; Arg. pl. 23. Rumph. tab.

\* Lift. tab.

806. Un Cœur de l'espéce du précédent, 328. fig. 165. mais un peu moins grand, & dont le fond est jaune pâle.

807. Un Cœur rare de Carthagene d'Amérique, fauve, excepté vers les bords qui sont blancs, à grosses stries longitudinales comme IV. FAM. ficelées, de forme allongée d'un côté, & à Cœurs. charniere comme celle de la seconde Coquille

\* Séba, pl. de l'article 791 \*.

808. Un grand Cœur des mêmes parages, peu commun, blanc teint en quelques endroits de pourpre, de forme un peu oblongue de la tête aux bords, à stries arrondies chargées d'anneaux minces & peu saillans, bordé de pourpre en dedans, & à charniere composée dans l'une

\*Ibid. no. 2. & l'autre valve, de quatre dents \*.

809. Trois Cœurs, dont un qui ne différe du précédent, qu'en ce qu'il est marbré en dehors de blanc & d'orangé, bordé en dedans de ci-

\* List. trab. tron , & de forme encore plus oblongue \* ; & deux de S. Domingue , jaune pâle , nués de couleur de rose & de blanc , à stries longitudi-

\* Ibid. tab. nales hérissées de petites pointes \*.

226. f. 163.

810. Trois autres, dont un de Carthagene, à trois zônes amaranthe clair, la derniere formant une bordure qui s'étend en dedans, & y devient plus foncée, & à valves un peu béantes des deux côtés \*; un de l'espéce du premier de

\*séba, pl. des deux côtés \*; un de l'espéce du premier de l'article précédent, mais plus petit; & un comme les derniers du même article.

> 811. Deux Cœurs de la Jamaique, blancs teints de fauve, & tachés en quelques endroits de pourpre clair en dehors, & de rouge pâle en dedans, à stries longitudinales, chargées

dans

dans toute leur étendue & à distances égales, de petites ruiles, à charnière comme les prérédens, & nommés Cœurs de bœuf milés, tous deux de la plus parsaite conservation \*. \*Arg. pl. 236

812. Deux Cœurs de la Jamaïque; blancs, à Lift. tab. 3237 grosses stries chargées d'anneaux cerise, finissant f. 160. par de prosondes dentelures, à côtés inégaux, dont le plus allongé représente le mieux un cœur, & grands dans leur espèce nommée la Fraize\*.

\* Lift. tab? 813. Six cœurs par pendans : sçavoir, deux 316. fig. 152. Fraizes à stries plus fines, chargées d'anneaux litt. A. Bonan, cl. 32 jonquille très-serrés, excepté vers les sommets f. 375. qui font blancs & dépourvus d'anneaux, nommées Fraizes blanches \*; deux petits blancs des \* Lift. tab: Indes, à stries ficelées & cannelures piquetées, 315. f. 1526 à valves composées de trois faces, dont une applatie, & nommés Cœurs triangulaires ou Cours en soufflet \*; & deux d'Amérique, blancs \* Guale cab. marbrés l'un de fauve, l'autre de jaune & de 38. lit. C. rouge-brun, à stries longitudinales bien pro- 44. litt. H. noncées, de forme plus courte & plus bombée, mais d'ailleurs affez ressemblante à celle des précédens, nommés en France Caur de pigeon, & en Amérique Cœur de l'homme \*. \* Bonani. cl:

814. Quatre autres par pendans, dont deux Cœurs triangulaires, grands dans leur espéce, & deux Cœurs de S. Domingue, blancs nués

Tome I.

d'aurore & de jonquille, de l'espéce des der-IV. FAM. niers de l'article 809.

815. Six Cœurs des Indes, peu communs: fçavoir, un oblong de la tête aux bords, blanc, à grosses stries longitudinales ornées de petits chevrons bruns, à une avance latérale près des sommets, & à charniere comme celle de la seconde Coquille de l'article 791, espéce

\* List. tab. nommée le Cœur allongé \*; un fauve-roux de 347. f. 184. forme encore plus allongée , à grosses stries \* Ibid. f. 185. longitudinales un peu tuilées \* , un de même \* Gualt. tab. espèce partie blanc & partie gris \* ; un petit blanc à stries fines longitudinales & rides ondu\* Ibid. litt. leuses feuilletées transversales \* ; un blanc marbré de fauve-roux , de forme moins sinueuse & moins allongée que les précédens , à grosses stries longitudinales , chargées d'autres trans-

\*List. tab. comme les quatre premiers de cet article \*; & 348. f. 186. un petit Cœur souci, à stries fines longitudinaval. f. 30. les, & à charniere formée de trois dents dans l'une des valves, qui s'engrainent dans trois ca-

vités correspondantes.

816. Deux grands Cœurs de la Méditerranée, fauves à la tête, marron foncé dans le reste, à larges sascies circulaires peu prononcées, à sommets, contre l'ordinaire des Coquilles de ce genre, écartés, recourbés en sens

versales en forme d'anneaux, & à charniere

contraire l'un à l'autre, & bleus en cet endroit, à charniere formée dans les deux valves, de IV. FAM. trois larges dents, dont une latérale, espéce Corurs. nommée en France Boucarde ou Cœur de bœuf, & en Hollande Bonnet de fou \*.

817. Deux grands Cœurs de la même mer: 86, n°. 1. fçavoir, un fauve nué de blanc & de bleu pâle, litt. E. de forme très-bombée, à groffes stries longitu-f. 111. dinales hérissées de pointes plus ou moins longues, à charniere composée de cinq dents dans l'une des valves, & de quatre dans l'autre, & nommé Caur de baufépineux\*; & l'autre fauve- \* Arg. pl. 23. roux, à stries moins grosses, plus serrées & plus séba, pl. 86. chargées de pointes que le précédent, espèce nº.4. nommée simplement Cœur épineux \*.

818. Les mêmes Coquilles un peu moins 86. nº. 3. grandes.

819. Six grands Cœurs de la Méditerranée: scavoir, deux blancs, à groffes stries & larges cannelures longitudinales, à stries transversales onduleuses très-fines en forme de rides, dans l'un desquels les grosses stries sont chargées surtout vers le bas, de quelques tuiles ou mammelons \* ; deux qui n'en différent qu'en ce qu'ils \* Bonan. cl. font rayés par zônes inégales de blanc, de fauve 2. f. 97. & de rouge-brun, & sans tuiles \*, tous à char- \* séba, pl. niere comme les précédens; un Cœur de bœuf 86. nº. 7. épineux, & un Bonnet de fou.

820. Huit Cœurs de moyenne grandeur, litt. M. Gualt. tab. 71. 356 COQUILLES BIVALVES

des espéces décrites dans les articles 809, 816,

IV. FAN

821. Deux Cœurs d'Amérique, blancs, à ffries longitudinales herissées de très-longues épines creusées en tuyaux, à cannelures chargées de petits grains, ainsi que la face, qui représente le mieux un cœur, au milieu de laquelle est un léger sillon; à charniere comme celle des Huitres seuilletées, & nommés Marrons épineux, à l'un desquels adhére un autre Cœur de l'espèce des Vieilles ridées, de la quatrieme variété décrite article 843.

822. Idem.



## GENRE SECOND.

#### ARCHES.

renne étroite, rares & en pendant, de la forme IV. Fam. d'une amande dépouillée de fa coque, à robe cen rezeau granuleux très-fin, l'un brun-noirâtre, l'autre fauve-roux, à l'exception de deux petites bandes longitudinales blanches, qui dans l'un & l'autre s'étendent des sommets aux bords des deux valves, & nommés en Hollande Amande rotie: leur charniere, ainsi que dans toutes les Coquilles de ce genre, est presque égale à la largeur des battans, & composée d'une suite nombreuse de petites dents dans l'une & l'autre valve.

824. Un Cœur des Indes, très-rare, canelle dans le corps, blanc vers les bords, & teint de violet en dedans, à carenne fort oblongue, à valves applaties vers l'une des faces latérales, qui représente un cœur des mieux formés, à firies fines longitudinales accouplées, traversées d'autres encore plus fines & plus serrées, & à larges avances ou appendices intérieurs en forme d'oreilles: cette Coquille provient de la

Ziij

IV. FAM. CŒURS.

vente de la vente de M. l'Abbé de Fleury qui la nommoit Coqueluchon de Moine: elle porte près de quatre pouces sur trois.

825. Un autre Coqueluchon de Moine moins grand, & de couleurs plus foncées que le précédent.

826. Un Cœur de la Jamaïque, peu commun, blanc, à grosses stries longitudinales, larges & applaties, à carenne large, à coque épaisse & pesante, à bords intérieurs profondément découpés, & à dents de la charniere lamelleuses, plus grandes que dans toutes les Co-

\* Lift. tab. quilles de ce genre \*.

238. f. 72. 327. Trois Cœurs: sçavoir, un peu commun, Gualt. tab. 87. blanc, à grosses stries longitudinales chargées par zônes de petits tubercules, à carenne oblongue, & grand dans son espèce, nommée par

\* Arg. pl. 23. M. d'Argenville la Corbeille \*; & deux d'Amé-Bett. C. Gualt. tab. 87. rique, blanc sale, à stries longitudinales chargées de petits anneaux, à carenne lozange,

\* Arg. App. large dans l'un \*, étroite dans l'autre : celui-ci a Lift. tab. 240. les valves un peuinégales dans le bas.

> 828. Cinq Cœurs: sçavoir, deux d'Amérique, blancs, à stries longitudinales chargées, ainsi que les cannelures, d'autres très - fines transversales, & à carenne peu large & fort al-

\* Ibid. tab. longée \*; un comme le premier de l'article Gualt, tab.87, précédent, & deux comme les autres du même

· Rumph. tab. article.

44. litt. 1.

fig. 75.

829. Trois Cœurs : sçavoir, deux grands en pendant, à chevrons alternatifs blancs & fauve- IV. FAM. roux; à stries longitudinales un peu rabotteuses, à valves béantes vers le bas, à carenne large & fort allongée d'un côté, ainsi que la forme de la Coquille, nommée Arche de Noé, à cause de sa ressemblance avec un navire \*; & un semblable \*Arg, pl. 23. au premier de l'article 827.

Rumph. tab.

830. Cinq Cœurs: sçavoir, deux de l'espéce 44. litt. P. des premiers de l'article 828, mais beaucoup plus grands; & deux grandes Arches de Noé, fur la carenne de l'une desquelles adhére une autre petite Arche de même espéce.

831. Neuf Arches de Noé, dont quatre à-peuprès semblables à celles de l'article 829, mais moins grandes, & de couleurs plus vives \*; \*Gualt. tab. une qui n'en différe que par sa forme moins al- \$7. litt. H. longée, & par sa carenne qui est très-large \*; \* Ibid. lit. F. une blanc-fauve, & une brune, qui ont ceci de particulier, que leurs carnes latérales sont chargées de petites feuilles, que la carenne en est marron foncé, & leur robe réticulée \*; & deux \* Ibid. lit. G. blanches papyracées, à robe réticulée, à carenne étroite & creuse; l'une de forme large & applatie, bordée de Drap marin, & l'autre de la forme ordinaire.

832. Treize Arches de Noé de différentes grandeurs, & des variétés de l'article précédent.

# GENRE TROISIEME.

CAMES TRONQUÉES ET CONQUES DE VÉNUS.

IV. FAM. CŒURS.

833. N Cœur des Indes, peu commun planc & lisse, à coque mince, à valves de forme ovale, applaties vers l'un des côtés, où elles représentent une espéce de cœur fort allongé, dont le contour est relevé d'un pli en vive arrête, à charniere composée dans l'une des valves, de trois dents, dont deux latérales, s'engrainant dans les cavités correspondantes de l'autre valve, & connu sous le nom de Came

\* Gualt. tab. coupée \*.

&s. litt. F.

834. Une rare & très-grande Came coupée, différente de la précédente en ce qu'elle est à coque épaisse, de forme plus bombée, que le contour du cœur qu'elle représente n'est point en vive arrête, & que les dents de sa charnière en sont plus grosses & moins allongées.

835. Une Came coupée très-rare, blanche & polie, nuée par zônes & par traits longitudinaux de violet, à retour des valves en forme de cœur, chargé de stries fines longitudinales

ondées partant d'un fillon ovale, & représentant une chevelure flottante, à charniere for- IV. FAM. mée dans l'une des valves, d'une seule dent, Cœurs. & de deux cavités recevant les deux dents de l'autre valve, à bords dentelés, & nommée par cette raison en Hollande la Scie \*.

\* Séba, pl. 86, nº. II.

836. Deux Cames coupées des Indes orientales, peu communes, blanches teintes de violet tant en dedans qu'en dehors, à robe finement reticulée, à applatissement des valves en forme de cœur bordé vers le bas de petites feuilles tuilées, à stries transversales lamelleuses, en vive arrête près des bords, & à charnière composée dans l'une des valves, de quatre dents, s'engrainant dans autant de cavités correspondantes. On nomme cette espéce la Came coupée en bec de flûte \*.

837. Quatorze petites Cames coupées des lett. L. Indes, & par pendans: sçavoir, fix blanches, f. 220. Rumph. tab. trois en entier, & les trois autres nuées de violet. 43. litt. F. toutes à stries fines longitudinales, à bords dentelés, & à charniere formée dans l'une & l'autre valve, de quatre dents \*; quatre de forme femblable, dont deux canelle & deux citron; 375.f. 216. & tab. 376. fig. deux rayonnées de blanc & de canelle foncé, 219. Gualt tab.89. lisses dans le corps, à stries fines, granuleuses sitt. D. fur la face tronquée, de forme plus applatie que les précédentes, à charniere composée dans chaque valve, de trois petites dents, & nom-

IV. FAM. COURS. \* Gualt, tab. 88. litt. O. Arg. pl. 22. Bonan. cl. 2. n'o. 47.

mées Radiées \*; & deux Cames en bec de flûte. 838. Quatorze Cames coupées; scavoir . deux d'Amérique, blanches, revêtues de leur épiderme verd de terrasse, nuées de violet en dedans, à stries circulaires fines & peu prononcées, & à charniere comme celle de l'article 835; deux de même espéce, mais polies, & dont la robe est devenue par-là d'un beau violet vers la tête, & blanche vers les bords;

\* Séba, pl. deux petites Scies polies \*; quatre Radiées, 36. nº. 10. rayonnées l'une de fouci, l'autre de violet, & les deux autres de canelle : & quatre semblables aux premieres de l'article précédent, dont

deux nuées de rose pâle.

839. Huit Conques de Vénus : sçavoir, une d'Amérique, lilas nué de blanc, à stries circulaires faillantes en vive arrête, terminées dans tout le contour de la face qui représente le Cœur, par un rang de longues pointes, & un demi-rang intérieur de pointes plus petites, au centre desquelles, qui est un peu renssé, se trouve une tache ovale violet plus foncé, & à charniere formée dans l'une & l'autre valve, de trois dents, espéce nommée Concha Veneris à poin-

\* Arg. pl. tes \*; un Concha Veneris semblable, mais dé-21. lett. I. 21. lett. 1. Gualt. tab. 76. pouillé de ses stries & de ses pointes, poli, & lett. D. devenu par-là blanc, à l'exception de la tache Rumph. tab. ovale & des endroits où se trouvoient les stries, 48. 10. 4. dui sont restés violet; un Concha Veneris sans pointes, blanc, à stries circulaires moins saillantes, à renflement latéral rouge-brun dans IV. FAM. le milieu, nommé en Amérique la Créole; une Créole d'une autre variété, lilas nué de blanc, & de forme moins bombée que la précédente; deux Conques de Vénus des Indes, & d'une autre variété peu commune, petites, à robe en rézeau granuleux, blanche tachée de gris, & desquelles le renslement latéral est bordé de petites tuiles au lieu de pointes; & deux autres aussi des Indes, lisses, blanches, à renslement latéral marron, & nommées Gourgandines \*.

840. Sept Conques de Vénus: sçavoir, deux 21. lett. F. Concha Veneris à pointes; un dépouillé; une Créole de la premiere variété de l'article précédent ; deux Gourgandines canelle nué vers les bords de blanc, & à renslement latéral marron nué de bleu; & un petit Concha Veneris à rézeau qui ne différe des quatrieme & cinquieme de l'article précédent, qu'en ce que la marbrure n'y est jettée que sur les bords, & par trois grandes taches feulement.

841. Dix Conques de Venus : sçavoir, deux Gourgandines l'une souci, l'autre blanche teinte de fauve ; une qui ne différe des précédentes que par sa forme plus bombée, par un enfoncement dans le milieu de sa face oblongue latérale, & par ses taches fauves disposées par zônes & par rayons sur un fond blanc, espéce que l'on pour-

IV. FAM. COSURS

roit nommer fausse Gourgandine; deux autres applaties des deux côtés du sommet, l'une blanche tachée de fauve, l'autre fauve tachée de blanc; & cinq petites des Indes, dont une blanche, à quelques traits pourpre, une canelle foncé, & trois blanches marbrées de violet, de verd & de bleu, toutes à stries circulaires, & à enfoncement latéral sur lequel s'étendent aussi les stries.

842. Quatre Conques de Venus : scavoir . deux Gourgandines couleur de chair, à renflement latéral fauve, à coque plus épaisse, & de forme beaucoup plus bombée que les précédentes, variété qui n'est pas commune, & deux de l'espéce des quatrieme & cinquieme de l'article précédent. .

843. Onze Conques de Venus d'Amérique: scavoir, une marbrée de blanc, de fauve & de marron, à stries circulaires grosses & arrondies en bourrelet, excepté vers l'enfoncement latéral, où elles sont minces & saillantes en forme \*Arg. pl. 21. de petites feuilles, espèce nommée Vieille ridée\*;

lett. B. lett. B. Gualt. tab. 85. une Vieille ridée peu commune, blanche, à deux rayons rose séche, à stries circulaires min-Rumph. tab. ces, recourbées en forme de feuilles, & dé-48. nº. 5. Lift. tab. 279. £. 116.

coupées le long des bords de l'enfoncement la-\*Gualt. tab. téral qui est fauve-roux \*; deux blanches, à gs. litt. D. stries fines circulaires en vive arrête, mais peu élevées & fort écartées les unes des autres, à

enfoncement latéral plus profond que dans les précédentes, & nommées Levantine de la petite IV. FAM. espèce; deux autres blanches rayonnées de traits Cours. & bandes interrompues marron clair & canelle, à stries fines longitudinales, & à stries circulaires en vive arrête, encore plus distantes les unes des autres que dans les précédentes \*; deux grises, à trois rayons blancs sur chaque 378. f. 115. valve, à stries transversales serrées, arrondies & bifourchues : deux autres , qui n'en différent qu'en ce que les rayons y sont moins sensibles \*, & un Concha Veneris à pointes.

400. f. 243.

844. Une Conque de Venus orientale trèsrare, gris-verdâtre dans le corps, de forme un peu applatie, à coque très-épaisse, à stries circulaires en forme de feuilles tranchantes. nombreuses vers le bas, fort distantes vers le haut, & à enfoncement latéral très - profond fauve-roux: cette Coquille nommée magna Vetula ou Levantine de la grande espéce \*, porte trois pouces deux lignes sur deux pouces huit 21. lett. K. lignes, grandeur très - confidérable dans cette 47. no. 1. espéce.

Valent. biv. fig. 21.

845. Un Cœur des Indes, blanc, à côtes & groffes stries longitudinales, les premieres tachées par intervalles, de pourpre, & chargées de tuiles peu saillantes, à bords très-profondément dentelés, à face représentant le Cœur, concave vers le sommet, & à charnière composée dans l'une des valves, d'une très-grosse IV. Fam. dent, & de deux filets longitudinaux, se logeant dans la cavité & les rainures de l'autre valve, de l'espéce nommée Chou ou Feuille de

\* Arg. pl. 23: chou, & grand dans cette espéce \*.

Lift. tab. 350. 846. Deux Feuilles de chou de moyenne f. 188. Gualt. tab. 93. grandeur, en pendant, & très - vives en coulitt. A. Rumph. tab. leur.

43. litt. C.

847. Un grand Cœur des Indes, peu commun, à stries longitudinales & transversales fines, mais rabotteuses, formant un rézeau asserges fines, à six grosses côtes chargées à distances égales de tuiles minces presque droites, & de plus en plus grandes, à mesure qu'elles s'approchent des bords, à face représentant le Cœur, applatie & ouverte dans le milieu, & charniere formée dans l'une des valves, de trois dents, & de deux dans l'autre; espéce nommée Faitiere

Rumph. tab. 848. Une Tuilée semblable à la précédente, 43, litt. A. Gualt. tab. 3, à cela près que la couleur en tire un peu sur le litt. B. citton.

849. Une autre *Tuilée*, nuée de couleur de rose, & un peu moins grande que les précédentes.

850. Une autre, blanche vers la tête, couleur de rose vis dans le reste, à seuilles naissantes seulement, de sorme plus applatie, & d'une variété moins commune encore que les précédentes \*.

85 1. Une de forme plus étroite, plus oblongue \* Gualt. tab. & plus bombée que les précédentes, à tuiles 92. litt. G. nombreuses partie peu élevées, & partie couchées les unes sur les autres, & à face représentant le Cœur, laissant une grande ouverture ovale dans le milieu, dont les bords sont dentelés en dedans vers le haut, & retroussés en forme de lévres vers le bas.

852. Une autre blanche teinte de couleur de rose & d'aurore, bordée en dedans de cette derniere couleur, à neuf côtes qui ne sont chargées que de tuiles naissantes, couchées les unes sur les autres, de forme large & bombée, & à grande ouverture latérale, semblable à celle de la précédente \*.

853. Une très-grande Tuilée d'un pied sept 43. litt. B. pouces de long sur un pied de large, à six f. 190. grosses côtes réticulées, où les tuiles paroissent à peine vers le bas, à intervalles des côtes fort profonds, blanc sale & rabotteuse en dehors. d'un beau blanc en dedans, & conservant encore une partie de son nerf, dont on taille les prétendues pierres jouant l'opale, nommées vulgairement Pierres à queue de paon. Cette Coquille est connue sous le nom de Bénitier,

\* Ibid. lit. A. Rumph. tab. IV. FAM.

depuis qu'on a employé en effet pour Bénitiers; dans l'Eglise de Saint Sulpice de Paris; les deux valves d'une semblable, dont la République de Venise avoit autresois fait présent à François Premier.



# CINQUIEME FAMILLE.

#### TELLINES.

deux familles précédentes, qui, à proprement parler, n'en font qu'une, par une forme oblongue, & en ce que le fommet des valves ou la charniere font toujours plus ou moins éloignés du milieu de leur longueur. On peut les divifer en trois genres; sçavoir,

- 1°. Les Tellines exactement fermées ou béantes seulement à l'une des extrémités; leur forme est oblongue, assez platte, plus large d'un côté que de l'autre, & la charniere, ainsi que la tête, en sont placées près du milieu.
- 2°. Les Tellines béantes aux deux extrémités; leur forme est très oblongue, également large, mais peu bombée dans toute leur longueur; la charniere en est plus éloignée du milieu:

Tome I.

V. FAM. TELLINES.

3°. Les Manches de couteau, ou Tellines improprement dites, dont la forme est extrêmement longue, également large & bombée dans toute leur longueur; elles sont béantes aux deux bouts, dans l'un desquels est située la charniere.

#### GENRE PREMIER.

TELLINES EXACTEMENT FERMÉES, OU BÉANTES SEULEMENT A L'UNE DES EXTRÉMITÉS.

854. UNE Telline des Indes, peu commune, blanche nuée de fauve, recouverte de suites de chevrons gris de lin peu prononcés, à quatre rayons de taches rouge brun, à stries transversales fines & applaties, & à charnière formée de trois dents dans l'une des valves, & de deux dans l'autre, nommée Aîle de papillon, & \* Arg. App. grande dans fon espéce \*.

855. Quatre Tellines des Indes, peu communes; scavoir, une lisse ventre de biche, ornée dans toute sa robe de traits fins en chevrons se croifant diversement, canelle dans le haut, violet \* List. tab. clair dans le bas \*; deux de même espéce, mais

296. f. 339.

plus petites & à stries transversales très-fines \*; & une Aile de papillon.

856. Une Telline de la Chine, rare, à zônes Tellings \* Gualt. talus alternatives inégales blanches & couleur de rose 86. litt. H. en dehors, couleur de rose très-vif en dedans, où l'on remarque un surcroit d'épaisseur dans le milieu, & à charnière formée dans l'une & l'autre valve de deux dents \*. Cette Coquille, \* 1bid. itte. ainsi que toutes celles de ce genre qui suivront, D. cont, vers le côté le plus étroit, un pli ou sinuo-f. 233. sité dans les deux valves, qui les rend béantes en cet endroit.

857. Quatre Tellines de même forme que la précédente; sçavoir, deux des côtes de Bretagne, blanches nuées vers la tête de ventre de biche, aurore clair en dedans; & deux des Indes entiérement blanches.

858. Quatre Tellines des Indes par pendans; sçavoir, deux blanches teintes de jonquille, à rayons couleur de rose, interrompus par quelques zônes de nuances plus foibles, à stries sines transversales, & nommées Tellines radiées \*; & \*Rumph. deux blanches à extrémité des sommets cerise, tab. 45. lit. Ha & dont la sinuosité latérale est moins prononcée que dans les précédentes.

859. Quatre Tellines par pendans; sçavoir, deux d'Amérique, blanches teintes en partie de couleur de chair, à tête ceri'e, à zône un peu creuse, située vers le milieu, & à sinuosité latérale

Aaij

presqu'insensible \*; & deux Radiées, l'une à v. fam. rayons jonquille & orangé, l'autre à rayons Tellines. couleur de chair soncé & silas clair, toutes deux \* List. tab. 393. fig. 236. grandes dans leur espèce.

860. Une Telline des Indes peu commune, couleur d'or en dehors, nuée de cette couleur & de violet en dedans, à valves composées de deux faces très-inégales entr'elles, formant un angle très-obtus: la plus petite de ces faces est granuleuse & bordée du côté de la tête de quelques dents triangulaires: on nomme cette espéce en Hollande Telline-feuille, & en France

\* Arg. pl. Langue d'or \*.

Rumph tab. 861. Idem, à cela près que le violet y do-45. litt. K. mine davantage.

862. Une Langue d'or plus grande que les précédentes, jaune-verdâtre en dehors, violet clair en dedans.

863. Deux grandes & belles Tellines d'Amérique, lisses & d'un grand éclat, l'une rayonnée & nuée par zônes de blanc, de citron clair, de couleur de rose & de lilas, l'autre blanche à deux zônes citron clair, toutes deux à bords un peu sinueux & à charniere comme

\* Arg. pl. les précédentes \*.

22. lett. A. 11ft. tab. 397. 864. Idem, à quelque légere différence près f. 240. Gualt. tab.89. dans les nuances. Gualt. tab.89.

865. Idem.

866. Idem.

867. Quatre Tellines; sçavoir, une des Indes, peu commune, d'un beau violet tant en V. FAM. dedans qu'en dehors, & à charniere formée d'une seule dent dans l'une des valves, & de deux dans l'autre; deux en pendant, dont une cramoisi teinte dans une large zône de verd, & une couleur de rose, nuée dans une large zône de blanc, toutes deux de l'espéce nommée Griblette; & une semblable aux dernieres des quatre articles précédens, à cela près que l'on remarque quelques petites zônes couleur de rose vers le haut, & que l'intérieur de chaque valve est couleur d'or.

868 Sept Tellines des Indes de diverses grandeurs; sçavoir, une blanche nuée en quelques endroits de citron, à tête ponceau, & à extrémité latérale doublement sinueuse, formant en cet endroit une espéce de bec allongé, nommée de-là Pince de Chirurgien \*; deux de même ef- \* Gualt. tab. péce, citron clair; deux autres couleur de rose, 83. litt. T. à un rayon jonquille pâle sur l'une des valves, lett. O. Rumph. tab. & à stries transversales très-fines; une totale-45. litt. L. ment blanche, & une Telline blanche peu com- f. 237. mune, bombée vers la tête & d'un côté seulement, & à bords tronqués vers le côté finueux & applati \*.

869. Dix-huit Tellines de moyenne gran- 89. lut. B. deur & petites; sçavoir, deux d'Amérique, lisses, nuées par zônes, & rayonnées de violet

\* Gualt. tab.

Aa iii

### COQUILLES BIVALVES.

TELLINES. Arg. pl. 12. lett. I.

995. f. 238.

& de blanc \*; deux à stries fines transversales rayonnées des mêmes couleurs; deux couleur de rose, à stries fines semblables, nommées Tellines de la Chine : deux blanches, marbrées de traits fins en zig-zag bruns, interrompus par des rayons du fond, teintes en dedans de citron, & à stries transversales fines, mais bien 4 Lift, tab, prononcées \*; deux de nos mers, nuées par zônes de rouge, de jaune & de blanc; deux autres de forme plus étroite, rayonnées des mêmes couleurs; une blanc sale, à stries transversales obliques & sinueuses dans les deux tiers de sa robe, & longitudinales dans l'autre tiers, terminées par des dentelures; une blanche nuée vers la tête de lilas, à grosses stries longitudinales accouplées, traversées d'autres très fines, qui ne sont guères sensibles que vers les bords; deux de l'espéce des premieres de l'article 859; & deux Pinces de Chirurgien.



# GENRE SECOND.

TELLINES BÉANTES AUX DEUX EXTRÉ-MITÉS-

870. 3 EPT Tellines de nos mers ; sçavoir, une grande fauve clair, à fascies inégales rabot- V. FAM. teuses & peu prononcées, jettées par ondes, à Tellines. coque épaisse, de forme très-oblongue, & à charniere formée dans l'une des valves d'une grosse dent qui s'emboîte sous une cavité correspondante de l'autre valve \*; une plus petite \* Gualt. tab. de même espéce \*; deux blanches teintes de 90. litt. A. \* Rumph. fauve, de forme un peu moins oblongue, & à tab. 45. lit. N. extrémités moins béantes que la précédente: une qui n'en différe que par la forme de sa charniere qui, dans l'une des valves, est formée d'un appendice fort faillant, garni de deux dents qui répondent aux cavités de l'autre valve; & deux de forme plus courte & plus bombée, nommées par Lister Cames Pholades; elles conservent toutes deux leur animal \*. \* Lift, taba

871. Une grande & belle Telline des Indes, \* Arg. Zoorare, d'un beau violet, à deux rayons & quel-lett. C.
ques nuances de violet moins foncé, & à charniere formée dans les deux valves d'une lame

Aaiv

TELLINES.

platte transversale, terminée par une petite denr dans l'une, & par une cavité correspondante dans l'autre.

> 872. Deux Tellines des Indes, peu communes, sur-tout de cette grandeur, papyracées, à robe violette, ornée de quatre rayons blancs tant en dehors qu'en dedans, & à charniere formée dans les deux valves d'une côte longitudinale intérieure, terminée par deux petites dents dans l'une, & par deux cavités correspondantes dans l'autre, espèce nommée le So-

\* Arg. pl. leil levant \*.

Rumph. rab. 45. liti. E. List. tab. 422. £. 226. Gualt. tab. 91. litt. B.

873. Cinq Tellines; sçavoir, deux de la Méditerranée, rose séche, à deux rayons blancs dans le milieu de la robe, à stries fines obliques un peu onduleuses, & à charniere de l'espéce \* List. tab. décrite dans l'article 871 \*; deux d'Amérique.

£16. f. 260. Gualt. tab. 91. litt. C. Bonan. cl. 2. fig. 77. Adans. pl. 19.

blanches, à stries transversales peu prononcées, à valves sinueuses d'un côté, moins béantes que dans l'espèce précédente, & à charniere semblable \*; & un grand Soleil levant.

f. 1. \* Lift. tab. 421. f. 265.

874. Idem, à peu de différence près dans les couleurs.

875. Trois Tellines blanches des Indes, peu communes; sçavoir, une papyracée transparente comme le talc, bombée sur-tout vers la tête, à stries fines transversales en forme de rides, à une extrémité beaucoup plus béante que l'autre, & à charniere formée dans l'une &

l'autre valve de deux petits appendices sons les sommets, espèce nommée la Lanterne ou la V. FAM. Papyracee \*; & deux qui ne différent des deu Tellines. premieres de l'article 873, qu'en ce qu'elles sont 91. litt. D. entiérement blanches & de forme plus course.

876. Quatre Tellines; sçavoir, une de la Méditerranée, revitue de son épiderme oirâtre, à valves contournées ne pouvant joindre que près de la tête, très-béantes dans le reste de leur contour, chargées dans l'intérieur d'une excroissance platte, dentelée dans ses bords, à charniere de l'espèce décrite dans l'article 871, & nommée le Bec de canard \*; une de même \*Rumph. espéce, mais polie & devenue par-là blanc sale teint de gris; une semblable aux deux dernieres de l'article précédent, & une Lanterne.



#### GENRE TROISIEME.

#### MANCHES DE COUTEAU.

877. IV EUF Manches de couteau : sçavoir, un V. FAM. des Indes, rare pour sa grandeur, gris nué par TELLINES. ondes de fauve, de forme droite, & à charniere, ainsi que toutes celles de ce genre, formée dans l'une des valves, d'une dent applatie se logeant entre les deux correspondantes de Lift. tab. l'autre valve 1; deux d'Amérique, fauves nués 413. de blanc, presque aussi gros que le précédent, <sup>2</sup> Ibid. tab. mais de moitié moins longs <sup>2</sup> ; deux des mêmes 412. fig. fupeparages, jaune pâle, à une des extrémités terrior. minés en bourrelet, l'un desquels est revêtu 3 Ibid. fig. vers un bout, d'Ovaires de Buccins 3; & quatre <sup>4</sup> Arg. pl. 24. de nos mers, dont deux courbes <sup>4</sup>; & deux Gualt, 12h, droits 5 nués de blanc, de gris & de verdâtre. 95. litt. D. 878. Quatre Manches de couteau: sçavoir,

deux rares, fauve & lilas, tachetés de pourpre foncé, minces, transparens, & de forme un 6 Ibid. tab. peu courbe, nommés Gousses de féves 6; & deux de l'espéce des second & troisieme de l'article

Rumph. tab. précédent. 45. litt. F.

90. litt. E.



### SIXIEME FAMILLE.

#### MOULES.

C e font des Coquilles oblongues, non d'un côté à l'autre comme les Tellines, VI. FAM. mais de la tête au bord opposé; elles font de plus caractérisées par l'égalité constante de leurs deux valves, & par leur forme convexe, large vers le bas, sinissant en pointe aux sommets. Quelques-unes sont encore remarquables par leur belle nacre & les perles qu'on y trouve quelquesois. Nous les diviserons en trois genres; sçavoir,

- 1°. Les Moules proprement dites, dont les valves ferment exactement, & dont un des côtés est presque droit, tandis que l'autre & l'extrémité inférieure sont arrondis.
- 2°. Les Moules cylindriques, dont les valves sont sort longues, à peu près également larges des deux bouts, &

VI. FAM. Moules. aussi exactement fermées que dans les précédentes, genre qui comprend les Pholades bivalves, nommées Dattes.

3°. Les Moules triangulaires, nommées particuliérement Pinnes marines, dont la forme est applatie, à peu près triangulaire isoscele, & dont les valves ne ferment point exactement.

# GENRE PREMIER.

MOULES PROPREMENT DITES.

879. NE Moule des parages voisins du détroit de Magellan, dépouillée de sa pellicule, & non polie, blanche vers le haut, violette & pourpre dans le reste, à stries longitudinales un peu ondées, croisées de distance en distance par d'autres transversales jettées par ondes, nacrée d'un bel orient, & offrant aux yeux, tant en dedans qu'en dehors, toutes les couleurs de l'arcen-ciel, à charniere formée d'une dent oblongue sous le sommet de l'une des valves, & d'une cavité de même forme dans l'autre; nom. mée Magellanique \*, & grande dans son estett. N.

880. Une Moule Magellanique dépouillée & non polie, plus grande que la précédente, VI. FAM. blanche dans les trois quarts de sa longueur à Moules. prendre de la tête, & violet nué de blanc dans le reste.

881. Une qui ne différe de la précédente qu'en ce qu'elle est toute blanche, excepté quelques nuances de violet jettées par zônes surtout vers le bas.

882. Une très-grande Moule Magellanique polie, & dont la robe privée de ses stries, est d'un beau pourpre veiné de blanc & du plus grand éclat.

883. Uue autre polie & plus foncée en couleur que la précédente.

884. Une autre Moule Magellanique polie, dont les deux valves sont jointes & assuietties ensemble par une bordure d'écaille, & forment ainsi une tabatiere à goulot à l'usage des Indiens, qui ressemble parfaitement à nos poires à poudre.

885. Deux Moules Magellaniques polies, dont une remarquable par une excroissance représentant parfaitement une autre Moule qui auroit crû sur la premiere, mais du reste semblable aux précédentes, & que l'on pourroit nommer Moule double; & une autre variété, blanche dans plus de la moitié de fa longueur, bleu-turquin légérement nué de blanc dans le reste, laquelle n'a jamais eu de stries, & dont le dedans

VI. FAM. MOULES.

est presqu'entiérement recouvert d'une couche légere, blanche, parsemée d'un grand nombre de petites perles : on n'y apperçoit pour toute charniere que la rainure latérale destinée à recevoir le ligament.

886. Une Moule de la terre des Papous, polie, fauve nuée par ondes de blanc & de couleur de rose, de l'éclat de l'agate, de forme trèsbombée, un peu sinueuse dans son bord inférieur, bossue vers les sommets, d'où naissent deux avances arrondies en portion de cercle: on n'y distingue point de charniere, mais seulement un fillon léger & fort long, qui se termine dans chaque valve par une dent presque insensible \* : cette Coquille a plus d'un demi-

lett C. Adanf. pl. 15. pied de long fur deux pouces neuf lignes de

large.

887. Une autre des mêmes parages, & semblable, mais moins grande; & une valve de Moule Magellanique, très-rare, mais un peu fruste, brun-noirâtre tant en dessus qu'en desfous, & portant un pied trois pouces & demi de long sur huit pouces & demi de large.

888. Cinq Moules peu communes : sçavoir , trois petites Magellaniques, dont une de forme assez large, blanche & nacrée depuis la tête jusqu'au milieu, bleu foncé nué de blanc dans le reste; une toute violette, à la tête près, qui est blanche, & une entiérement blanche : les deux autres sont des parages voisins de Rio de la Plata, lisses & polies, à robe violet - noir VI. FAM. jouant l'opale, & bordee de violet clair.

889. Quatre Moules de moyenne grandeur, & polies: sçavoir, une Magellanique peu commune, nuée d'orangé & de rouge-brun; & trois d'Afrique, dont une marbrée par ondes de lilas, de couleur de rose & de rouge-brun; une marbrée de blanc, de gris de lin & de lilas; une fauve tachée de verd, & marbrée par traits en zig-zag de fauve plus foncé: toutes les trois à charniere formée d'une très-petite dent sous le sommet de l'une des valves, qui se niche dans une cavité correspondante de l'autre valve.

890. Quatre Moules : sçavoir, une de Rio de la Plata, revêtue de son épiderme marron foncé, & à charniere comme les dernieres de l'article précédent; deux d'Afrique, dont une jonquille clair, & à tête lilas; & une d'un beau verd, ornée dans toute sa robe de traits en zigzag plus foncés, imitant le point d'Hongrie; & une de la terre des Papous, polie, marbrée principalement par ondes de violet, de blanc, de fauve & de verdâtre.

891. Quatre autres Moules polies, dont une violette nuée de gris de lin, & jouant l'opale; une de Rio de la Plata, & deux d'Afrique, femblables aux seconde & troisieme de l'arricle précédent.

V FAM.
MOULES.

892. Quatre Moules d'Afrique, dont une couleur de paille, à grand nombre de zônes formées de traits en zig-zag fauves, imitant le point d'Hongrie; une à cinq larges zônes alternatives verd so cé & fauve clair; celles-ci bariolées de traits fins en zig-zag rouge pâle; une blanche, & une jonquille pâle.

893. Deux Moules d'Alger, ressemblantes aux Magellaniques pour la nacre & les couleurs, mais de forme plus étroite & plus allongée, grandes dans leur espèce; l'une desquelles est poie, l'autre revêtue de son épiderme, & adhérente encore à son byssus: leur charnière est

de l'espéce décrite article 879.

894. Huit Moules d'Amérique: sçavoir, deux blanches rayonnées de rouge-brun, ayant àpeu-près la forme de la Moule des Papous, & \*Lift. tab. nommées Tulipes \*; deux de même espéce.

\* Lift. tab. infinite s' 1 majos , deux de incine espece, 2559. É 198. mais revêtues encore de leur épiderme, partie marron & partie fauve; deux petites de même forme, couleur de rose; & deux petites grises tachées de violet foncé, nuées vers l'un des bords de couleur de rose, à stries longitudinales très-fines, terminées par des dentelures presque insensibles, & à charniere formée de deux trèsperites dents qu'on ne decouvre qu'à la loune.

\*Arg. pl.22. petites dents qu'on ne decouvre qu'à la loupe, lett. K. espèce nommée Gueule de fouris, & par M. List tab. 366. Adanson le Dotel \*.

Adanf. Hill. du Sénég. pl. 895. Trois belles Moules de la Méditerranée, 15. fig. 3. dont dont une très-grande revêtue de son épiderme noir, de forme large, & à charnière formée de VI. FAM. deux petites dents sous les sommets; & deux Moules. de même espéce, polies, moins grandes, d'un beau violet en dehors, blanches bordées de violer en dedans \*.

896. Cinq Moules de la Méditerranée, de 21. litt. E. l'espéce des précédentes : sçavoir, deux revê-f. 203. tues de leur épiderme brun-noirâtre, à l'une desquelles adhére un groupe de tuyaux vermiculaires; & trois polies, dont deux d'un beau violet veiné en quelques endroits de blanc, & une violette vers le haut, bleu foncé au dessous, & bordée vers le bas d'une zône fauve affez

large.

897. Quinze Moules de dissérentes grandeurs, la plûpart dépouillées de leur épiderme : scavoir, deux d'Amérique, blanches au sommet, bleu foncé dans le reste, à charniere formée de trois petites dents, & chargées l'une & l'autre de deux Huitres blanches papyracées, d'une espèce très-rare; deux petites rousses, de la forme des Moules des Papous; deux Tulipes; deux Gueules de souris; une Moule de la Méditerranée, de la variété de la derniere de l'article précédent; quatre de nos mers, rayonnées de violet & de bleu; deux autres bleu foncé, chargées de glands de mer; & une petite boëte de semence de Moules de nos mers.

- Tome I.

# GENRE SECOND.

Moules cylindriques et Pholades BIVALVES, NOMMÉES DATTES.

VI. FAM. Moules. 898. Le ux Moules peu communes en pendant, à coque très-mince, nacrée en dedans, de forme presque cylindrique un peu applatie vers l'un des bouts, à robe partie fauve, & partie chargée d'un dessein en rézeau très-fin, de couleur plus foncée, qui se ramisse vers le bas, & qui a fait donner à cette espéce le nom de Moule arborisée: on n'y apperçoit nulle trace de charnière.

899. Deux Moules arborisées, à ramifications du dessein plus nombreuses & mieux prononcées que dans les précédentes, qu'elles surpassent aussi en grandeur.

900. Dix Pholades bivalves: sçavoir, deux rares d'Afrique, revêtues d'un périoste brun, à stries sines longitudinales partant du sommet en forme de rayons, & à bords repliés en partie l'un sur l'autre en dedans des valves; deux grandes d'Amérique, dont une revêtue de son épiderme verdâtre, à stries onduleuses trèssines. & pacrée en dedans \*: l'autre laisse voir

4 Rumph. fines, & nacrée en dedans \*; l'autre laisse voir

la robe blanche de la Coquille dans les parties où l'épiderme a été enlevé; deux petites noires VI. FAM. des mêmes parages : & quatre de la Médi- Moules. terranée, dont deux marron 2; une fauve, & 90. litt. D. une blanche dépouillée de son épiderme.

Bonan, cl. 28

901. Un groupe de quatre Dattes de la Mé-f. 28 & 27. diterranée, dont trois grandes & une petite, 327. f. 168. logées dans la pierre même qu'elles ont creusée; & deux grandes de l'Amérique, dont une polie, l'autre simplement dépouillée de son épiderme, toutes deux parfaitement blanches & nacrées.



# GENRE TROISIEME.

PINNES MARINES, NOMMÉES AUSSI JAMBONS ET JAMBONNEAUX

VI. FAM. Moules. de neuf pouces & demi de long, & à coque mince, rouge & transparente, de forme assez large, à huit côtes longitudinales partant du sommet, laissant entr'elles de larges, mais peu profondes cannelures, chargées, ainsi que les côtes, de feuillets minces & couchés, dont quelquesuns s'élevent en forme de tuiles, nacrée en dedans vers le haut, & à charniere formée, ainsi que toutes celles de ce genre, d'un simple ligament, sans aucun vestige de dents.

903. Une Pinne-marine des Indes, peu commune, de près d'un pied de long, de forme plus étroite, & à coque plus épaisse que la précédente, brune en dehors, presqu'entiérement nacrée en dedans, à stries fines longitudinales peu prononcées vers le bas, où elle est chargée d'une grande Huitre de l'espèce des Crétes de coq.

904. Quatre Pinnes - marines de moyenne grandeur: sçavoir, deux des Indes, dont une

à coque peu épaisse, transparente, & de couleur de corné, à stries fines longitudinales, & VI. FAMA de forme assez large vers le bas ; l'autre est Moules. fauve, chargée dans une partie de sa robe de stries qui partent du sommet en forme de rayons hérissés de tuiles plus ou moins longues, pliées en cornets ou tuyaux cylindriques vers le bas des deux valves qui sont coupées à équerre \*; deux de la Méditerranée, couleur de rose pâle, presqu'entiérement recouvertes de seuillets ondés & plissés, formant destuiles nombreuses plus ou moins cylindriques, & à l'une desquelles. adhére encore son By sus \*. Plus un By sus \* Bonan. cl. détaché.

\* Séba , pla

905. Sept petites Pinnes-marines: scavoir, litt. B. deux d'Amérique, couleur de rose, papyracées, àstries longitudinales un peu sinueuses, chargées vers le bas de quelques tuiles \*; une violette des \* Gualt, tab. Indes, à tuiles plus longues & plus nombreu-79. litt. e. fes \*; deux papyracées de la côte Coromandel, \* Arg. pl. 227 verdêtres nuées de pourpre, à stries fines non tuilées \*: une rare par sa forme bizarrement contournée, à grosses stries longitudinales peu 371. fig. 212. nombreuses; une de l'espèce des dernieres de l'article précédent, & un Byssus.

906. Dix autres, la plûpart papyracées; sçavoir, trois blanches nuées de couleur de rose\*, \*Gualt. tab. dont une a quelques tuiles vers le bas; une 78. litt. C. légérement finneule vers la tête \*; une gris de \* Rumph. . Bb iii .

VI. FAM. Moules. \* Lift. tab 370. f. 211.

lin nuée de pourpre, à stries fines longitudina. les, traversées d'autres encore plus fines \*; une violette presque en entier; trois des variétés déja décrites, & une comme la sixieme de l'article précédent, dont les deux valves sont considérablement arquées. Plus, deux Byssus, & deux plaques de Pinne-marine, taillées & polies, imirant la Cornaline.

> 907. Six Pinnes-marines; sçavoir, deux de la Méditerranée, couleur de corne, à stries longitudinales peu prononcées, & à feuilletures transversales ondées & déchiquetées, couchées

Gualt. tab. 78. litt. A.

\* Bonan. cl. les unes sur les autres \*; trois de la même mer, Arg. pl. 22, dont une de forme moins allongée que les pré-lett. B. cédentes, de couleur plus obscure, & à feuilletures non déchiquetées; les deux autres sont de l'espéce des deux dernieres de l'article 904; & une du Sénégal, de huit pouces de long, de forme large & applatie, à stries longitudinales nombreuses, hérissées de tuiles plus ou moins longues, dont les plus grandes sont pliées en tuvaux cylindriques. C'est l'Apande M. Adan-

\* Adans. pl. fon \*.

\$5. f. 5.

908. Une Pinne-marine de la Méditerranée, de l'espéce des dernieres de l'article 904; elle \* séba, pl. porte un pied huit pouces de long \*. On a joint 21. nº. 1. à cette Coquille une paire de bas & une paire de gands de Byffus, qui ne cédent en rien à ceux de foie pour la finesse & la beauté. Ils viennent de la Manufacture de Naples.



# COQUILLES DE MER.

# CLASSE TROISIEME.

# MULTIVALVES.

N range sous cette classe, qui est moins nombreuse & beaucoup moins MULTIVAL. variée que les précédentes, les Coquilles composées de plusieurs piéces, ordinairement inégales entr'elles. Nous la diviserons en six familles, qui sont,

- 1°. Les Oscabrions.
- 2º. Les Pholades.
- 3º. Les Tuyaux de mer multivalves.
- 4º. Les Glands de mer.
- 5°. Les Pouce-pieds & Conques anariferes.
  - 6°. Les Oursins.



Bb iv

# PREMIERE FAMILLE.

#### OSCABRIONS.

I. FAM. OSCABRIONS.

Nã. Adanson a rangé ces Coquilles dans la classe des Univalves, à cause de l'animal qui les habite, qu'il a reconnu appartenir au genre des Lépas; mais, comme nos divisions ne sont fondées que sur les Coquilles mêmes privécs de leurs animaux, nous ne pouvons nous dispenser de rapporter cellesci aux Multivalves. Elles ont la forme d'un demi-ovoide, & sont composées de huit écailles courbes, posées en recouvrement les unes sur les autres de devant en arriere, relevées toutes dans le milieu d'une petite côte plus ou moins aiguë, & enclavées vers le bas dans une membrane flexible, écailleuse & chagrinée dans son contour. Cette famille ne contient qu'un seul genre,

900. Douze Oscabrions formant fix variétés sgavoir, deux du Chili, à écailles violet-noir nué de jaune vers le haut, traversées chacune dans le milieu d'une bande assez large, & de I. FAM. deux rayons obliques de même couleur que le fond, à côte longitudinale obtuse, & à bords de la membrane destitués d'écailles ou non chagrinés. Leur forme un peu arquée leur donne beaucoup de ressemblance avec une grosse Chenille, ou avec une Chaloupe, dont les membres & les varangues sont représentés par les écailles courbes de la Coquille; deux à-peu-près de même forme, mais moins arqués, bleu céleste en dedans, à contour extérieur de la membrane revêtu de très-petites écailles qui imitent le chagrin, & de plus orné de taches alternatives grises & noires; deux de S. Domingue, plus grands que les précédens, gris cendré en dehors, & chagrinés sur leurs bords \*; deux de la \* Are. pl. 25. Caroline, gris de lin, nués de verdâtre, à taches lett. L. Séba, tom. 2. brunes triangulaires sur le milieu des écailles, pl. 61, nº. 3 qui font chargées chacune vers les côtés de deux suites triangulaires de stries partie longitudinales, & partie tra sversales, à extrémités chagrinées ainsi que le contour, & blancs en dedans; deux petits de nos mers, bruns nués de verdâtre, & pointillés de gris en dehors, violets en dedans, à côte du milieu plus aigue que celle des précédens, mais du reste semblables pour les stries & la partie chagrinée \*; \* Arg. pl. 25. deux autres petits de couleur cendrée, de for-len. M.

# 394 COQUILLES MULTIVALVES

I. FAM. DSCABRIONS.

me étroite & allongée, à bords de chaque écaille chargés de deux crans triangulaires & très-finement striés. Plus, un Oscabrion dont les huit piéces ont été détachées pour en faire voir la structure, & dont la membrane ressemble alors à la carcasse d'une chaloupe privée de son bordage.

910. Quatre très-grands Oscabrions des parages Magellaniques, de forme plus large & plus applatie que ceux de l'article précédent; deux desquels ont les écailles brunes tachées dans le milieu de blanc, & striées à-peu-près morph. pl. 7. comme celles de la petite tortue de terre ; les lett. V. Séba, tom. 2. deux autres sont tels qu'ils sont sortis de la

pl. 61. nº. 6. mer \*



# SECONDE FAMILLE.

PHOLADES.

Les Coquilles, dont le caractere général est de se loger dans les pierres ten Pholades. dres, l'argille & le bois, sont ordinairement composées de cinq ou six piéces fort inégales entr'elles, & plus ou moins fines, dont les deux plus grandes, qui sont latérales, répondent aux battans des Bivalves; les autres, qui sont beaucoup plus petites, se trouvent fixées par des ligamens partie sur le sommet & sur le repli extérieur de chaque battant, partie le long des battans mêmes, soit en dessus, soit en dessous. Ces dernieres piéces sont si fragiles & si minces, qu'il est rare de les trouver jointes aux deux principales qui d'ailleurs ne ferment jamais exactement. Nous connoissons deux genres dans cette famille; sçavoir,

- 1°. Les Pholades sextivalves.
- 2°. Les Pholades quintivalves.

#### GENRE PREMIER.

#### PHOLADES SEXTIVALVES.

OII. UATRE Pholades à fix piéces; fça-II. FAM. voir, une de nos mers, blanc fale, de forme Pholades, allongée, à robe en rézeau granuleux dans les deux tiers de fa longueur, à valves finueuses & évasées vers l'une des extrémités; elle con-

<sup>1</sup> Arg. pl. 26. ferve son animal <sup>1</sup>; une autre de même coulett. H. I. List. tab. 433, leur, mais de forme plus large, plus courte & f. 276. Gual. tab. 105, plus bombée; elle n'est reticulée que dans sa litt. A. B. C. partie antérieure, le reste de sa robe n'a que des stries transversales en saçon de rides: l'ani-

<sup>2</sup> Lift. tab. mal y est aussi rensermé <sup>2</sup>; une grande d'Amé-436. s. 279. Gual. tab. o.; rique, blanche, de forme allongée, à grosses list. D. 56ba, pl. 16. stravarsées d'autres très sines & ondulauses.

traversées d'autres très-sines & onduleuses, à longs appendices intérieurs un peu concaves, à larges replis des valves sur les sommets, &

<sup>3</sup> Lift. tab. à bords dentelés <sup>3</sup> ; & une petite d'Angleterre ; 6ugl. tab.105. entiérement réticulée 4.

litt. G. 4 Lift. tab. 912. Idem.

451. f. 278.
Gual. tab.105.

913. Deux grandes Pholades d'Amérique en pendant, de la variété de la troifieme de l'article 9114.

913. (bis) Six Pholades de la Méditerranée, avec leur animal parfaitement conservé dans II. Fam. l'esprit-de-vin: elles forment trois variétés.

PHOLADES.

#### GENRE SECOND.

PHOLADES QUINTIVALVES.

DIA. Pholades des Indes, à cinq piéces, dont les trois petites sont piacées, l'une fur les fommets, les deux autres le long des valves tant sur le dos que dans la partie insérieure : la forme totale de la Coquille est presque conique, & la robe en est partie lisse, partie très-finement réticulée, & partie simplement ridée \*; plus, un morceau de bois qui se sépare en trois, contenant deux petites Pholades de tab.46. litt.14. cette espèce, & plusieurs cavités coniques que d'autres y ont creusées. Cette variété de Pholades n'est pas commune.

\* Rumph.

915. Six Pholades de l'espéce précédente, dont cinquichées en partie dans un morceau de bois.



# TROISIEME FAMILLE.

TUYAUX DE MER MULTIVALVES.

TIII. FAM.
TUYAUX DE distinguées le premier des Tuyaux de mer multi- mer univalves, ne différent de ces derniers que par deux valves ou par deux paires de petites valves qu'on trouve en dedans, qui, lorsqu'elles ne sont qu'au nombre de deux, peuvent faire regarder la Coquille comme trivalve, & comme quintivalve lorsqu'elles sont au nombre de quatre; ce qui constitue deux genres dans cette famille, que nous comprendrons dans les deux articles suivans.

916. Quatre petits Tuyaux trivalves d'Amérique, adhérens à un cœur de l'espèce nommée Marron épineux, composés chacun extérieurement d'un tuyau grisâtre sermé & bombé par un bout, chargé en cet endroit de tubercules, mais mince, soré, relevé & un peu applati par l'autre, & intérieurement de deux petites valves assez semblables pour la sorme aux battans des

Pholades de la famille précédente : la ressemblance de ces Tuyaux avec une Cornue ou Re- III FAM. torte, leur en peut faire donner le nom; un pe- MER MULTIP tit Tuyau de cette espéce, dont la partie supé-valves. rierre a été enlevée pour faire voir les valves intérieures dans leur position naturelle; deux autres petites valves détachées de l'un des quatre Tuyaux précédens; une espéce de fruit spongieux que l'on trouve sur le rivage de la côte Coromandel, dans lequel font logés plufieurs Tuyaux quintivalves diversement contournés, fermés & bombés par un bout, minces & forés de l'autre ; deux Tuyaux de même espéce, l'un desquels a été troué à sa partie bombée pour en tirer les quatre petites valves intérieures, dont les deux qui occupent la partie inférieure du Tuyau, sont arquées, & les deux qui se trouvent à l'extrémité supérieure, sont en forme de palettes ou de petites cuillers à manche court; ce qui doit faire regarder cette espéce de Tuyaux, comme une variété de celle que M. Adanson a décrite sous le nom de Taret: un autre Tuyau quintivalve blanc, long, un peu finueux, fermé par le bout le plus large, d'une espèce d'opercule hémisphérique, qui est comme engagé dans le Tuyau; ouvert par le bout le plus étroit, dont l'orifice est partagé par une cloison longitudinale de peu d'étendue, en deux petits demi-cylindres inégaux, & dans

### AOD COQUILLES MULTIVALVES

l'intérieur duquel on reconnoît en l'agitant TIL FAM. MER MULTI VALVES. 19. f. I.

41. litt. F. G.

que sont contenues les petites valves qui lui TUYAUX DE sont propres ; c'est le vrai Taret rongeur de bois de M. Adanson \*; deux Tarets d'une autre va-\* Adans. pl. riété, dont le dedans est sur-tout remarquable par un grand nombre de feuillets circulaires minces, en vive arrête, & placés en forme d'anneaux, à distances à-peu-près égales les uns des autres vers le bout le plus étroit du Tuyau, l'un desquels a été coupé dans la longueur de plus d'un pouce, pour en mettre la construction intérieure à découvert \*. Plus, deux valves ar-\* Rumph.tab. quées provenantes de cette variété de Tarets, lesquelles sont beaucoup plus larges que celles

> des autres variétés. 917. Quatre morceaux de bois criblés & vermoulus par des Tarets de la derniere variété de l'article précédent : l'un de quels est un morceau de fapin de treize pouces de long sur quarre de large & autant d'épaisseur, dont une des faces présente encore un de ces Tuyaux niché dans fon trou, & des fragmens de plusieurs autres. Les trois autres morceaux sont beaucoup moins grands, & contiennent plus ou moins de ces Tuyaux.



# QUATRIEME FAMILLE.

GLANDS DE MER.

CES Coquilles, dont le caractere diftinctif est de s'attacher par groupes GLANDS DE
nombreux aux cailloux, aux autres co. MER.
quillages, & généralement à tous les
corps qui se présentent, sont composées de deux portions, l'une extérieure
de forme cylindroïde ou conoïde, &
l'autre intérieure de forme pyramidale
quadrangulaire.

La premiere de ces portions ressemble à un calice formé de douze pétales triangulaires oblongues, liées intimement les unes aux autres, dont six plus épaisses ont leurs pointes vers le haut, & six plus minces ont les leurs renver-

fées.

La seconde est composée de quatre valves triangulaires à coulisse, que l'animal a la faculté d'écarter les unes des autres par leurs pointes, pour en faire

Tome I. Cc

AO2 COQUILLES MULTIVAL VES

fortir un panache, au moyen duquel il IV. FAM. se procure sa nourriture. Cette famille ne contient qu'un seul genre. MER.

918. Quatre groupes de Glands de mer, & la portion intérieure détachée d'un autre Gland de mer: sçavoir, le premier groupe de deux Glands violets de diverses nuances, d'environ deux pouces de diametre dans le bas, & de presque autant de hauteur, à pétales épaisses chargées de stries longitudinales, & pétales minces striées transversalement, espèce nom-\* Arg. pl. mée Gland de mer Turban \* : le second de deux 26. lett. A. Gual. tab. 106. glands de forme moins renssée, de plus de deux pouces de haut sur un pouce de diametre dans le bas, à pétales épaisses amaranthe clair, & pétales minces violet nué de blanc, striées comme

celles des précédens, & de l'espèce nommée

Gland de mer Tulipe \*: le troisieme d'un grand \* Rumph. tab. 41. lit. A. nombre de petits Glands violet clair & blancs, litt. E.

lett. C.

no. 15.

litt. H.

adhérens à un grand Lépas, & nommés sim-\* Arg. pl. 26. plement Glands de mer rayés \*, & le quatrieme d'un grand nombre d'autres Glands blanc sale, très-petits, & conservant presque tous leur \*Gualt. tab. portion intérieure \*: ce dernier est de nos mers;

les trois premiers viennent des Indes. 106. litt. G. Bonan, cl. T.

919. Deux Glands de mer: sçavoir, un rare, violet, dont les pétales épaisses sont chargées d'épines, & nommé Gland épineux ; il adhère

à une valve de Conque anatifere; un de la Méditerranée, conservant ses valves intérieures, IV. FAM. fixé sur une petite branche de Corail rouge, & GLANDS DE recouvert en entier de cette substance; & une Moule Magellanique violette, à tête blanche, dont une des valves est chargée d'un grand nombre de petits Glands de mer blancs & lilas, à stries longitudinales ondées sur toutes les pétales, & garnis tous de leurs valves intérieures.

920. Un groupe de trois Glands de mer Turbans, & un de trois Glands de mer Tulipe, adhérens à un fragment de Moule Magellanique; deux Glands de mer revêtus de Corail rouge, liés ensemble par deux branches de même matiere; un d'Amérique, couleur de rose, dont les pétales épaisses sont sans stries longitudinales, mais seulement un peu rabotteuses, & dont les pétales minces finissent par une section oblique, ce qui en rend la bouche crénelée; & un Gland Turban adhérent à une valve de Crête de cog; en tout dix Glands de mer.

921. Quatre groupes de Glands de mer : sçavoir, un de plusseurs petits couleur de rose, adhérens à un Lithophite épineux, & formant un joli bouquet, auquel ce Lithophite sert de tige; trois autres de gros Glands Turbans, dont un de cinq, & deux de trois chacun; un Pétoncle & un Lépas de nos mers, chargés l'un & l'autre de petits Glands de l'espéce commune.

IV. FAM. MER-

Plus, une Coquille des mers du Nord, formée extérieurement comme les Glands de mer, mais GLANDS DE différente en ce que les douze pétales en sont un peu recourbées vers le haut, fix desquelles sont chargées chacune de quatre côtes striées transversalement, & en ce que la base en est concave, percée dans le milieu d'un trou rond, & divisée en plusieurs cellules étroites & profondes; espéce que l'on trouve adhérente à la peau des Baleines, & qu'on nomme par cette raison \* List. tab. Pou de baleine \*: en tout sept piéces.

445. f. 288. Gual. tab. 106. lett. Q.

022. Un groupe de fix Glands de mer blancs & de la forme d'un cône tronqué, à pétales épaisses chargées de stries longitudinales trèssaillantes en forme de rayons, de l'espéce nommée Clochette, & adhérens au dos d'un Crabe; un Gland de mer blanc nué de violet, à pétales épaisses & minces, mieux prononcées que les précédentes, ce qui lui a fait donner le nom de Gland de mer à côte de Melon : il est chargé d'onze autres petits Glands de même espéce; un Gland revêtu de corail rouge, tenant à une branche de même matiere, & représentant une tulipe avec sa tige; un groupe de Glands couleur de rose, & un de trois gros Glands Turbans; en tout cinq piéces.



# CINQUIEME FAMILLE.

CONQUES ANATIFERES OU POUCE-PIEDS;

Ces Coquilles, qui doivent le premier de ces noms à la fausse opinion où l'on pouce-étoit autresois que certains canards de PIEDS. mer y prenoient naissance, sont toutes remarquables par un pédicule plus ou moins long, qui leur sert de support. Nous n'en connoissons que trois espéces.

- r°. Celle qui a retenu le nom de Conque anatifere, & qui est composée de cinq valves à peu près triangulaires, assez dissérentes entr'elles, dont deux grandes & trois petites, portées sur un pédicule membraneux, long, étroit &
- 2°. Les Pouce-pieds de nos mers, lesquels sont composés de cinq valves inégales, dont deux ovales & convexes, deux lozanges, & une en sorme de bec,

ridé.

Cc iv

V. FAM.
POUCE-

ans compter un grand nombre d'autres plus petites qui toutes sont portées sur un pédicule court, large, noirâtre, chagriné & assez semblable à une bottine.

3°. Les Pouce-pieds des Indes, composés de huit grandes valves & d'un grand nombre de petites recourbées en façon de panache, & portées sur un pédicule large & long.

923. Un groupe de Conques anatiferes des Indes, adhérentes par leurs pédicules trèslongs, à un morceau de bois de fapin de qua-

\* séba, pl. torze pouces de hauteur \*.

16. n°. 1.

924. Un très-beau groupe de Pouce-pieds de nos mers, formant un bouquet de huit pouces tant de hauteur que de largeur, & de la plus parfaite conservation, sur lequel se trouvent quelques Moules entremêlées avec les Pouce-

\* Arg. pl.26. pieds \*.

lett. D.

925. Six variétés de Pouce-pieds: sçavoir, deux Pouce-pieds des Indes, rares, nommés Couronnes de serpens, tous deux solés & privés

\*566a, tom. de leurs pédicules \*; deux de nos mers, de la 2. pl. 61. n°. 8. Variété de ceux de l'article précédent; deux pl. 16. n°. 3. branches, l'une de trois, l'autre de cinq Con-47. litt. M. ques anatifères d'Europe, à pédicule large &

court ; dix Conques anatiferes, à pédicule mince, groupées ensemble 2; un paquet de V. Fam. plusieurs autres enfilées, & un morceau de bois PIEDS. de sapin, chargé de Conques anatiferes des Indes, de la variété de l'article 923.

2 Ibid. no.

Arg. pl. 26.



Cc iv

#### SIXIEME FAMILLE.

OURSINS.

VI. FAM.
OURSINS.

E sont des Coquilles de sorme voûtée plus ou moins convexe, composées d'une quantité prodigieuse de piéces de rapport fragiles, hérissées de pointes nombreuses qui tombent après la mort de l'animal, & qui laissent alors à découvert les apophyses & les petits trous sans nombre dont la Coquille est couverte.

Le célébre M. Klein, en donnant au Public deux distributions de ces Coquilles, tirées l'une de l'anus, l'autre de la bouche, dit qu'il en auroit pû faire une troisieme prise de la figure extérieure: c'est celle que nous présentons dans ce Catalogue, non comme la plus parfaite, mais comme la plus simple & la plus commode. Nous diviserons donc les Oursins en six genres; sçavoir, 1°. Les Oursins de forme hémisphérique ou sphéroïdale, nommés Turbans Oursins. (Cidares.)

- 2°- Les Oursins de forme ovoïde, échancrée d'un côte, à base un peu applatie, & à partie supérieure sillonnée, nommés Cœurs marins, Barillets ou Pas de poulain (Spatagi.)
- 3°. Les Oursins de sorme ovoïde sans échancrure, & sort convexe depuis la bouche jusqu'à la pointe tronquée, nommés Oeuss marins ou simplement Ovoïdes (Brissi)
- 4°. Les Oursins à pans irréguliers, de forme large & peu bombée, & ornés dans leur partie convexe d'une espéce de fleur à cinq pétales, nommés Pavois ou Boucliers (Scuta.)
- 5°. Les Oursins de forme applatie, ornés dans leurs deux faces de cinq feuilles, & percés ou non de quelques trous oblongs, nommés Gâteaux ou Beignets (Placentæ.)
  - 6°. Les Oursins de même forme que

410 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. OURSINS. les précédens, mais dont la moitié & plus de la circonférence est rayonnée ou dentée en forme de roue, tandis que l'autre moitié est entiere & arrondie, nommés Rotules (Rotulæ.)

#### GENRE PREMIER.

TURBANS.

926. L'EUX grands Turbans de la Méditerranée, couleur de rose, de forme sphéroidale, à fommet très-élevé, à bouche ronde, située, ainsi que dans tous ceux de ce genre, au milieu de labase, qui est un peu convexe, à grands & petits colures, chargés d'apophyses nombreuses en forme de grains de millet, qui ont sait donner à cette espèce le nom de Turban miliaire; & desquels l'un est encore hérissé de ses piquans jaune pâle, sins comme des aiguilles.

927. Deux grands Turbans miliaires de la même mer, violet foncé, de forme sphéroïdale, mais à sommet moins élevé que les précédens, hérissés tous deux de petits piquans ai-

\* séba, pl. guille fauve-gris \*.

<sup>12.</sup> n°. 9. Klein. pl. 1. 101. A. 928. Deux autres, dont un fauve-verdâtre, lett. A. à fommet élevé, à base applatie, & hérissé de

piquans verds, clair semés & un peu longs: l'autre est de la forme de ceux de l'article pré- VI. FAM. cédent, mais un peu plus petit, d'un beau violet, ainsi que ses piquans dont l'extrémité tire fur le blanc.

929. Deux très-grands Turbans miliaires de la Méditerranée, dépouillés de leurs piquans, de forme sphéroïdale, à petits colures nués de couleur de rose, de verdatre & de brun, à panneaux bien prononcés, dont les rangs de sutures sont fauve clair, à base presque platte, & nommés particuliérement Turbans à panneaux \*.

\* Gualt, tab. 107. litt. E.

930. Trois Turbans miliaires, dont deux de Klein. pl. 5. la Méditerranée, de la forme de ceux de l'ar-lett. B. ticle 927, mais plus petits, violets ainsi que leurs piquans; & un d'Amérique, dépouillé de ses pointes, de forme hémisphérique, & à bouche décagone de cinq grands & cinq petits côtés alternatifs \*.

\* Ibid. pl.

931. Sept Turbans miliaires: sçavoir, cinq 1. lett. D. armés de leurs pointes, dont un violet foncé, à piquans fauve clair; un noirâtre en entier; un marron, à piquans violets; un couleur de rose, à piquans blancs rabattus; un olive foncé en entier; & deux dépouillés de leurs piquans, dont un couleur de rose, à apophyses jaunes, & un violet, à apophyses fauve clair.

932. Douze Turbans miliaires, dont dix de

VI. FAM.

moyenne grandeur & deux petits, fix desquels sont hérissés de leurs piquans, & de couleurs variées: parmi ceux qui en sont privés, deux sont verds de diverses nuances, deux couleur de rose, un nué de couleur de rose, de fauve & de brun; tous les cinq à apophyses blanches, & un gris de perle en entier.

933. Trois Turbans d'Amérique: sçavoir, deux grands fauves, teints l'un de rougeâtre, l'autre de blanc, dépouillés de leurs piquans; tous deux à sommet élevé, à cinq espéces de pans arrondis, & à bouche décagone sinueuse dans les angles, nommés Turbans miliaires andre de les des les angles de les angles de l'aires de

\* Klein. pl. guleux \*; & un petit rare, noirâtre, hérissé de piquans très-longs & très-nombreux, nommé

\* Rumph. Oursin à soyes \*.

934. Huit Turbans dépouillés de leurs piquans, dont un grand & fept petits: sçavoir, le premier des Indes, rare, miliaire anguleux, à base & sommet applatis, à colures marbrés dans toute leur longueur de verd & de violet, & par bandes transversales de blanc, & à bandes percées de trous, larges, blanches & repré-

\* Arg. pl. 25. lett. H. Séba, pl. 11. n°. 6. A. B. Gual. tab.107. litt. M.

des Indes, rare, miliaire, verd pâle, à tête élevée, à colures grands & petits peu inégaux en largeur, chargés d'apophyses nombreuses, entre lesquelles les bandes percées de trous, paroissent à peine; deux de la Méditerranée, miliaires & applatis, à colures verd foncé, & à bandes percées de trous, blanches 1; deux de VI. FAM. l'Océan, miliaires aussi, très-applatis, & verd Oursins. foncé en entier 2; & deux de l'Isle de France, 10.10° 13. a.b. nués de fauve & de couleur de tuile, à cinq lett. B. grands & cinq petits colures, séparés par des bandes en filigrane, & apophyses de moyenne grandeur, qui ont fait donner à cette espèce le nom de Turbans à grains de petite vérole3. 3 Ibid. pl. 25

935. Huit Turbans dépouillés de leurs pi-lett. G. H. quans: sçavoir, deux des Indes, rares, à grains de petite vérole, dont un fauve clair, à bouche décagone finueuse dans les angles, & à base applatie; & un gris-vineux, à petits colures élevés, à grands colures enfoncés & dépourvus d'apophyses dans le milieu de leurs parties supérieures, & à bouche large, nommé le Turban turc 4; & six miliaires de la Méditerranée, 4 Rumph. des variétés déja décrites, dont cinq verds à tab. 14. litt. B. Klein. pl. 2. apophyses blanches, & un grisâtre.

lett. B.

936. Deux Turbans de l'Isle de France, à grains de petite vérole, peu communs: sçavoir, un violet foncé, recouvert en entier de grands piquans applatis en forme de spatules ou de pignons de pommes de pin, se recouvrant mutuellement, & ne laissant voir les uns des autres en dessus, que de petits pentagones dont l'arrangement imite celui des carreaux d'une chambre, à base hérissée aussi de petits piquans

## 414 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. OURSINS. que sa ressemblance à un artichaut, a fait appeller de ce nom; d'autres le nomment le Char-

\* Arg. pl. don\*; & un de même espéce, dépouillé, violet 25. lett. G. Klein. pl. 23. clair, dont la forme est alors elliptique, à base leu. A. B. platte, à bouche large & sinueuse, & à grand

\* Ibid. pl. nombre d'apophyses \*.

937. Idem.

938. Un grand Turban d'Amérique à grains de petite vérole, rare, de forme sphéroïdale applatie, noirâtre en entier, à piquans cylindriques longs & fins, chargés de stries longitudinales granuleuses qu'on ne distingue bien qu'à la loupe, & finissant tous par une pointe ob-

\* Séba, pl. tule & forée \*.

13. n°. s.

Rlein pl. 27.

18tt. A. B.

939. Un Turban des Indes, de forme elliptique, rare & très-bien conservé, à cinq grands & cinq petits colures, chargés chacun de deux rangs longitudinaux de grosses apophyses en forme de mammelons: cet Oursin est garni de ses dents, & hérissé dans le corps de gros piquans en forme de pieux de patissade ou de doigts, cendrés, rayés vers le bout & par zônes de fauve clair, longs, arrondis, finissant en

\*Ibid. pl.21. tiers point \*; & vers la base, d'autres piquans Arg. pl. 2) plus petits en forme de spatule, violet nué de sauve. Rumphius nomme cette espéce l'Oursin

\* Rumph. digité \*.

tab. 13. no. 2.
Séba, pl. 13.
940. Un grand Turban à mammelons, & di-

gité, de même forme que le précédent, mais hérissé dans le corps de piquans d'une variété VI. FAM. rare, en ce qu'ils sont très-longs, d'une seule Oursins. couleur verdâtre, & ornés d'une côte longitudinale en vive arrête, qui les fait paroître comme triangulaires; les piquans de la base sont en forme de spatule, beaucoup plus courts, & violet nué de fauve \* : cet Oursin est garni de ses dents, & porte près d'un pied de diametre en mesurant de l'extrèmité des piquans d'un côté, à l'extrémité des piquans de l'autre.

941. Un Turban à mammelons de la Médirerranée, peu commun, de forme sphérique, noirâtre, à gros piquans gris, à-peu-près cylindriques, & cannelés vers l'extrémité qui est arrondie \*.

\* Ibid. no. 30

942. Un Turban à mammelons de l'Isle d'Amboine, sphérique, noirâtre, à gros piquans peu longs, en forme de pilon, chargés de stries longitudinales granuleuses bien prononcées vers l'extrémité, qui s'élargit & forme une espèce de tête sur laquelle les stries se prolongent en façon de rayons \*.

\* Ibid. R.

943. Deux Turbans à mammelons de la 10. Méditerranée, de forme sphérique, l'un fauve dépouillé de ses piquans, garni de ses dents, à cinq grands colures chargés chacun de deux rangs de mammelons, & séparés les uns des autres par des bandes onduleuses dont les bords

# A16 COQUILLES MULTIVALVES

VI FAM. OURSINS. 1 Rumph. Klein. pl. 31 lett. C.

Arg. pl. 250 lett. E. litt. E.

Bonan. cl. 1. n°. 17 & 18.

lett. D.

sont en filigrane, nommé le Turban maure & un Turban maure garni de ses piquans ronds très-longs, s'amincissant de leur base à leur extab. 14. no. 3. trémité, striés en longueur, & forés dans le bout 2,

944. Quatre Turbans à mammelons : sca-Gual. tab 108. voir, un de la Mer Rouge, blanc sale, dé-<sup>2</sup> Ibid. lit. D. pouillé de ses piquans, de sorme hémisphérique, à cinq grands colures chargés de deux Arg. pl. 25. doubles rangs de mammelons, & cinq petits colures chargés d'un double rang seulement 3; & trois Turbans maures un peu moins grands que les précédens, dont deux dépouillés de leurs piquans : on a enlevé la base & le sommet de l'un de ces Oursins, & on donne à part les dents & osselets, formant ce que l'on appelle la Lanterne d'Aristote : le troisieme est garni de les piquans grands & petits.

945. Cinq Turbans à mammelons : sçavoir, deux d'Amérique, à piquans gros & courts, grisâtres, striés & granuleux, terminés par une 4 séba, pl. couronne platte, d'où sort un petit mammelon radié 4; un de même espéce, dépouillé de ses pointes, remarquable en ce que, quoique les grands colures en soient fort larges, on n'y trouve que deux rangées de gros mammelons, féparées par un amas d'autres très-petits; & deux Turbans maures, l'un garni de ses piquans, l'autre d'un beau violet dépouillé des fiens. 946.

\$7. nº. 11. Rumph. tab. 33. nº. 4.

946. Huit Turbans dépouillés de leurs piquans, & par pendans: sçavoir, deux grands VI. FAM. à mammelons, de l'espéce de celui de l'article Oursins. 940 \*; deux moins grands, qui ne différent de \*Gualt. tabi ceux-ci qu'en ce que les apophyses de leurs petits colures ne se continuent point jusqu'au fommet; ils appartiennent à l'espèce de l'arti- \*Rumph. cle 939 \*; & quatre à grains de petite vérole, Gual tab.108. dont deux à base un peu convexe, & à grosses Klein. pl. 3. apophyles peu nombreuses \*; & deux comme lett. A. B. 1812. 20 le dernier de l'article 936.



# GENRES II & III.

CŒURS MARINS ET ŒUFS MARINS.

947. CINQ Cœurs-marins: sçavoir, un de nos mers, de forme large & médiocrement OURSINS. convexe, orné en dessus d'une fleur à cinq pétales en forme d'étoile, quatre desquelles sont bordées d'une double rangée de petits trous; fémé dans le reste d'apophyses inégales & peu saillantes, à échancrure peu profonde dans le haut, qui se prolonge jusqu'à la bouche : celleci est près de la circonférence, ainsi que dans 7 Arg pl. 25. tous les Ourfins de ce genre 1; & quatre de lett. K. forme plus oblongue & plus bombée, dont un de nos mers, à illon large & affez profond, qui passe du dos jusqu'à la bouche, accompagné fur le dos seulement de quatre autres plus petits posés obliquement, percés chacun de quatre

<sup>2</sup> Ibid. let. T. très-fines, espéce nommée *Pas de poulain* <sup>2</sup>; Gual. tab. 109. un de même espéce, revêtu encore de ses pilitt. D. Séba, tab. 100. quans capillaires <sup>3</sup>; un d'Amérique, de même n° 2.1. a. b. <sup>3</sup> Klein. pl. forme & de même grandeur, mais dissérent en

rangées de trous, & à robe semée d'apophyses

28. litt. A. B. ce que les fillons en font étroits, profonds &

4 Gualt. tab. sinueux 4; & un de nos mers, plus gros, de

forme un peu plus oblongue que les précédens, & ne différant d'ailleurs du second qu'en ce que VI. FAM. les fillons en sont tous très - profonds; espèce Oursins. nommée Tête de mort \*.

948 Les mêmes Oursins, avec cette diffé-tab. 14. nº . 2. Bonan. cl. 1. rence que le premier est ici plus bombé, & no. 16. que le quatrieme est couvert en partie de ses

\* Rumph.

piquans capillaires.

949. Sept Oursins : sçavoir, quatre Ovoïdes ou Eufs marins, dont un de forme étroite, gris en dessus, blanc en dessous, à quatre larges fillons partant d'une cavité garnie de quatre trous, ornés chacun de quatre rangées de petits trous, & entourés d'un autre fillon trèsléger, qui représente une espéce de demi - dalmatique, à base un peu convexe, & à trèsfines apophyses\*; un de même espéce, couvert \* Klein. pl. en entier de ses piquans capillaires gris, lesquels 3. lett. D. Gual. tab. 109. reffemblent à de gros poils de souris; deux d'A-lit. A. Rumph. tab. mérique, l'un blanc sale, qui ne différe du 14, n° 1. premier qu'en ce qu'il est plus petit, & à pro-no. 22, d. b. portion plus bombé \*; & l'autre gris en entier, peu commun, de forme large, à robe semée 19. a. b. d'apophyses blanches entourées chacune d'autres plus petites, à fillons ponctués très - profonds, entourés d'un autre étroit & peu prononcé, dont le contour représente cinq bastions avec leurs flancs & leurs courtines: les trois autres sont des Cœurs-marins, dont un de

# A20 COQUILLES MULTIVALVES

VI. FAM. OURSINS!

l'espèce du premier de l'article 947; & deux Pas de poulain de nos mers, de la variété du second du même article, l'un desquels est garni de ses piquans.

950. Idem.

951. Un très-rare & très-bel Oursin ovoïde, de forme large un peu élevée, gris nué de fauve en dessus, blanc en dessous, orné comme les précédens dans sa partie convexe, d'une étoile à cinq rayons, dont quatre seulement sont percés de petits trous, à intervalles des rayons formant un compartiment chargé d'apophyses assez grosses, entourées d'autres très - fines, à apophyses du dessous disposées d'une façon très-élégante, & chargées chacune de petits grains, qui à la loupe brillent comme autant de perles. Cette Coquille que les Hollandois regardent comme une variété de celles qu'ils ap-

\* séba, pl. pellent Têtes-mortes \*, porte plus d'un demi-14. no. 5 & 6. pied de long sur quatre pouces de large.



# GENRE QUATRIEME.

PAVOIS OU BOUCLIERS.

952. 3 IX Oursins de différentes grandeurs: fçavoir, deux grands d'Amérique en pendant, VI. FAM. de forme un peu convexe en dessus, à base concave vers le centre, à cinq pans arrondis, ornés dans leur partie convexe d'une rose à cinq larges pétales bombées, bordées chacune d'une double rangée de petits trous, & dans leur partie concave, d'une étoile à cinq rayons caves & étroits, à robe semée dans toute son étendue de petits cercles creux dans lesquels font les apophyses, espéce que sa ressemblance avec un Bouclier, a fait appeller de ce nom \*; \* Klein. pl. un des Indes, moins grand, plus convexe en 9. 1ett. B. dessus, & plus concave en dessous que les pré-no. 2 & 3. cédens; un plus petit, qui en dissére en ce qu'il litt. A. est plus applati, que la base n'en est presque point concave, & que les cinq pans en sont mieux marqués: variété nommée Pavois angulaire \*; deux encore plus petits, de forme el- \* klein. pl.
liptique, à base un peu convexe, à sommet 10 lett. C.
Séba, pl. 15. percé de quatre petits trous, d'où partent cinq no. 13 & 142 paires de rayons formant autant de pétales qui

Dd iii

### A22 COQUILLES MULTIVALVES.

VI. FAM. OURSINS. I Rumph. Séba, pl. 15.

11°.33 & 37. <sup>2</sup> Klein. pl. 16. lett. A. B. 3 1bid. pl. 20. lett. H.P.

fe prolongent jusqu'à la base 1. Plus, un grand Bouclier de l'espèce des deux premiers, coupé en trois pour faire voir les cloisons intérieures<sup>2</sup>; tab. 14. litt. D. & dix Osselets en forme de soc dentelé, dont font composées les cinq doubles dents molaires, & les cinq dents canines du même Oursin3.

> 953. Un très-beau Pavois d'Amérique, portant près de neuf pouces de long sur sept & demi de large, de forme platte, à pétales plus oblongues & moins bombées que dans les premiers Boucliers de l'article précédent, à panneaux quarré-long, larges & bien prononcés; espéce nommée le grand Pavois applati, & ayant, ainsi que tous les Oursins de ce genre, la bouche au centre, & l'anus au bord de la base.



# GENRE CINQUIEME.

GATEAUX OU BEIGNETS.

954. DEUX Ourfins plats de l'Isle de Bourbon, ornés tant en dessus qu'en dessous d'une VI. FAM. fleur à cinq pétales, dont l'inférieure a ceci de particulier que les feuilles s'en fousdivisent & se ramissent en plusieurs autres : ils sont percés de part en part de six larges fentes, dont cinq placées près des bords à l'extrémité de chaque pétale, & la sixieme entre les deux pétales de la partie inférieure qui est la plus large \*: cette espèce nommée Pain d'épice, a la bouche au centre, & l'anus près de la troisseme partie de nº. 5 & 6, l'axe. Plus, un Oursin de même espéce, coupé en trois pour en faire voir le dedans, avec ses offelets.

\* Klein. pl. 29 8 26. Séba, pl. 15

955. Trois Pains d'épice: sçavoir, un de la Vera Cruz, peu commun, à cinq fentes, donc une au-dessous de l'anus, & quatre latérales \*; un plus rare encore, à deux fentes seulement ri. lett. C. Gual. tab. 170vers le bas, & ayant l'anus près de la circon-lit. E. férence \*; & un de la Barbade, à six fentes, qui nº. 9 & 10. ne différe des deux de l'article précédent, qu'en zx. lett. B.

\* Klein. pla

Dd iv

ce que les fentes en sont plus longues & moins

VI. FAM. larges \*.

Oursins.
\* Klein, pl.
956. Trois autres: fçavoir, un de la côte Co24. lett. A. B. romandel, à fix fentes étroites, conservant ses
\$66a, pl. 15.
piquans capillaires gris - cendré, de forme plus

piquans capillaires gris - cendré, de forme plus mince & plus platte que les précédens, un de la Barbade, à fix fentes, & un de la Vera Cruz à cinq, femblables à ceux de l'article précédent,

957. Quatre Ourfins plats: sçavoir, deux de forme orbiculaire peu réguliere, à bords un peu relevés, ornés dans leur partie supérieure d'une fleur à cinq pétales, mais dépourvus de fentes; espéce nommée Beignets ou Médailles\*; & deux

\* Rumph. tab.14. litt. E. Gual. tab.110. litt. B. C.

litt. B. C. Séba, pl. 15. p°. 25 & 26. Klein. pl. 12, lett. D.

Pains d'épice, l'un à cinq & l'autre à fix fentes.

958. Deux Oursins rares, de forme platte & circulaire, mais un peu sinueuse dans son pourtour : sçavoir, un de couleur terreuse, à sommet un peu élevé, d'où partent cinq pétales dont les extrémités se partagent en deux lignes

qui s'écartent & se prolongent jusqu'à la circonférence; le dessein de sa robe, qui imite assez le rézeau de certaines toiles d'araignée, lui a fait donner le nom d'Arachnoïde \*: la bouche en est au centre de la base, & l'anus à la circonsérence; & un Arachnoïde dissérent en ce que la couleur en est lie de vin noirâtre, la forme plus platte, les extrémités des pétales moins divergentes, & que l'anus en est placé un peu en

\* Ibid. pl. 11. lett. A. Gual. tab. 110. litt. G.

dessus.

### GENRE SIXIEME.

ROTULES.

met un peu élevé, orné de cinq pétales affez VI. Fam, femblables à la fleur du jasmin, & à douze rayons dans la moitié de sa circonférence; espéce nommée l'Oursin solaire\*: la bouche est placée comme dans ceux du genre précédent; Klein, pl. 122. lett. C. mais l'anus est à la troisieme partie de l'axe; & séba, pl. 152. deux peu communes, de forme plus applatie, n°. 15 & 162. ornées dans la moitié de leur circonférence d'onze échancrures, trois desquelles sont plus prosondes; ces Oursins ont aussi deux sentes latérales vers la partie non échancrée\*.

960. Idem, à ces différences près que l'Oursin 12. lett. A. B. folaire n'a que dix rayons, & que l'une des litt. H. deux autres Rotules, a trois échancrures dans n°. 17 & 18. la partie de la circonférence qui en est ordinai-

rement dépourvue.

961. Un grand Carton très-intéressant, contenant quarante petites boëtes de dissérentes parties séparées d'Oursins, de tous les genres précédens: sçavoir, 1° des Oursins coupés en divers sens pour en faire voir les parties intétieures: 2°, les dents & les osselets de plusieurs

# 426 COQUILLES MULTIVALVES, &c.


VI. FAM.
OURSINS.
\* Séba, pl.

espéces, formant ce que l'on appelle la Lanterne d'Aristote\*, dont une entiere, & les autres séparées; 3°. des piquans de toutes grandeurs, parmi lesquels il s'en trouve deux espéces extrêmement rares, dont on ne connoît point les Oursins; l'une est cylindrique, granuleuse & remarquable par des espéces d'anneaux ou de moulures dentelées, placées à distances égales; l'autre espéce est en forme de sustante longitudinales granuleuses, hérissées de piquans très-pointus, &c. &c.

961. (bis) Cinq Bocaux contenant douze Coquilles avec leurs animaux dans l'esprit-devin: sçavoir, un Lépas, une Tonne nommée l'Oublie, un Peigne, un Manche de couteau, une Came pholade, un Dail, une Pholade multivalve, un Buccin occupé par un Bernard l'hermite, deux Conques anatiferes, un Pouce-pied, & un Oursin.

a, & un Ourjin.





## SECTION SECONDE.

#### Coquilles Fluviatiles.

pas assez nombreuses pour pouvoir suivre ici le même ordre que dans notre premiere Section, nous les diviscrons seulement en deux classes, les Univalves & les Bivalves. La premiere de ces classes ne renserme que six familles relatives à celles des Univalves de mer; sçavoir, les Lépas, les Plan Orbis, les Limaçons, les Buccins, les Tonnes & les Vis. Nous n'en connoissons même que deux dans la classe des Bivalves, qui sont les Cames & les Moules ou Tenilles; ce qui nous engage à n'en point faire de subdivisions.



### CLASSE PREMIERE.

UNIVALVES D'EAU-DOUCE.

962. VINGT - SIX petites Boëtes contenant plusieurs Coquilles sluviatiles des trois premieres familles: sçavoir, six petits Lépas du lac de Genêve, blancs, lisses, à tête pointue & re-\*Gualt. tab. courbée, & à bouche ovale \*; fix autres du 4. litt. AA. même lac, différens des précédens en ce que la robe en est réticulée, que la tête s'en éleve & recourbe davantage, & qu'on remarque dans le bord opposé au recourbement du sommet. une petite fente ou entaille, qui s'éleve jusqu'au \* List. tab. quart de la Coquille \*; un autre petit de la for-543. f. 28. me d'un demi-ovoïde, olive & transparent, orné de trois lignes longitudinales bleues par-\* Ibid. f. 27. tant du fommet comme autant de rayons \*; deux verd foncé, à stries circulaires inégales, à base presque ronde, & à tête élevée sans être sensiblement recourbée; quatre de la riviere des Lataniers dans l'Isle de France, dont deux à sommet un peu recourbé, & deux à appendice en demi-cornet; trois Tuyaux formés d'un amas de petites Coquilles fluviatiles, principalement de Plan-orbes & de Buccins, de petits brins &

filamens d'écorce & de bois, lesquels ont servi d'habit & de logement à une Teigne aquatique; huit autres Tuyaux à-peu-près semblables, de la riviere des Gobelins; trois autres Teignes de le fontaine de Verri près Genêve, revêtues de bois & d'écorce ; quatre Limagons à bouche ronde \* olivâtres, à zônes marron, de forme \* Arg. pl. bombée & élevée, dont un du lac de Genève, 27. f. 2. un de la Loire, & deux de la Seine; une petite f. 26. Gualt, tab. 50 boëte d'Opercules marron clair, papyracés, litt. A. Séba, pl. 39. provenant de la même espéce de Limaçons; n°. 33 & 34. un Limaçon d'Amérique, du même genre, blanc dans le corps, à base & tête violettes, & à bouche presque triangulaire; cinq des Indes, de l'espéce du précédent, violets nués de blanc, à bouche formant un peu moins le triangle; trois Plan - orbes fauves des étangs d'Aranjuez \*; trois Plan - orbes d'Amérique, \* Gualt. tab. dont un blanc, de forme très-rensiée, & deux 4. litt. D. D. gris ; deux Plan - orbes de la riviere des Gobelins, l'un blanc & l'autre marron \*; deux de la \* Arg. pl. Seine; deux petits du lac de Genève, de for-27. f. 8. me très-applatie, & à spirale chargée dans son fig. 41. milieu d'une côte mince en vive arrête, & six petites boëtes contenant chacune douze petites Nérites de différentes rivieres de l'Europe \*.

963. Un Limaçon à bouche ronde d'Amé-f. 3. Gualt. tab. 4. rique, rare, fauve-blanc, marbré par zônes litt. Lt. List. tab. 4. de taches quarré-long fauve-roux, à coque f. 38.

mince & transparente, umbiliqué, & à lévres formant dans toute la circonférence de la bouche, un bord très-saillant, mince & plat; & deux Buccins non moins rares, blancs, à coque mince, à fix orbes, dont le premier est remarquable par un double applatissement du côté de la bouche, à lévres sinueuses & retroussées formant une espéce d'oreille, & umbiliqués.

.964. Une Nérite des Indes, rare, verd foncé, à fix épines forées, placées le long du milieu de la spirale, de plus en plus grandes à mefure qu'elles approchent du bord ; la derniere de ces épines est plus longue que la Coquille

\* Arg. pl. 7. même, qui conserve encore son opercule \*.

965. Deux Nérites rares, dont une verd de terrasse nuée de brun vers la tête & les bords, à stries fines transversales, à lévre intérieure dentelée, & extérieure finissant en une espéce \* Gualt, tab, d'oreille ou d'umbilic \*; & une de même espéce, polie & devenue blanche en dessus.

4. lit. HH.

066. Une très-grande Nérite du Mississipi, verd-noirâtre, ventrue & umbiliquée, à stries inégales en forme de rides, qui partant d'un peu au - dessous de la clavicule, viennent toutes se perdre dans l'umbilic; espéce connue sous le

\* List. tab. nom d'Idole \*.

125. f. 25.

967. Une Idole un peu moins grande que la précédente, dépouillée de son épiderme, & mi-partie de fauye & de blanc:

968. Un Carton contenant dix - huit petites boëres de Buccins fluviatiles : sçavoir, deux du Mississipi, rares, de forme oblongue, à bouche étroite & sinueuse, dont un revêtu de son épiderme verdître, l'autre dépouillé & gris de lin; un des Indes, ventru, blanc sale, marbré par taches longitudinales, & quelques zig-zags de rouge-brun; deux autres des Indes, de forme un peu moins renssée, & plus petits 1; un grand 1 Gualt. tab. des fossés de Genève, blanchâtre, ventru, à 5. litt. N., coque mince & clavicule très-pointue 2; deux 2 Ibid.litt.L. des canaux d'Aranjuez, femblables au précédent, à cela près qu'ils sont plus petits & moins ventrus 3; deux de la Loire, & deux de la Midd. litt. L. Seine, à-peu-près semblables; deux petits des List, tab. 123, fossés de Genève, papyracés, à coque blonde & transparente 4; trois du même endroit, fort 4 Ibid. f. 23. ventrus, à bouche encore plus évasée, & re-litt. F. gardés par M. d'Argenville comme de petites Tonnes fluviatiles 5; deux d'auprès de Valence 5 Arg. pl. en Espagne, blanc de lait, à sept orbes renssés 27. f. 7. & à petit umbilic 6; deux fort petits du lac de f. 22. Gualt. tab. 5. Genève, blancs, ventrus, à bouche ronde 7; litt. G. quatre de la Marne, & seize de la Seine, à- 108. f. 1. peu-près de même forme ; deux colorés de la Gualt. tab. 5. riviere de S. Thomé aux Indes orientales; cinq 7 Ibid. lit. B. de la Virginie, en forme de sabots, à petite côte aiguë sur le milieu du dernier orbe 8; six de la Lézarde; deux de l'Isle de France, peu com- 111. f. 5.

### 432 COQUILLES UNIVALVES

muns, verd foncé, à sept orbes couronnés de tubercules aigus en forme d'épines, & nom-\* Arg, pl. 27, més *Thiares fluviatiles* \*; & cinq petites Thiares

Rumph. tab. fauves de la riviere de S. Thomé.

Rumph. tab.

969. Vingt Coquilles fluviatiles: sçavoir, deux Buccins blancs, nués de gris de lin, marbrés par flammes longitudinales de marron, à tête couleur de rose, & à fix orbes renssés; deux comme les quatrieme & cinquieme de l'article précédent; un des Indes, à bouche presque ronde, gris de lin tacheté par zônes de rougebrun; un autre rare, blanc rayé par zônes de fauve, à neuf orbes, dont les cinq derniers forment une clavicule aigue, & les quatre autres renssés, finissant par une bouche ovale à doubles lévres retroussées en dehors, à stries sines longitudinales, & umbiliqué; deux petits peu communs, à cinq orbes renssés, terminés par une bouche saillante & toute ronde \*; deux

\* Arg. pl. une bouche faillante & toute ronde \*; deux

Thiares femblables aux antépénultiemes de l'article précédent; une plus petite, marron clair;
une rousseâtre, grande & ventrue, à coque épaisse; une autre fauve; une petite blanche nuée de fauve, rare en ce que les épines qui couronnent les orbes, en sont moins nombreuses & plus réguliérement disposées; une Vis des Indes, rare, fauve-blond, marbrée par flam-

mes longitudinales de rouge-brun, à cannelures

\* List. tab. en même sens, & à stries circulaires très-fines \*;

Exp. f. 12.

& cinq petites Vis brunes de la riviere de S. Thomé, à stries longitudinales & transvertales formant un rézeau granuleux.

### CLASSE SECONDE.

BIVALVES D'EAU-DOUCE.

970. LINQ Cames fluviatiles, de forme à-peu-près ovale: sçavoir, deux grandes & fort épaisses du Mississipi, dont une revêtue de son épiderme noir, à grosses côtes obliques & onduleuses en forme de rides, à stries circulaires fines & serrées, blanche nacrée en dedans, & à charniere formée dans l'une des valves, d'une très-grosse dent striée sous le sommet, & d'une longue avance latérale, qui s'engrainent dans les cavités & la rainure correspondantes de l'autre valve; & une d'une autre espéce, dépouillée, nacrée d'un très-bel orient tant au dedans qu'au dehors, & ornée de zônes alternatives blanches & couleur de chair : sa charniere différe de la précédente en ce que la grosse dent des sommets se subdivise en plusieurs lames striées & dentelées dans l'une & l'autre valve \*; une petite des Indes, revêtue en partie de son épiderme brun, 150. qui couvre une très-belle nacre, & à charniere

\* List. tab.

Tome I.

434

formée de deux dents latérales; une petite des fossés de Genève, à stries sines circulaires, & à robe verte de plusieurs nuances; & une trèspetite du lac de Genève, verd d'eau, de forme plus applatie, mais du reste semblable à la précédente.

971. Deux Cames du Mississipi, de l'espéce des deux premieres de l'article précédent, mais


plus grandes.

972. Deux grandes Cames ovales du même fleuve, dont une revêtue en partie de son épiderme noir, qui dans les endroits où il a été enlevé, laisse paroître une très-belle nacre blanche en dehors, jouant l'opale en dedans; & une dépouillée jouant l'opale tant en dehors qu'en dedans, & déployant toutes les couleurs de l'arc-en-ciel: leur charniere est de la premiere espèce décrite dans l'article 970.

973. Vingt-deux Moules ou Tenilles sluviatiles: sçavoir, deux grandes Tenilles d'étang, à coque très-mince, lisse, traversée de quelques rides, à sommet placé vers l'extrémité la plus large, & à charniere formée d'un filet longitudinal & d'une rainure correspondante peu sensible, toutes deux nacrées, & l'une re-

<sup>\*</sup> List. tab. vêtue de son épiderme verdâtre \*; une autre 176. f. 11. Gualt. tab. 7. moins grande, mais plus bombée, à coque plus épaisse, conservant en partie son épiderme noirâtre: sa charniere est encore moins sensible qu'aux

précédentes \*; deux grandes du Mississipi, àbord \* Lift. tab. finueux dans son milieu, à léger fillon s'éten-155. f. 10. dant de la tête à cet endroit, à coque trèsépaisse, & à charniere de la premiere espéce décrite article 970 : l'une est blanche & dépouillée, l'autre conserve son épiderme noirâtre \*, une de la riviere de Connel en Ecosse; \* Ibid. tab. deux des rivieres d'Irlande, blanches, revêtues 149. fig. 4. de leur épiderme verdâtre, & aux valves defquelles adherent de très - petites perles ; deux de la Vologne en Lorraine, de forme un peu large & renflée, revêtues de leur épiderme noirâtre; & une petite boëte contenant douze perles provenant des Moules de corte espéce; deux de la riviere des Gobelins, à bords finueux d'un côté, à coque mince, revêtue de son épiderme verd clair \*; une de la Loire, dépouillée, \* Arg. pl. 27. & d'une très-belle nacre \*; une du Tage, de forme moins allongée, & deux de la Seine, oblongues, toutes trois dépouillées \*; deux du \* Ibid. Danube, jaune-verdâtre, rayonnées \*; une de \* Lift. tab. la Marne, de même couleur, mais non rayon- 146. fig. 1. née \*; deux petites du lac de Genève, papyra-\* Gualt, tab. cées, de forme très - applatie, & à bords si- 7. litt. D. nueux; & une très-petite des fossés de Genève, de forme à-peu près semblable, à stries transversales onduleuses & égales.



# SECTION TROISIEME.

COOULLES TERRESTRES.

Es Coquilles ne formant qu'une seule classe composée des trois familles suivantes, les Limaçons, les Vis & les Buccins, nous suivrons le même ordre que dans la Section précédente, sans entrer dans aucune sous-division.

974 Quatre Limaçons à bouche ronde, &

umbiliqués, peu communs: sçavoir, un blanc marbré de jaune - roux, à bande transversale blanche, croifée d'une autre longitudinale de même couleur, à tête élevée, à six orbes renflés, & à lévre extérieure bordée en dehors \* Lift. tab. d'un gros anneau ou bourrelet \*; un plus petit, qui en différe d'ailleurs en ce que son sommet est moins élevé, que sa robe est blanche, à stries fines circulaires, & ornée dans le milieu d'une bande marron; un à-peu-près de même forme, à robe bariolée en rézeau de blanc & de souci, à pas des orbes bordés d'une suite de petits quarrés blancs & orangés, à base blanche ter-

53. f. 48.

minée par une large bande orangé, & à lévres retroussées en dehors; & un à tête élevée, à bandes circulaires gris-bleuâtre, fauve & marron, à lévres faillantes & presque applaties.

975. Un Limaçon rare de la Chine, gris de lin, à bouche & pas des orbes bordés d'une petite zone blanche, & ceint dans le milieu du corps, d'une autre de même couleur qu'une ligne blanche bordée de rouge, traverse en forme de croix. M. d'Argenville a rangé cette Co-

quille parmi celles de mer \*.

\* Arg. pl. 6. lett. B.

\* List. tab.

976. Six jolis Limaçons à bouche presque ronde, & peu communs: sçavoir, un de la Chine, verd nué de violet, à pas des orbes couronnés de rayons blancs, dont plusieurs se prolongent sur le corps en zig-zags jaunes, & à deux petites bandes longitudinales de même couleur vers l'extrémité du premier orbe; & cinq d'Amérique, dont deux jonquille, à bouche & pas des orbes bordés de rouge & de blanc, & de plus ornés d'une petite bande longitudinale blanche vers le milieu du premier orbe\*; un fauve, à bouche & pas des orbes bordés de brun, & orné dans le milieu du corps 55. £. 60. d'une petite zône blanche bordée de brun; & deux verd foncé, l'un desquels a la bouche & les pas des orbes bordés de jaune pâle.

977. Un gros Limaçon à bouche presque ronde, rare, à robe marron, imitant la cou-

Ee iii

Jeur & l'éclat de la fardoine, à quatre zônes blanches dans le corps, dont la derniere se prolonge sur tout le bord de la spirale jusqu'à la

\* Lift. tab. clavicule, & à lévre extérieure en bourrelet \*.

978. Un autre de l'Amerique meridionale, non moins rare, à robe marron, ornée vers le bas d'une large zône blanche, qui s'étréciffant à mesure qu'elle s'éleve davantage, se change à la naissance de premier orbe, en une simple ligne jaunâtre jusqu'à la clavicule qui en prend la couleur, à bouche rouge de corail clair, &

\* 56ba, pl. à lévre extérieure large & retroussée \*.

979. Deux gros Limaçons à bouche presque ovale, peu communs, dont un a deux larges zônes dans le corps, l'inférieure rousse, & la supérieure fauve, qui se prolongent sur tous les orbes: l'autre à robe blanche, tous deux à clavicule brune, de forme large, umbiliqués &

\* Arg. pl. de l'espèce nommée Œil de bœuf \*.

che cualt. tab.r. 980. Deux grands Limaçons rares, à bouche ovale, à zônes alternatives marron, & blanches nuées de bleu, à fix orbes peu élevés, dont le premier est très-bombé, à large & profond umbilic, & à lévres bordées d'o-

\* Séba, pl. rangé \*.

40. n°. 3 & 4. 981. Six Limaçons de l'espéce des précédens, fçavoir, un grand couleur de noisette, à bouche bordée en dedans d'aurore vif, & en dehors de blanc, ainsi que l'intérieur de Tumbilic qui

est très-large, & à pas des orbes un peu concaves \*; un verd clair, à quelques bandes lon- \* Gualt, tab. gitudinales brunes; un rayé par zônes de verd 2. litt. T. clair & de marron; un noisette & un marron, à zônes brunes peu prononcées; & un fauve de diverses nuances, à deux zônes étroites brunes, dont la derniere se prolonge sur tous les orbes, & à umbilic moins grand que les précédens.

982. Douze Limaçons à bouche ovale : sçavoir, un verd clair, à deux doubles zônes brunes dans le bas du corps, à sommet plus élevé, mais du reste semblable à ceux de l'article précédent; deux de la côte Coromandel, peu communs, verd plus foncé, à très-petit umbilic, & conservant leurs opercules; six d'Amérique, à spirales roulées l'une sur l'autre comme dans les Planorbes, à un côté plus concave & umbiliqué, nommés Cornets de Saint-Hubert, dont deux rayés par zônes de blanc & de brun; deux d'olive & de marron, & deux de fauve clair & de marron \*; & trois autres Cornets de Saint- \* Arg. pl.28. Hubert, très-petits, à sept orbes roulés dans f.6. Rumph. tab. un même plan.

983. Deux Limaçons rares, à bouche ovale comprimée, & dont le milieu du premier orbe forme un pli en vive arrête: sçavoir, un blancgrisâtre, à robe très-finement réticulée, à quatre orbes presque dans un même plan, à sommet applati & à base un peu convexe \*; & un \* Guait. tab.

gris-de-lin rayé de brun, à peu près de même forme, mais un peu plus convexe, à stries longitudinales obliques granuleuses & à lévre extérieure en hourrelet.

984. Deux autres non moins rares & umbi-

liqués, l'un de forme large un peu applatie, à robe fauve clair, ornée par zônes de chevrons canelle & rouge-brun, & à bouche en demiovale, dont les lévres sont légérement retrous-\* séba, pl. sées \*, l'autre de forme plus élevée, à clavicule 40. nº. 22 & applitie, à robe fauve-roux, chargée de plis fins & onduleux blancs en forme de rides, à

List. tab. 76. bouche ovale sinueuse, & à lévres très-saillantes en dehors.

> 985. Un Limaçon rare, blanc, à petite bouche demi-ronde s'ouvrant du côté où est placée la spirale, à lévre extérieure retroussée, armée de quatre dents, & intérieure de deux seulement, de forme convexe des deux côtés, & à spirale marquée d'un simple sillon orangé très-

\* Arg. pl. étroit \*.

1.76.

28. f. 13 & 14. Lift tab. 99. 986. Un autre Limaçon rare, fauve-roux, 100. Bonan. cl. 3. de forme applatie, à six orbes un peu renssés, ng. 331. dont le plus bas est marqué dans son milieu

d'un pli en vive arrête, à base dont le centre est umbiliqué, & à bouche dont les deux lévres retroussées & sinueuses imitent assez les amfractuosités de l'oreile, & finissent par une es-

péce de goutiere qui se jette dans l'umbilic \*, espèce nommée le Labyrinthe.

\* Séba , pl. 40. nº. 24 85 25.

987. Idem.

988. Six jolis Limaçons peu communs: fçavoir, deux à bouche demi-ovale, de forme applatie, blancs bariolés de traits obliques fauves, à deux zônes marron, dont la plus élevée se prolonge sur toute la spirale, à lévres faillantes un peu finueuses, & umbiliqués \*; un fauve à bouche demi-ronde, à six orbes roulés l'un sur l'autre, s'enfonçant dans le milieu qui est umbiliqué d'un côté, & à lévres un peu retroussées, nommé le Cornet de chasseur \*; un à bouche demi-ovale, armée d'un côté d'une dent, à robe 3. litt. M. fauve, bordée le long de la spirale d'une zône 27. litt. R. blanche, à tête un peu élevée, & à lévres blanches retroussées; un fauve orné sur le milieu du corps d'une zône orangé, à tête applatie, & à lévres très-peu faillantes en dehors; & un blanc à stries fines circulaires, & à tête médiocrement élevée.

\* Ibid. no.

\* Gualt, tab. Rumph. tab.

989. Dix-huit Limaçons peu communs: sçavoir, deux blancs à bouche demi-ronde, à cinque orbes affaissés dans le milieu, à lévres saillantes, précédées d'un renflement transversal, & umbiliqués ; un de Valence en Espagne, à bouche demi-ronde peu retroussée, blanc, à deux zônes marron dans le bas du corps, bariolé dans le reste de traits & de zônes sauves; deux

blancs à bouche demi-ronde comprimée, à fix orbes applatis du côté de la clavicule qui est brune, renslés & umbiliqués de l'autre, & à \* Lift, tab. pli en vive arrête fur le milieu du premier orbe \*; 69. f. 62. un petit à peu près de même forme, mais à clavicule moins affaissée, à bouche demi-ovale, & à lévres finueuses retroussées, dont l'intérieure forme une espèce de dent; deux fauves de Geneve, à bouche sinueuse triangulaire, à sept orbes affaissés du côté de la clavicule, & umbi-\* Gualt. tab. liqués de l'autre \*; deux de l'espéce des deux 3. litt. R. premiers de l'article précédent; & huit Lampes antiques par pendans, dont deux fauve-roux nuées & bordées de fauve clair, de forme renflée, à bouche sinueuse en forme d'oreille, à lévre intérieure garnie d'une grosse dent, & List. tab. extérieure de quatre petites \*; deux fauve-roux

\* Arg. pl. dents \*; deux petites de Geneve, noisette, à 28. f. 9.
List tab. 83. bouche sinueuse garnie de trois dents, imitant f. 87.
\* bid. tab. encore mieux l'oreille que les précédentes \*; &

\* Thid. tab. encore inieux l'orenie que les précedences , de 93. f. 93. deux du Mexique de l'espéce qui rampe sur le Cedre, à bouche demi-ovale, à zônes alternatives blanches & brunes, à six orbes un peu élevés, dont le plus bas forme dans son milieu un pli en vive arrête, & à lévres en bourrelet re-

\* Ibid. tab. couvrant en partie l'umbilic \*.

68. f. 66.

990. Quatre Limaçons à bouche demi-ovale, peu communs, dont deux fauves nués de blanc, à fix orbes un peu renslés, à lévres saillantes en dehors, & recouvrant l'umbilic, à bouche placée dans l'un de droite à gauche, & de gauche à droite dans l'autre, formant ainsi l'Unique & la Contre-unique de cette espéce; & deux fauvebrun, remarquables par un ensoncement transversal au milieu du premier orbe, laissant un repli intérieur, & à bouche garnie d'une grosse dent.

991. Dix gros Limaçons d'Amérique, à bouche demi-ovale, & par pendans: sçavoir, deux blancs de forme bombée, marron foncé en dedans, & à lévre extérieure retroussée, nommés l'Oignon blanc \*; deux blancs teints en dedans \* List. de fauve, & de bleu vers la clavicule, à fix orbes très-renflés, & à tête un peu élevée; deux marron clair, à zônes brunes fines & nombreuses, & du reste semblables aux précédens\*; \* Ibid. tab. deux de l'espèce commune, blancs sasciés de 43. f. 40. fauve, l'un desquels conserve son opercule \*; \* List. tab. & deux marron foncé, à fix orbes applatis, Gualt. tab. 1. dont le premier a le milieu plié en vive arrête, litt. B.C. espéce rangée aussi parmi les Lampes antiques \*. \* Lift. tab. 64. f. GI.

992. Quinze Limaçons à bouche demi-ovale: Gualt. tab. 5fçavoir, un rare, blanc nué dans une large zône litt. I. d'orangé, de forme applatie, quoiqu'à orbes rensiés, à lévres en bourrelet, garnies d'un côté d'une petite avance intérieure; un blanc teint

de fauve, de forme plus bombée, & à lévres en Lourrelet, garnies d'un côté de quatre à cinque \* List. tab. desits \*; un blanc qui ne différe du précédent 94. fig. 95. qu'en ce que la bouche en est plus large & dépourvue de dents; deux blancs & un fauve, à

\* séba, pl. six orbes un peu affaissés & umbiliqués \*; un 40. nº. 9. Gualt tab-3, rare blanc de lait, à peu près de même forme mais sans umbilic, à spirale bordée de bleu céleste, à bouche très-étroite, à lévre extérieure retroussée, échancrée, & sous laquelle on re-

\* seba, pl. marque deux dents \*; un de l'espéce de celui 40. nº. 30. de l'article 978, mais dont la bouche est bordée

de noir; un comme les deux premiers de l'article 988; un qui en différe en ce que le sommet en est moins affaissé; deux Lampes antiques de l'espèce des dernieres de l'article 991; trois des variétés décrites à l'article 989. Plus un Lima-, con coupé transversalement pour en faire voir la columelle & les spires intérieures.

993. Onze très-jolis Limaçons de la Chine. à bouche demi-ovale, à cinq orbes un peu renflés, & légérement umbiliqués, dont un blanc, quatre citron, & cinq de diverses nuances de noisette & de marron, tous ornés dans le milien du corps d'une zône ou double zône d'autres couleurs tranchantes fur le fond, se prolon-

\* Ibid. pl. geant jusqu'à la clavicule, & un blanc en en-52. nº. 1-8. Arg. pl. 28. tier \*.

994. Idem, à de légeres différences près Gualt. tab. 3. litt. D-E.

dans les couleurs des zônes & du fond.

995. Un carton contenant soixante - deux petites boëtes de Limaçons de jardins, prés, bruyeres & forêts de l'Europe & de l'Amérique, de diverses espéces, couleurs, formes & grandeurs, jusqu'à la derniere petitesse, avec les étiquettes des lieux d'où toutes ces Coquilles ont été prises 1. On y trouve les espéces nom- 1 List. tab. mées la Luisante, la Livrée 2, &c. &c.

52. nº. 47. Ibid. tab. 58.

996. Sept Limaçons : sçavoir, deux très-no. 14. Gualt. tab. 1. beaux de la Chine, de l'espéce de ceux de l'ar-litt. C-Q. Ibid. tab. 2. ticle 993, dont un marron clair à large zône litt. A-F. blanche se prolongeant sur toute la spirale, & 23. f. 4 & \$. un blanc à zône étroite brune dans le milieu du premier orbe, mais ne se prolongeant pas plus loin; & cinq Limagons-Sabots à bouche demiovale, dont deux gris-de-lin, à base & clavicule brunes, & à spirale bordée d'un lizeré de même couleur 3; & trois ornés sur tous les or- 3 List, tale, bes de zônes alternatives blanches & rouge-16.f. 11. Gualt. tab.4. brun, plus ou moins larges, tous à sept orbes litt. L. & à lévres relevées en tranchant.

997. Vingt-quatre Buccins; sçavoir, un rare à bouche ronde & petite, orné de zônes marron sur un fond jaune pâle, à six orbes renssés, séparés par des pas profonds, de forme effilée, approchante de celle des Vis, & à clavicule émoussée; un autre peu commun, à bouche ronde assez large, lie de vin foncé, à robe très-

\*Lift. tab. finement réticulée, & umbiliqué \*; douze pe-25. f. 23. tits couleur de chair vif, & du refte semblables

\* Ibid. tab. au précédent \*; neuf autres de même espéce, 26. s. 24 Gualt. tab. 4. litt. B. des environs de Geneve, blanc-grisatre, dont cinq avec leurs opercules; & une petite Unique ou Bouche à gauche, blanche, ornée de deux zônes canelle sur le premier orbe, & de stammes longitudinales de même couleur sur les sui-

\* Lift. tab. vans \*.

33. f. 31.

998. Deux Buccins rares en pendant, à bouche presque ovale, blancs nués dans une large zône & par traits longitudinaux interrompus de fauve-roux, à lévres un peu retroussées, dont une Bouche à gauche & une Bouche à droi-

\* Ibid. tab. te\*. Les Hollandois ont nommé cette espèce le

Gualt. tab. 5. Pavillon du Prince.

999. Idem, à cette différence près que la Contre-unique est toute blanche, & l'Unique foible en couleur.

dens, mais un peu moins allongés, dont une Unique jonquille vif dans le bas, s'éclaircissant vers le haut, & à bande longitudinale brune

\* Life, tab, sur le premier orbe seulement \*; & un blanc à 34. f. 33. Zônes gris-de-lin sur le premier orbe, dont la litt. P. plus élevée se prolonge sur le suivant, & de Arg. pl. plus orné de deux bandes longitudinales brunes

sur le premier & le sécond orbe.

1001. Trois Buccins, dont une Unique de

l'espéce de la précédente, citron vis dans le corps, s'éclaircissant vers le haut, mais dépour-

vue de bande brune; & deux blanc-grisâtre, de forme un peu moins renssée & à neuf orbes.

1002. Quatre Buccins: sçavoir, deux Uniques, à robe blanc-sale nué de verdâtre, ornée dans le premier orbe de zônes jonquilles & bleues, flambée & tachetée par zônes de grisbleuâtre dans les suivans, jusqu'à la clavicule qui est rouge vis; & deux Contre-uniques à clavicule brune, fasciées dans les orbes suivans de blanc-sauve & bleuâtre, de gris-de-lin & de brun.

1003. Quatre Buccins peu communs: sçavoir, deux des montagnes d'Amboine, marron bariolé de blanc, à dix orbes se recouvrant l'un l'autre, ressemblant pour la forme à une grosse Chryfalide un peu comprimée, à bouche demiovale très-étroite, armée de sept dents, & umbiliqués, espèce nommée Gueule de loup \*; un \* Arg. pl. grisatre flambé par bandes longitudinales de 9. lett. T. Rumph, tab. marron, de forme allongée, à longues lévres 27. litt. I. retroussées en bourrelet, fléchies & sinueuses, litt. S. Gualt. tab. 4. ayant de part & d'autre une avance en forme de dent, qui rendent la bouche semblable à une oreille \*; & un de même espéce, entiérement blanc & de forme plus raccourcie. Plus quatre 32. fig. 30. petites boëtes de Vis-Buccins, la premiere contenant une Unique de Valence en Espagne,

blanche, à bouche armée de deux dents sous la lévre extérieure, & d'une seulement sous l'intérieure; & une Contre-unique de même sor-

tient neuf petites *Uniques* de Geneve, blancgrisatre, à stries fines longitudinales, & à lévre

2 tot de tab. intérieure armée de deux dents 2: la troilieme 41. f. 3.9.
Arg. pl. 28, en contient onze autres de forme plus effilée 3; f. 20.
Gualt tab. 4.
litt. C.
J. Lift. tab.
1. fig. altera. blante à celle des Enfans au maillot, & à bou-Arg. pl. 28; che garnie de trois dents 4.

f. 19. che garnie de trois dents

40. fig 38.

communes pour leur grosseur: sçavoir, cinq à huit orbes médiocrement hombés, à robe ornée dans le corps de zônes alternatives plus ou moins larges blanches, gris-verdâtre, rouge & marron, & vers la tête de flammes longitudinales des mêmes culeurs, espéce nommée le

5 Séba, pl. Pavillon d'Hollande 5; & deux en pendant, 39, 11°, 61-74. List. tab. 12. de même forme, cerclées dans toute leur robe 10°, 7. Arg. pl. 11. de zônes inégales en largeur, blanches, pour-lett. M. pre foncé, aurore, gris-de-lin & citron pâle, à clavicule marron foncé, & de la variété nom-

6 Ibid. pl. mée le Ruban 6.

17. lett N. Séba, pl. 4c. 1005. Deux Rubans un peu moins grands, fig. 38. mais dont une Unique, & par cette raison très-List. tab. 15. rare.

1006. Deux grandes Vis-Buccins, dont une très-

très-race & Unique, grise, à flammes longitudinales rousses, & à robe réticulée \*; & une Contre-unique blanche peu commune, à stries 39. longitudinales très-fines, & à clavicule un peu obtule \*. \* Gualt. tab.

1007. Un carton contenant quarante-deux boëtes de Vis-Buccins de forme très - variée : sçavoir, une rare blanche papyracée, à stries longitudinales très-fines, de forme un peu bombée, à clavicule aigue, à bouche demi-ovale. bordée de fauve, à lévres un peu retroussées. & umbiliquée; une qui ne différe de celle-ci qu'en ce que sa forme est plus pyramidale, & sa clavicule un peu affaissée; une blanc-grisâtre à bouche semblable à celle des précédentes, mais de forme plus effilée; une fauve, à stries longitudinales, de la forme des Enfans au maillot, & à bouche garnie d'une seule dent \*; un Enfant au maillot, à stries plus fines, de 4 litt, R. forme moins renflée & plus cylindrique que le précédent; une Vis-Buccin fasciée dans tous ses orbes de brun & de mairon, de forme un peu bombée, à clavicule applatie, & à lévres faillantes en vive arrête ; deux de forme plus effilée, blanches cerclées de lignes fauves, à lévre intérieure ou bas de la columelle convexe & cylindrique, strié transversalement, & laisfant derriere un umbilic \*; deux fasciées comme \* 1bid. litt. les précédentes, mais à bouche ovale fimple, M.

\* Thid, tab.

Tome -I.

Ff

1 Lift, tab, sans stries & sans umbilic 1; une jaune-pâle paf. 2. 2. 1bid. f. 3. pyracée 2; deux blanches à bouche presque ronde, & légérement umbiliquées; deux de Valence en Espagne, dont une blanche veinée, & 1 Ibid. f. r. l'autre blanche fasciée de fauve 3; dix Vis d'Aranjuez de différentes grandeurs, fauve clair ou 4 Ibid. tab. grisatre, à clavicule tronquée 4; quatre petites Gualt, tab. 4, du même endroit, à coque mince & transpalitt. O. P. Q. rente, à tête effilée, terminée par une clavicule cad.des Sc. an. arrondie en mammelon 5; une boëte de petites <sup>1759</sup>, pl. 3. Vis blanches à une zône noire dans le bas <sup>6</sup>; <sup>3</sup> List. tab. une boëte d'autres de même espèce, mais tou-Mém. del'Ac. tes blanches; une de petites Vis fauves de Ge-6 List. tab: neve, ventrues, à six orbes & à bouche garnie 7 Gualt. tab. de dents 7; une d'autres de même forme, mais 8 List. tab. plus effilée & à neuf orbes 8; une d'autres encore plus petites, lisses, fauves, à six orbes. 20, fig. 16. Arg. pl. 28. nommées Grain d'orge 9; une d'autres à cinq f. 15. list. tab. orbes, nommées le Grain d'avoine 10; une de très-petits Enfans au maillot; & cinq d'autres 22.f. 19. variétés, dont deuxinfiniment petites, trouvées dans les environs de Geneve. Plus, quatorze Rubans de couleurs très-variées, & une Gueule de loup.





# TROISIEME PARTIE.

### ZOOPHITES.

voiqu'A strictement parler, nous ne connoissions point de véritables Zoophites, c'est-à-dire, d'Animaux plantes, nous nous servirons du premier de ces noms, consacré déja par l'usage, pour désigner une certaine classe d'animaux marins, qu'on ne peut regarder ni comme des Insectes, ni comme des Coquillages, ni comme des Poissons proprement dits, mais qui tiennent une espéce de milieu, & dont plusieurs n'ont qu'un sentiment de vie sort obscur.

Nous les rapporterons tous à deux familles, dont la premiere contiendra les Etoiles de mer, & la feconde les autres animaux mous, auxquels M. Linnæus a donné le nom de Mollusques.

Ffij

### PREMIERE FAMILLE.

ETOILES DE MER.

Es dépouilles de ces animaux approchent à plusieurs égards de celles des Ourfins; elles sont composées extérieurement d'un cuir calleux souvent hérissé de petites éminences osseuses qui le traversent, & en dedans d'un nombre prodigieux de vertébres & autres osselets articulés uniformément, soit ensemble, foit avec les éminences ofseuses de la peau.

Leur forme, presque toujours radieuse, leur a fait donner le nom d'Etoiles de mer. Elles sont à plus ou moins de rayons, chacun desquels est formé ou de deux suites de vertebres laissant entr'elles un canal plus ou moins large, ou d'une suite de vertebres presque rondes & percées toutes dans le milieu d'un petit trou qui communique des unes aux autres.

C'est d'après ces caracteres généraux que nous en ferons avec M. Lincke \* \*v.fon oudeux Sections que nous nommerons lis marinis, Genres':

- 1º. Les Etoiles de mer à rayons ou lobes fendus en dessous suivant leur longueur, & dont les unes ont moins de cinq rayons, les autres cinq. & les autres plus de cinq.
- 2°. Les Etoiles de mer à rayons ou lobes entiers, qui comprennent les Etoiles vermiformes, les Chevelues & les Meduses, que l'on nomme aussi Etoiles arborescentes ou Astrophytes.



### GENRE PREMIER.

### ETOILES A RAYONS FENDUS.

1. DEPT variétés d'Etoiles à quatre rayons, peu communes, & nommées Cruciformes: sçavoir, une des côtes de Barbarie, à rayons de sept pouces de long chacun, à surface supérieure couverte de grains, qui vus à la loupe, sont autant de petites houpes cylindriques ferrées les unes contre les autres, & bordées de quarrés-longs en relief aussi granuleux : le milieu de chaque rayon s'éleve en forme de côte. & présente ainsi une seconde étoile; ce qui fait donner à cette espèce le nom d'Etoile étoilée : sa surface inférieure est recouverte d'un amas trèsnombreux de petites pointes; une d'Amérique, de moyenne grandeur, à rayons larges dans l'origine, & s'étrécissant vers le bout, à surfaces supérieure & inférieure chargées de tubercules ou mammelons garnis de piquans coniques plus ou moins gros, & à bords des rayons formés de mammelons granuleux, plus gros que les \* Linck. tab. autres, espèce nommée Falciforme \*; une des

dessus d'espéces de pustules granuleuses, qui

l'ont fait nommer Etoile à grains de petite vé-

31. f. 51. Rumph. tab. Indes, de moyenne grandeur, couverte en rs. litt. D. Séba, pl. 5. 120.4.

role \*; une d'Amérique, à rayons étroits ar- \* Linck. tab. rondis, plus longs & plus effilés que dans la 1, nº. 1. précédente, contournés, & où l'on remarque à peine la fente longitudinale, qui est bordée de petits grains ovoïdes très-nombreux: les tubercules granuleux de sa surface lui ont sait donner le nom d'Etoile à grains de millet ; une petite de nos mers, à surface supérieure réticulée & de l'espèce des Coriacées \*; & deux \* Ibid. tab; autres variétés de Coriacée, dont une des Indes, 34. nº .55. à rayons en forme de pétales, recourbés à l'extrémité, nommée de-là Pétaloïde \*; & une de \* !bid. tab. nos mers, hérissée de petites pointes coniques, & ayant un de ses rayons plus court que les autres:

2. Une Etoile étoilée à cinq rayons de sept pouces & demi de long chacun, parfaitement conservée, & des mêmes parages que la premiere de l'article précédent: son organisation est à-peu-près la même, mais elle en différe en ce que les bords du dessus y sont armés de piquans courts qui s'élevent de chaque quarré-long : ces piquans sont un peu courbés vers la pointe du rayon auquel ils appartiennent; le tranchant du pourtour de toute l'Etoile est aussi hérissé de pointes longues couchées dans son plan, & à distances égales les unes des autres, ce qui l'a 5 & 6. n°. 5. Séba, pl. 7. fait nommer Pectinée \*.

4 Ibid. tab.

Aldrov. de in-3. Deux grandes Etoiles étoilées à cinq sed. 1. 7. p. Ffiv

rayons ; l'une ne différe de la premiere de l'are ticle cremier, que par le nombre de ses rayons. l'autrè est de l'espéce de la précédente.

4 Huit Etoiles à cinq rayons : sçavoir, une de nos mers, très-grande & peu commune, à rayons partant d'un disque qui fait donner aux Etoiles où on le remarque, le nom de Soleil, revêtus chacun de trois côtes longitudinales épineuses, & de stries transversales, qui s'étendent des épines d'une côte aux correspondantes de \* Linck. tab. l'autre ; espèce nommée Soleil à treillis épi-

38 & 39. no. neux\*; deux digitées d'Amérique, qui ne différent de l'Etoile à grains de millet de l'article premier,

\* 'Ibid tab. que par le nombre de leurs rayons \*, qui d'ail-23. 11°. 47. leurs font inégaux ; cette derniere circonstan-Rumpii. tab. ce les fait nommer Cometes digitées miliaires; 25. litt. E. une petite de nos mers, à rayons inégaux trèshérissés d'épines, nommée Comete épineuse;

deux des mêmes parages, à rayons en forme de pétales, aigus à l'extrémité, hérissés en dessus de petites pointes cylindriques, & qu'on peut \*Linex, tab, nommer Pétaloide veluë \*; une de l'espèce de

9 & 10. n°. 19. celles-ci, mais dont les rayons retroussés en faisceau & en forme de tulipe, laissent mieux voir la structure de la face inférieure; & un squelette d'une semblable, montrant en dessus une

4 séba, pl. espéce d'ouvrage en filigrane très - curieux \*, 1. 12° . 30 que des fourmis auxquelles on a laissé manger le cuir & le dedans, n'ont point attaqué.

\* Linck taba

5. Une grande Etoile des Indes, à cinq rayons pyramidaux, de sorme renslée & trèsélevée en dessus, un peu concave en dessous, ornée d'un rézeau, à mailles trangulaires, sur chaque jointure desquelles s'éleve un denticule conique, & bordée dans son contour de gros mammelons armés chacun d'un denticule semblable : on nomme cette espéce gros Pâté réticulé\*.

6. Un gros Pâté réticulé d'Amérique, diffé-72.
rent de l'espèce précédente en ce qu'il est moins n°. 1.
convexe en dessus, plat en dessous, & que les denticules du rézeau y sont plus nombreux, & disposés d'une maniere moins réguliere \*.

\* Ibid. pt %

7. Quatre Étoiles à cinq rayons ; sçavoir, nº. 1. deux Pâtés réticulés des Indes, peu communs, mais un peu dégradés ; un à fommet pentagone dont chaque angle est terminé par un gros tubercule ; ce qui a fait donner à cette espéce le nom de Fort pentagone\*; & un bordé dans son \*Linck. tabé contour & sur le milieu de chaque rayon, de 26. nº. 41. gros tubercules lenticulaires, à robe semée de tubercules semblables, mais moins grands & très-serrés dans la partie insérieure \*; les rayons \* Séba, ple de ces deux espéces d'Etoiles se terminent en 6. n°. 1. pointes émoussées; un Pâté réticulé d'Amérique, de l'espéce de celui de l'article cinquieme, mais moins grand, & à sommet plus ensoncé; & une Etoile des Indes, à rayons pyramidaux trian-

nº . 5 & 6.

8. nº. 10.

4. nº. s.

35.nº.59.

34. nº. 57.

gulaires, bordés tant dans leur milieu que dans leur contour, de piquans affez longs, qui peuvent faire nommer cette espéce Pyramidale pectinée.

8. Seize Etoiles à cinq rayons : sçavoir, une pentagone peu commune, bordée en dessus & en dessous de gros tubercules, & ornée en dessus feulement de cinq compartimens de petits tubercules cylindriques, espèce nommée petie \*Linck. pl. Pâté \*; un Pâté réticulé de moyenne grandeur, Séba, pl. 6. à fommet circulaire enfoncé, & à denticules n°.9 & 10. très-nombreux; trois petites réticulées lentigineuses, de forme un peu applatie, à sommet \* Ibid. pl. 5. aussi enfoncé \*; deux Digitées à grains de petite vérole, qui ne différent de celles de même nom de l'article premier, que par le rayon qu'elles \*Linck.tab. ont de plus \*; une Comete digitée miliaire des Indes; cinq Etoiles coriacées de nos mers, dont \* Ibid. tab. trois réticulées \*; une hérissée de petites pointes \* Ibid. tab. coniques \*, ayant un de ses rayons plus court que les autres; & une platte à rayons émoussés, & à cavité dans le milieu de sa partie su-\* Ibid. tab. périeure \*; une petite peu commune, convexe en dessus, concave en dessous, & dont la surface paroît comme chagrinée : elle est ornée à son sommet d'une petite Etoile à cinq rayons, dont les angles faillans répondent aux angles

\* Ibid. tab. rentrans de la grande \*; une à-peu-près sem-\* Séba, pl. blable de l'Isle de Sainte-Helene \*; & une S. 110. 3.

qui n'en différe que par sa forme applatie.

9. Treize autres : sçavoir, une Etoilée rare, aussi mince que le carton le plus fin, dont les rayons grêles sont comme engagés dans une membrane granuleuse, qui lui a fait donner le nom d'Etoile en patte d'oye \*; deux petites à \* Linck. tab. grains de petite vérole, dont une digitée ou à Aldrov. 1. 7. rayons arrondis, & l'autre à rayons applatis & p. 743. triangulaires; une peu commune, à corps plus petit & plus élevé, à rayons plus étroits & moins plats que la précédente, & à robe semée de tubercules à-peu-près sphériques; trois de moyenne grandeur de la Méditerranée, étoilées & peclinées \*, dont une à sommet élevé en \*Linck. tab. demi-sphere, & à verrue élevée \*; une à cinq \*Lochner rabosses aux origines des arrêtes longitudinales lerian. p. 76. formant la seconde étoile, & à dents de peigne tab. 22. relevées toutes en en-haut, & la troisieme à sommet & verrue groupés ensemble en bosse irréguliere; une petite de Curação, à dessus plat & granuleux, dans le milieu duquel on observe une petite cavité forée au centre, & à bords canelés transversalement \*; deux Digitées réticu- \* Linck. tab. lées de la Méditerranée, à rayons longs, partant 4.11º. 14. d'un tronc affez petit \*; deux Pâtes réticulés, \* Ibid. tab. comme le second de l'article précédent, & un 9 & 10. n°.15. squelette d'Etoile de l'espéce de celui par où finit l'article quatre.

10. Huit Etoiles à cinq rayons : sçavoir, une

Digitée miliaire de l'Isle de France ; deux Coriacées affez grandes, dont une réticulée des mers de Hollande, & l'autre des mers d'Irlande, à rayons plats & rabotteux, chargés en dessus d'une côte longitudinale bien prononcée, & Linck. tab. nommée la Jaune vulgaire de Luid \*; deux

86. nº. 61.

Pâtés réticulés de moyenne grandeur, dont un à sommet enfoncé, & l'autre à tronc & lobes applatis; deux Soleils, dont un à pointes & treillis de moyenne grandeur, à disque du milieu un peu enfoncé, & lobes plus larges à proportion que dans celui de l'article quatre ; un à \* Ibid. tab. rayons applatis, nommé le Soleil plat coriacé \*; \* Ibid. tab. & une pectinée de moyenne grandeur \*.

11. Une grande Etoile pentagone de l'Isse de France, qui est une variété rare de l'espéce des Pâtés, que nous n'avons trouvé dessinée dans aucun Auteur : elle forme un pentagone régulier de sept pouces de longueur sur un pouce d'épaisseur, chargé en dessus de petits denticules coniques clair femés sur une espéce de rézeau, & en dessous d'un compartiment régulier de petits tubercules oblongs, disposés par groupes de cinq à six ensemble, & parallelement aux deux rainures entre lesquelles ils se trouvent, imitant par-là un ouvrage en mosaïque des plus élégans : les bords en sont très - finement granulés, & coupés dans toute leur largeur par les cinq rainures. Plus, un Carton contenant dixhuit petites boëtes d'offelets, vertebres, denticules, &c., provenant d'une Etoile de cette

espéce.

12. Une Etoile de la Méditerranée, de plus d'un pied de long, à quatre grands rayons triangulaires simples, & un cinquieme formant vers son milieu une sourche, & se divisant ainsi en deux plus petits, à la maniere d'un des rayons du Soleil représenté dans la pl. 40, n°. 70 de Lincke: cette espéce peu commune est du genre des Pedinées, & ne dissére de celle de l'article second de notre Catalogue, que par la bisurcation d'un de ses rayons: elle peut se rapporter à celle dont parle Séba \*.

13. Une autre de même espéce, un peu moins grande, & semblable, à cela près que la fourche du rayon double, ne commence qu'à une plus grande distance du centre, que l'angle de cette fourche est plus aigu, & les bran-

ches qu'elle forme, plus petites.

14. Deux Étoiles peu communes : sçavoir, un gros Pâté réticulé à six rayons, dont un plus petit, & moins écarté de ses voisins que les autres, & paroissant naître du dessous en forme de petite queue : il est néanmoins garni de sa rainure longitudinale, partant du centre comme celle des autres; & une Etoile en patte d'oye, qui ne dissére de celle de l'article 9, qu'en ce qu'elle est à six rayons, engagés dans

\* Séba, pl.

une membrane encore plus mince, formant un

hexagone finueux.

15. Une Etoile rare de l'Isse de France, de forme hexagone réguliere, & qui ne dissére de celle de l'article 11, que par le lobe qu'elle a de plus.

16. Trois Etoiles: fçavoir, une Digitée miliaire à fix rayons d'inégale grandeur, dont un très-court; une grande Coriacée à fept rayons triangulaires applatis & épineux: c'est le Soleil

\* Aldrov. de digité d'Aldrovande \*; & une Coriacée à large insect. 1. 7. P. corps circulaire réticulé & hérissé de piquans 255. Linck. tab. 34. mousses, d'où partent douze rayons semblables n°. 58. & courts en dessus, mais plus longs, & nais-

fans d'un cercle plus étroit en dessous, espéce \* Ibid. tab. nommée Tournesol à douze rayons \*.

P.757. pectinés.

18. Un rare & beau Tournefol de fept pouces de diametre, à trente-sept rayons en forme de doigts serrés les uns contre les autres jusqu'à quinze lignes ou environ de distance de la circonférence, à corps rond & élevé, hérissé de petites houpes cylindriques blanchâtres, qui se partagent en trois rangs longitudinaux sur chacun des rayons: cette Etoile qui est de la plus parsaite conservation, vient du beau Cabinet de feue Madame de Boisjourdain, qui l'a fait mon-

ter sous une cloche de crystal, dont le pied est en cuivre, & le fond garni d'une glace, au moyen de laquelle on voit très - distinctement la surface inférieure de ce curieux morceau.

19. Deux autres Tournesols, dont un à treize rayons en sorme de doigts velus & assezonas \*, \*Linck. tab: & un qui ne différe du précédent, qu'en ce qu'il est à trente-huit rayons, & un peu dégradé.



# GENRE SECOND.

#### ETOILES A RAYONS ENTIERS.

20. UINZE Etoiles vermiformes à cinq rayons: sçavoir, quatre à queue de lézard, ainsi nommées de la ressemblance de leurs rayons à la queue de cet animal : ces rayons arrondis en dessus, plats en dessous, sont composés de vertebres articulées ensemble comme par nœuds, & fortent d'un corps lenticulaire applati, trèsremarquable en ce qu'il est chargé d'espéces de petites écailles, dont celles qui se trouvent placées deux à deux à la naissance de chaque rayon, imitent parfaitement les aîles d'une mouche qui \*Linck, tab, auroit la tête tournée vers le centre de l'étoile \*;

2. nº. 4. Móm. de l'Ac. 1-12. p. 132. pl. 7. f. 5.

C2. nº . 35.

une qui différe des précédentes en ce que le corps en est pentagone, que les rayons en sont ronds, & que les cinq fentes de la bouche pa-\*Linck, tab, roissent à peine \*; une de même espèce, bariolée par zônes, mais mutilée d'un de ses rayons; quatre de l'Isle de France, noirâtres, à corps rond granuleux, d'où partent des rayons écailleux comme ceux des précédentes, mais différens en ce qu'ils sont chargés de quatre rangées longitudinales de pointes longues plus ou moins fines : espéce nommée Scolopendroïde granuleuse \*; quatre de l'Amérique, qui ne dif- \*Linck. tab. férent des précédentes qu'en ce que le tronc en 26. n°. 43. est pentagone, & plus petit à proportion \*; & \* Ibid. tab. une autre Scolopendroide rare, à rayons char-27. 20. 46. gés de piquans blancs, fins, transparens &

granuleux, forés dans toute leur longueur \*.

21. Trois Etoiles chevelues: sçavoir, deux 34. 11°. 56. petites à dix rayons, naissans deux à deux de cinq tiges courtes, composés en dessus de piéces en forme d'anneaux, articulées ensemble. alternativement larges d'un côté, & étroites de l'autre, creusés en dessous en forme de gouttiere, & bordés de chaque côté de filets ou petites pattes alternes aussi articulées : les cinque tiges principales fortent d'un petit tronc pointillé, arrondi en dessus en Jorme de demi-sphere, plat en dessous, & ne montrant aucun vestige de bouche : espéce nommée par Luid Décempede de Cornouaille, & par Linck Rosacée \*; & une grande de dix-sept rayons organisés comme 37. nº. 66. ceux des précédentes, l'un desquels manque: les seize restans naissent de cinq tiges fort courtes, qui sortent elles - mêmes d'un petit tronc cylindrique, foré dans son milieu, du haut duquel partent en forme de verticille, d'autres rayons courts & déliés, posés dans un plan parallele aux grands: chacune des cinq tiges principales se divise d'abord en deux : de celles-

Tome I.

ci, sept se subdivisent en autant de rayons, & trois restent simples, ce qui donne le nombre des dix-sept rayons que nous avons dit devoir se trouver dans cette Etoile : cette espéce, qui a beaucoup de ressemblance avec celle que Linck. tab. Lincke nomme Tête de Méduse brune \*, & 12 \* Séba, pl. Lune-marine de Séba \*, pourroit bien n'être, ainsi que la premiere de cet article, vu le défaut de bouche qu'on y remarque, que l'extré-

mité d'une tige d'Etoile arborescente, différente cependant de celles qui sont connues sous le nom de Méduses, ainsi que l'a conjecturé M. Guettard, en parlant du Palmier marin. 22. Un rayon d'Etoile arborescente connu

fous le nom de Palmier marin, portant environ dix-sept pouces de haut, & renfermé dans une case de verre. Ce morceau unique dans son espéce, est extrêmement précieux par le jour qu'il a répandu sur l'origine des Astéries, des Encrinites & des Entroques : il nous vient aussi du Cabinet de feue Madame de Boisjourdain, qui l'avoit reçu de la Martinique où il avoit été porté par un Officier qui venoit des Indes, & qui ignoroit dans quelles mers cet animal avoit été pêché : quoi qu'il en soit, on peut dire qu'il fait époque dans l'Histoire Naturelle, depuis le scavant & curieux Mémoire que M. Guettard a donné à son sujet. Nous sentant incapables de rien ajouter à l'exacte description qu'en a donnée

tet habile Naturaliste, nous y renvoyons nos

23. Une très-belle Téte de Méduse de la Nou- l'Ac.R. des Sc. ann. 1755. p. velle-Espagne, & parfaitement conservée, dont 224. & suiv. le corps a près de deux pouces de diametre : pl. 8.9. & 10h l'origine de chacun des cinq gros rayons est chargée en dessus de cinq grosses côtes longitudinales épineuses, & marquée en dessous de trois rangées de points : l'extrémité de ces cinq rayons ou troncs est percée latéralement de deux trous, à l'endroit où se fait la premiere division en deux groffes branches, qui se subdivisent bientôt après elles-mêmes en deux autres, & ainsi de suite, jusqu'à in nombre prodigieux de ramifications toutes femblables, dont les dernières sont recourbées en sorme de cheveux frisés, & donneroient à Etoile entiere, si elles étoient développées, une extension de près d'un pied & demi : on nomme cette espèce Astrophite ou Méduse à côtes \*. \* Linck. taby

24. Une autre Méduse portée sur un pied de 29 30, 31. Rumph. tab. bois des Indes, & renfermée sous une c'oche 16. sur la la de verre : elle dissére de la précédente en ce no. 16. sur que son corps a près de trois pouces de diametre, & se termine en une espéce d'écusson d'un pourtour très-gracieux, qui a fait donner à cette espéce le nom de Méduse à écusson \*: \*Linck. tab. les branches & les ramissications de celles-ci se 48 & 49. \*\* tecourbent en dessous, imitant une rose de Jé-no. 1; 114

Gg ij

468

richo, ou un sphéroïde applati de près de huit pouces de diametre sur quatre pouces & demi de haut: ces branches sont armées en dessous de deux rangées longitudinales de petites stries transversales, formées chacune de quatre petits tubercules aigus, & assez ressemblantes à des pattes de chenille.



#### SECONDE FAMILLE.

Mo'LLUSQUES.

25. VINGT-UN Mollusques desséchés : sçavoir, deux Polypes de la mer des Indes, l'un mâle, l'autre fémelle, une Séche, un Calemar de la grande espéce, une Holoturie ou Verge marine, deux Concombres marins, cinq Orties de mer, fix Plumes marines ou Verges ailées, dont trois variétés; une quatrieme variété de Plume - marine semblable à une large feuille de roseau, espéce que Séba dit être fort rare\*, & \*Séba, tom: deux Mains de mer.

26. Vingt-cinq autres Mollusques dans l'esprit-de-vin: sçavoir, dix Calemars de la petite espèce, une Velette de la Méditerranée, deux Anemones de mer, quatre Chenilles ou Taupes marines, dont une des parages de Hollande. remarquable par ses poils en forme de pinceaux jouant l'opale \*, & trois de la Méditerranée, \* Ibid. pl. 48 l'une desquelles adhère à une Scolopendre ou Pinceau de mer, & à des Corallines; une Pomme-folle de mer ; une Ortie de mer , des Concombres & des Raisins de mer; une Holoturie, deux Séches, & trois Poumons marins.

Gg iii



## QUATRIEME PARTIE.

CRUSTACÉES.

C e sont des animaux couverts d'une croûte assez dure, mais molle en comparaison des coquilles ou écailles pierreuses des Testacées. On les divise ordinairement en trois genres, dont le premier comprend ceux qui ont le corps allongé, tels que les Ecrevisses, les Langousses, &c. Le second renserme ceux dont le corps est large & évasé, tels que les Crabes; & le troisieme les Crustacées à corps arrondi, ou les Cancres,



### GENRE PREMIER.

CRUSTACÉES A CORPS ALLONGÉ.

I. U NE Langouste de la mer des Indes 1, 1 Rumph. desséchée & parfaitement conservée.

2. Une grande Squille des Indes, nommée par Rumphius Squille large ou Cancre-ours<sup>2</sup>, <sup>2</sup> Ibid. tab.

& une très-grosse Langouste de nos mers.

4. Les mêmes Crustacées de l'article précédent, à l'exception du second & du dernier, qui sont remplacés par une petite Ecrevisse de mer d'Amérique; & une grosse Ecrevisse d'eaux

douce.



### GENRE SECOND.

CRUSTACÉES A CORPS LARGE ET ÉVASÉ.

5. In rare & beau Crabe d'Amérique, verdâtre: ses pieds, ses deux longs bras, & le contour de sa coque sont hérissés de pointes, mais ses pinces sont lisses, & au lieu de se terminer en pointe comme dans les autres espéces, leur extrémité est arrondie, un peu concave & dentelée: la partie supérieure de sa coque est couverte de petits mammelons sort serrés, la plûpart peu élevés.

6. Deux Crabes rares, l'un de la côte Coromandel, ayant sur le dos une croix très-bien faite, avec deux personnages de chaque côté.

Ces Crabes sont rares même dans le pays: on

\* China il-peut voir dans le Pere Kirker \*, l'origine merInstrata. P 35. veilleuse qu'il attribue à la croix dont ils sont décorés: l'autre est d'Amérique, à larges taches rouges, & de l'espèce de celui qui est repré-

\* séba, tom. fenté dans Séba \*.

7. Quatre aurres Crabes: sçavoir, deux Saxatiles d'Amérique, dont un rouge tacheté de \* 1bid. pl. jaune pâle, à bras gros & courts \*; l'autre à 22. n°. 4. coque bordée vers la tête de piquans applatis en forme de petites feuilles dentelées, à jambes velues, & à bras épineux; & deux de nos mers, dont un à pinces en crête de coq, nommé delà Coq de mer 1; & un Poupart, dont le dos est 1566a, tom. chargé d'une tousse de Coralline, de l'espèce 3. pl. 20. n°. 7 & 8. nommée Queue d'écureuil, & de quelques Rumph. tab. Glands de mer.

8. Sept Crabes: sçavoir, un des Indes, peu commun, hérissé d'épines & de tubercules qui le rendent fort hideux 2; le Sillonné de Rum- 21bid. 12b. 90 phius 3; deux Crabes velus 4; l'un mâle, l'autre 3 Ibid. tab. 6. femelle; le premier est pre que totalement re- litt. O. couvert par un alcyon de substance songueuse 11. nº. 1. & coriacée; deux Coqs de mer, l'un mâle, l'autre femelle; & un d'Amérique, de l'espéce du second de l'article précédent, remarquable par une cicatrice qu'il a sur le dos, & par une pince naissante qui remplace celle qui lui a été enlevée par quelque accident.

9. Vingt-deux petits Crabes, formant quatorze variétés, entr'autres un Crabe de la Chine. à rides granuleuses, très-rare. Plus, la derniere articulation d'une des jambes postérieures d'un Crabe de Sicile, garnie de son ongle, & recouverte de longs poils soyeux couleur d'or 5. 3. pl. 18. nº.



#### GENRE TROISIEME.

### CRUSTACÉES A CORPS ARRONDI

\*Rumph. 10. Un Cancre des Moluques \* parfaitement cab. 12. litt. conservé dans une boëte vitrée.

11. Un grand & très-beau Cancre squinade \* séba, pl. de la Méditerranée \*, couronné d'un groupe \* considérable de Glands de mer.





# CINQUIEME PARTIE.

#### POISSONS.

I. Un Chien de mer de cinq pieds de longueur, & un gros Poisson armé ou Porc-épic de mer desséchés & bourrés.

- 2. Deux Porc-épics de mer : le corps de l'un est rond comme un ballon, celui de l'autre est de forme ovoide.
- 3. Trois gros Poissons desséchés : scavoir . un Diable de mer \*; l'Orbis à tête de liévre de \* Jonst. tab. Grew\*, & un Porc-épic de mer.

47. f. 4 & 5. Grew. Mus. p. 108. rab. 7.

4. Trois Poissons desséchés, l'un peu commun, est la petite Licorne de mer du Brésil \*; les deux \* Ibid. p. 104. autres sont deux variétés de Porc-marin, dont tab. 7. une de la Méditerranée \*, & l'autre des Antilles, à grandes taches blanches fous le ventre. Hist. aquatil.

- 5. Vingt-deux autres Poissons desséchés : sça-Grew. Mus. p. voir, cinq variétés de Poissons-coffre, dont trois triangulaires & deux quadrangulaires; deux petits Poissons - armés, l'un quadrangulaire, l'autre sphérique; la Passenague nom-

mée l'Aigle; deux Rémores ou Sucets; une Hirondelle de mer; deux variétés de Trompette; un Hippocampe ou petit Cheval marin; un Serpent marin, un Humantin, un Rouget, un Malarmat, un Baliste Scolopax, un Rana Piscatrix. Plus, une petite Raye, ajustée en forme de Basilic.

6. Quarante - quatre petits Poissons, les uns desséchés, les autres dans l'esprit-de-vin, tels que Poissons dorés de la Chine, Rémores, Scorpions-marins, Poissons-volans, plusieurs variétés de Balistes, &c. Plus, un Basilie sactice.

7. Une Défense de Narwal, de près de sept

pieds de longueur.

8. Un Membre de Baleine, de six pieds de

longueur.

9 Une très-belle Défense de Poisson-scie, de quatre pieds quatre pouces de longueur, & une Vertébre de Baleine.

10. Une Gueule de Lamie ou grand Chien de mer; une Tête de Dauphin, & deux Défenses, l'une de Scie, l'autre d'Espadon.

11. Les Machoires de six Poissons: sçavoir, celles de la Zygéne ou Marteau, celles du Requin, du Loup - marin, du Dauphin, de la Bécune, de l'Espadon avec sa Désense, & une Désense du Poisson Scie.

12. Sept parties ofseuses de différens Poissons: sçavoir, une prétendue Main de Syrene, qui n'est autre chose qu'une nageoire de Baleine : un os de la tête de la Baleine, nommé l'Os de l'ouie ; le Membre d'une Vache-marine : il est de nature ofseuse, & long de dix-neuf pouces. Bartholin en fait grand cas pour certaines maladies, étant pris en poudre\*; la Queue de quelque long Poisson plat, qui paroît être du tur. II. genre des Murênes, ayant trois pieds & demi de longueur; une Vertébre de Baleine, une Tête de Dauphin, & une Machoire de Requin.

13. Trente autres parties détachées de différens poissons: scavoir, des Machoires de Raye, de jeunes Requins, de Dauphins, &c. des Dents de Cachalot, les Vertébres d'un autre poisson, des Ovaires de Rayes, des Fanons de Baleine, un lambeau de la peau de la grande Aiguille de mer, & divers Os de poissons, entr'autres un peu commun, que l'on croyoit au-

trefois provenir de la Rémore\*.

\*Muf.Worm?

14. Le Palais d'une espéce de Raye de la P. 270. Chine, composé d'offelets de diverses formes, les uns épineux, les autres granuleux, & contourné de maniere à représenter deux espéces de Buccins: ce morceau est rare & curieux.





### SIXIEME PARTIE.

## AMPHIBIES.

1. In grand Serpent d'Amérique, à écailles larges, variées de blanc, de brun, & de noir i il est, ainsi que tous les suivans, dans l'esprit-

\* Séba, tom. de-vin \*.

- 2. Deux Serpents-javelots des Indes, à corps grêle d'environ trois pieds de longueur : on les nomme dans le pays Cobra verde, à cause de leur belle couleur verte plus soncée sur le dos que sous le ventre : ces deux nuances sont séparées dans l'un par deux raies longitudinales blanches qui régnent depuis la tête jusqu'à environ six pouces de l'extrémité de la queue : l'autre à quelques raies semblables sous le ventre.
- 3. Deux Serpens, dont un des Indes, verd taché de noir, à deux raies blanches fous le ventre, & un de Surinam, cerclé de bandes noires & grifes d'inégale grandeur.
  - 4. Deux autres Serpens, dont un cerclé de

larges bandes noires & blanches, nommé Serpent d'Esculape \*; & un de l'espèce du premier \* séba, tont de l'article précédent.

2. pl. 18. 12 44

5. Cinq Serpens, dont un femelle du Cap-Verd, un d'Amérique, un de Madagascar, un

du Japon, & un du pays.

6. Six autres: sçavoir, deux des Indes, deux d'Amérique, dont un bleuâtre, orné sur le dos d'une suite de taches noires disposées par ondes & de deux fuites latérales de taches plus pecites, l'autre est cerclé de bandes noires & grises ; un orné de bandes longitudinales de diverses couleurs, & un Serpent aveugle de notre pays.

7. Deux Amphisbenes ou Doubles-Marcheurs, dont un de Ceylan, couvert de petites écailles rousses, & à queue presque d'égale grosseur avec la tête, & l'autre d'Amérique, orné sur le dos d'une large bande onduleuse noire, marbré sur les côtés de noir & de bleuâtre. Son corps est presque d'une égale grosseur jusqu'à un pouce de distance de la queue qui finit en pointe obrufe.

8. Quatre Serpens d'Amérique, dont un Cas cilia dépourvu d'écailles, & à petits anneaux marquetés de brun & de blanc \*; un ceint de bandes alternatives, dont les unes sont entiére-12. nº. 3. rement noires, tandis que les autres sont bleua. tres sur le dos, jaunâtres sous le ventre : il est

rare & remarquable en ce que sa queue est applatie; & deux à queue pointue, ceints d'anneaux blancs & rougeâtres. Plus, une queue de Serpent-sonnette, & deux petits Orverts de notre pays.

9. Deux Viperes en pendant, l'une mâle,

Aldrov. de l'autre femelle 1.

monstre différe de ceux qui sont représentés

<sup>2</sup> Ibid. p 60. dans Aldrovande <sup>2</sup>, Jonfton <sup>3</sup> & Valentin <sup>4</sup>, <sup>5</sup> De fenpentib, tab. 1. en ce que les deux têtes en font contigues à <sup>4</sup> Muf. mu-fæor. tab. 33. leur origine, & naissent ensemble du même f. 3. tronc, sans former une bisurcation, comme celles dont parlent ces Auteurs. Il peut être comparé à celui dont on trouve la figure dans l'Histoire Naturelle des Oiseaux de Georges

Edwards 5.

\$ 4e. Partie, pl. 207.

nent conservé dans l'esprit-de-vin : ses aîles, couvertes ainsi que le corps, de petites écailles marbrées de taches brunes, noires & blanches, sont dans la position où il les met pour voler : il a sous le cou une poche "cartilagineuse de médiocre grandeur. On le nomme aussi Dragon

6 Séba, tom. aîlé 6.

2. Pl. 86. n°. 12. Un Lézard volant d'une autre espéce, Valent. Hist. desséché. Celui-ci est d'Amérique, & ales aîles simpl. resorm. lib. 3. cap. 38. moins grandes que le précédent, mais sa poche est plus longue: ses aîles sont de couleur grise,

dépourvues

dépourvues d'écailles, & membraneuses comme les nageoires des poissons 1. Plus, deux 1 Séba, tom. Scincs d'Af i ue, aussi desséchés.

1. pl. 102. nº.

13. Un Crocodile de Siam, d'environ cinq Planches enlupieds de longueur, bourré: il est de l'espèce de d'Autenton, celui que nous citons 2.

minées de M. pl. 46.

14. Un autre de même espèce, un peu moins l'Acad. des Sc. grand.

<sup>2</sup> Mém. de tom. 3. part. 2.

15. Un jeune Crocodile de Ceylan, 3; & 356ba, tom. un Caméléon de la côte Coromandel : 10us 1. pl. 104, 11°. deux dans l'esprit-de-vin, ainsi que les suivans.

16. Un jeune Crocodile d'Amérique, & un Lézard des Indes, à dos épineux, nommé dans Séba Galéotes 4. Plus, un œuf de Crocodile, & un Scinc desséché.

4 Ibid. pl. 93. nº.

17. Une Salamandre aquatique, différente de celle de Séba 5, en ce que sa queue est moins longue, & que les espéces d'aîlerons qu'on y 2. pl. 103, nº. remarque, se prolongent des deux côtés du ventre & des cuisses; un jeune Crocodile, de l'espéce de celui de l'article quinzieme, & deux Scincs.

18. Deux Lézards d'une grande beauté, l'un de S. Domingue 6, & l'autre d'Amboine 7, pa- 6 Ibid, tom. reils à ceux que nous citons.

1. pl. 100. f. 3. ILid. pl,

19. Vingt-deux petits bocaux, contenant les 94. f. 3. Reptiles suivans: sçavoir, une Salamandre terrestre ; une Salamandre à queue courte ; une dépouille de Salamandre, un Lézard Galéotes,

Tome I.

Hh

\*sélia, tom. r. deux petits Caméléons \*; un Lézard à queue plate; deailleuse hérissée de pointes \*: deux à queue platte; deux à queue semblable, avec une crête dentelée le long du dos; & dix petits Lézards d'Amérique & de notre pays, de couleurs & marbrures sort variées. Plus, une Grenouille

\*Ibid. tom.2. de buisson, d'Afrique \*.

Trois grands Lézards bourrés : sçavoir , un Iguara d'Amérique , de l'espéce nommée Sé-

\* thid tom. nembi \*; le Lézard Téjuguacu, dont le corps 1. pl. 97. f. 3; \*th. tom. 2. eft parfemé de taches en forme d'yeux \*; & une pl. 105 n°. 1: a tre variété de Tejuguacu, nommée Tecui-\* 1b. tom. 1. xim \*. Plus, une belle & très-groffe Grenouille

pl. 96. n°. 3 de Virginie, remarquable par une large bande

\*Ibid.pl.75. longitudinale fur le milieu du dos \*.

rique fous le nom de Carret, ouverte & desséchée, adhérente à son écaille, dont les piéces \*Ibid.pl.80. sont en recouvrement les unes sur les autres \*:

elle a vingt-deux pouces de long de l'extrémité de la tête à celle de la queue. Plus, une Carapace de Tortue de terre d'un brun obscur, &

\* Mém. de de seize pouces de longueur \*.

l'Ac tom. 3: 22. Deux Tortues de mer complettes, l'une de l'espéce du Carret, l'autre nommée Caouanne: elles ont environ un pied de longueur. Plus, le squelette de la tête d'une grosse Tortue; & un bocal contenant quatre peutes Tortues de mer, des Indes, dans l'esprit-de-vin: celles-ci

sont en dessus d'un brun très - obscur, à l'exception du cou & des bords qui sont ceints d'une petite bande jaune \*.

23. Cinq Carapaces de Tortue: sçavoir, une 1.pl.79. nº.5. de Tortue de terre du Brésil, formée de larges écailles rhomboïdales dont le centre est pointillé \*; une de même espèce, mais moins gran- \* Ibid. pl. Sc. de ; une autre variété, dont le contour est orné no. 2. de triangles alternatifs noirs & blancs \*; & deux \*Grew. mus. de Tortue de mer, l'une de Carret, l'autre de reg. soc. tab. 3. Caouanne.

24. Six autres Carapaces de Tortue de terre: fçavoir, une à écailles héxagones brunes relevées en bosse, du centre de chacune desquelles partent neuf à dix bandes jaunes en forme de rayons \*; une à-peu-près semblable, mais à \* séba, tom. écailles moins convexes; une à écailles brunes 1.pl.30, n°.3. pointillées de traits jaunes; & trois de l'espéce des premieres de l'article précédent, dont une avec une Tortue artificielle.

25. Quatre petites Tortues, dont trois des Indes, de l'espéce des dernieres de l'article vingt-deux; une Tortue de terre de nos climats, à écailles brunes pointillées de jaune. Plus, quatre petites Carapaces de desseins variés & fort jolis \*.

\* Ibid. no. 4.





## SEPTIEME PARTIE.

#### INSECTES.

\*Séba, tom. I. Un grand Scorpion des Indes \*; & un x.pl.70. n°.4. \* 1b. tom. 2. grand Millepieds oriental \* dans l'esprit-de-vin. 2. Quatre variétés de Millepieds dans l'espritpl. 25.110. 3.

de-vin, & un Scorpion desséché, moins grand que le précédent. Plus, une Scolopendre de

\* 1b. tom. 1. mer fur une branche de Sargazzo \*.

pl. 81. 11°. 7.

3. Deux très-grosses Araignées dans l'espritde-vin, dont une de Ceylan, ayant sur le dos \* Ib, pl. 69. comme un bouclier \*: l'autre est une Tarentule d'Italie. Plus, fix petites boëtes vitrées, conteno. I. nant autant de variétés d'Araignées, dont une très-groffe d'Amérique \*; & un nid d'Araignée \* 16. tom. 2. très-singulier en ce qu'il est pratiqué dans un pl. 41. lett. C. morceau de terre, & que son couvercle assez

épais, ferme par une espéce de ressort: ila été trouvé dans les avenues d'Aranjuez.

4. Dix petits Bocaux contenant divers insectes dans l'esprit-de-vin : sçavoir, deux de Vers palmistes, cinq de Chenilles, un de Cloportes, un de Chenilles à tiges, un de Chrysalides, & une Courtilliere ou Taupe-grillon.

5. Dix-huit petites Boëtes vitrées : sçavoir, trois de Millepieds, une de Cloportes, trois de Punaises terrestres & aquatiques, cinq de Teignes aquatiques, avec leurs étuis formés, les uns de grains de fable, les autres de petits brins de bois, de fragmens de Coquilles, de planorbes, &c. deux de Fourmis, les unes aîlees de Cayenne, les autres sans aîles; une de rouleaux de feuilles de Rosier, formés en terre par une Mouche à scie; une de petites coques faites par des Vers mangeurs de Chenille; une Blatte, un Kakerlac, & une Chryfalide. Plus, deux Cocons de Chenilles des Indes, dont un tissu de fils couleur d'or, & l'autre composé d'un grand nombre de cellules.

6. Vingt autres Boëtes semblables, contenant autant de variétés de Mouches, les unes à deux aîles, les autres à quatre aîles, telles qu'Abeilles, Guêpes, Frêlons, Ichneumons, Cousins, Ephémeres, &c. Plus, un Guêpier de Cayenne, & deux Gâteaux de Frêlons.

7. Quinze autres Boëtes : sçavoir, douze de Demoiselles, très-variées, dont trois d'Espagne, & les autres de France; & trois de Cigales de différentes grosseurs. enluminées de

8. Deux Mantes peu communes, l'une est la M. d'Auben-Fraize de S. Domingue 1: l'autre est nommée f. 2. le Spectre 2.

cuit. tab. 7. 9. Deux autres Mantes des Indes, dont une 1. 1. 1bid. tab. 19. f. 9. Hh iij

Roëfel. Lo-

très-singuliere, en ce qu'elle a six aîles, dont les extérieures font de même nature que les interieures. & ne peuvent servir de fourreaux à celles-ci . comme dans les autres Sauterelles

\* Séba, tom. ailées \*

4. pl. 73. n°. 10. Une Feuille ambulante d'une espéce 3 8% 4. \* Roëlel. Lo-rare \*, & trois Sauterelles aîlées des Indes, cust. tab. 17. dont deux variétés.

> 11. Vingt-deux petites Boëtes vitrées : fçavoir, neuf de Sauterelles, formant autant de variétés, deux de Courtillieres, une de Tipule, une de Scorpions aquatiques; une de Punaises aîlées, & huit de Galles de chêne, d'orme, de hêtre, de genêt, d'églantier, &c.

> 12. Trois beaux Scarabées: sçavoir, le Taureau volant, le Rhinoceros de Cayenne, & un Cerf-volant.

13. Huit Scarabées étrangers, peu communs: \* Pl. enlum. fcavoir, un grand Arlequin de Cayenne \*, un de M. d'Au-Bupreste doré, deux autres Buprestes en pendant, deux variétés de Capricornes, un Rhinoceros, & un Cerf-volant femelle.

> 14. Huit autres Scarabées : scavoir, un Arlequin de Cayenne, de moyenne grandeur; quatre Buprestes des Indes, dont un entiérement doré, un qui est, de plus, remarquable par deux taches couleur de paille, presque rondes fur le milieu de chaque élitre; & deux à élitres

f. I.

rouges & corselet doré; deux variétés de Capricornes, & deux de Rhinoceros.

15. Quatorze petites Boëtes vitrées, con enant quatre variétés de Scarables porcs ou à trompe, entr'autres le Scarabée palmiste de Mademoiselle Mérian \*; trois variétés de Capricornes; deux variétés de Buprestes, des Hanne-48. tons, des Ditiques, & autres Scarabées de dif- scha, tom. 4. férentes espéces.

\* Insect. de furinam. pl.

16. Dix-huit autres Boëtes contenant autant de variétés de Scarabées, tels que Bupielles, Scarabées pillulaires ou Escarbots, Chrysomeles, Staphilins, Grillons, Proscarabées, Taupins, Dermestes, &c.

17. Dix-huit autres Boëtes de Scarabées, dont une de Scarabées voraces des Isles, une de petits Scarabées gris à trompe; plusieurs variétés de Cantharides, des Escarbots, des Hannetons, des Staphilins, &c.

18. Vingt-autres Boëtes, dont une de Pucerons, & les autres de petits Scarabées, entr'autres quatre variétés de Coccinelles-, des Charensons du bled, de petits Scarabées du seigle sauvage, des Cantharides, &c.

19. Une belle Phalene de la Chine, dont les aîles ont huit pouces d'envergure : fir le milieu de chacune est une espéce de vitrage triangulaire, bordé de noir sur un fond

Hh iv

rouge, qui la peut faire nommer la Vitrée de la Chine.

- 20. Le beau Papillon de la riviere des Amazones : ses aîles sont d'un bleu lustré des plus viss.
- 21. Deux grands Papillons d'Amérique: les aîles de l'un font bleu d'azur, avec une large bordure brune, & deux rangs de taches blanches: celles de l'autre n'ont qu'une fimple écharpe bleue fur un fond rembruni: les aîles de ces deux Papillons font oculées en deffous.

22. Six Boëtes vitrées contenant autant de variétés de Papillons: sçavoir, le grand Paon de nuit, le Sphinx du Troesne, le Tabac d'Espagne, la Belle-dame, la grande Tortue & le Vulcain.

23. Douze Boëtes de Papillons: sçavoir, cinq variétés tant des Indes que d'Amérique, & sept de France, dont le Papillon à queue du fenouil, le petit Paon du jour, le Morio, &c.

- 24. Quinze autres Boëtes: sçavoir, trois de Papillons étrangers, dont une Phalêne couleur de rose, à bandes blanches pointillées de noir, de S. Domingue; sept de Papillons diurnes, & cinq de Phalênes de France. Les noms des Papillons sont sur chaque boète.
- 25. Dix-huit Boëtes de Papillons: sçavoir, six de Papillons étrangers, dont le Verd doré,

le Nacré, le Paon du jour de la Martinique, & deux Papillons porte-queue des Indes, & douze de Papillons & Phalênes de France, dont le Souci, le Silene, la petite Tortue, l'Ecaille martre, le Ptérophore, &c.


26. Seize Boëtes de Papillons diurnes de France & d'Espagne, formant autant de variétés, dont le Porte-queue à deux bandes blanches, le petit Nacré, le Gamma ou Robert le Diable, le Deuil, le Demi-deuil, le Gazé, l'Aurore mâle, &c.

27. Seize autres Boëtes de Papillons diumes de France, dont l'Aurore femelle, le Satire, le Bronzé, l'Argus bleu, l'Argus brun, l'Argus vert ou l'Argus aveugle, le demi - Argus, &c.

28. Dix-huit Boëtes de Phalenes de France: sçavoir, la Minime à bandes, la Likenée rouge, la Phalene-chouette, la Feuille morte, le Volant doré, le Lamda, le Zig-zag, &c.

29- Vingt autres de Phalênes plus petites, telles que la *Phalêne-Carmin du Seneçon*, la *Chappe verte*, &c. tous ces Insectes sont bien conservés.





### HUITIEME PARTIE.

#### OISEAUX.

\* Edwards, I. Un Lorri perruche des Indes orientales \*, Hist. nat. des très-bien conservé, & monté sur un petit pied de bois.

\* Ib. pl. 173. 2. Un Lorri écarlatte à longue queue \*, monté pareillement.

3. Une rare & belle Grive des Indes, à tête noire ornée de deux bandes jaunes, à gorge jaune & collier bleu-turquin: ses aîles sont maurdoré, bordées de noir & de blanc; le ventre & la poitrine rayés de jaune & de bleu obscur, & la queue de même couleur que le collier.

\* 1b. pt. 149. 4. Un Paille-en-cul\* de l'Isle de France, & un Damier ou Pierrot tacheté du Cap de Bonne-\* 1b. pt. 90. Espérance \*.

5. Un Fou de l'Ascension, & un Damier.

6. Un Moineau de Bengale, & un Martin-pêcheur du Pérou.

7. Un Tangora du Pérou, à tête & ventre

jaune, & la petite Perrache du Pérou, à tête bleue & gorge rouge.

8. Deux Colibris & deux Cardinaux, l'un

mâle, l'autre femelle.

- 9. Neur Becs d'oiseaux étrangers : sçavoir, deux peu communs du Colao, espéce de Corbeau cornu d'Amérique, nommé aussi Rhinoceros, ou Oiseau trompette, & des deux variétés gravées dans Willugbi \*; un de Casouar; \*Ornithol. un d'une espèce de Crue du Brésil, nommée tab. 17. Jabiru\*; un de Toucan, un de Pelican, un de Phanicoptere ou Becharu, un d'Espatule, & un 47. de Lancette; un squelette de Canard, trois variétés de Nids d'oiseaux, dont un Nid pensile des Indes, fait en forme de chausse d'Hypocrate, & ayant près de trois pieds de longueur; un de Colibri, deux d'Alcyons, l'un dans son état naturel, l'autre nettoyé de ses plumes, & tel que les Chinois l'emploient dans leurs ragouts les plus exquis. Plus quatre @ufs, dont deux verds & un bleu.
- 10. La peau & le bec d'un Toucan, & plufieurs gorges de petits Oiseaux d'un joli plumage. Ces dernieres sont encadrées, & sous verre.
  - 11. Deux Œufs d'Autruche en pendant.

12. Idem.





### NEUVIEME PARTIE.

### QUADRUPEDES.

- phant, l'une de treize pouces de longueur sur fix de hauteur, & trois & demi de largeur; l'autre un peu moins grande.
- 2. Deux autres dents molaires d'Eléphant, dont une premiere à peu près de la grandeur des précédentes, tenant encore à une portion de la machoire, & usée dans sa partie supérieure par le frottement de la massication; & une seconde de sept pouces de longueur sur autant de hauteur, & près de trois pouces de largeur, sciée en deux, & polie pour montrer l'organisation des plaques verticales & transversales. Plus un tronçon de désense de cinq pouces & demi de longueur sur trois de diametre.
- 3. Une Corne de Rhinoceros, de deux pieds trois pouces de hauteur sur sept de largeur à sa base: elle est un peu comprimée, fort recour-

bée en arriere, & de couleur brune obscure

dans toute sa longueur.

4. Une autre de deux pieds huit pouces & demi de hauteur sur près de huit pouces de largeur à sa base, de forme à peu près semblable à la précédente, mais différente en ce qu'elle a un fillon longitudinal sur sa partie postérieure, affez profond vers le bas, diminuant insensiblement & disparoissant tout-à-fait vers la moitié de sa hauteur : elle est couverte vers le bas de fibres saillantes, courtes & très-dures, semblables aux foies d'une broffe.

- 5. Une Corne de Rhinoceros de deux pieds cinq pouces de haut sur quatre pouces & demi de diametre à sa base qui est presque ronde. Cette Corne différe des précédentes, en ce qu'elle est plus effilée, presque droite dans les deux tiers de sa hauteur, & se recourbant ensuite en arriere. Elle est aussi couverte de fibres & un peu gercée vers le bas, mais lisse dans le refte.
- 6. Une autre rare, en ce qu'elle est double. L'antérieure est haute de deux pieds deux pouces, & latéralement comprimée à mesure qu'elle s'éleve. La seconde n'a que dix pouces de hauteur : sa forme est conique, aussi comprimée par les côtés, ce qui lui donne la figure d'un coin. Ces deux Cornes, presque contiguës par la base, adhérent ensemble à une portion

de la peau. La grande Corne a six pouces de diametre à sa base qui est presque ronde. La base ovale de la petite a six pouces dans son plus grand diametre, sur quatre dans son petit; & la base commune, sormée par le contour de la peau, est de treize pouces & demi de long sur sept de large. Toutes deux sont de couleur

Transact.
phil. n°. 470.
pl. 111. f. 6

7. Quatre Cornes de Rhinoceros: sçavoir, une de près de deux pieds de longueur, quoique la base en ait été coupée; une Corne naissante de six pouces & demi de haut, à base sort concave & polie; & deux autres petites Cornes naissantes que nous avons reçues adhérentes à la même peau, mais qu'un accident a détachées. L'une porte cinq pouces de haut, & l'autre deux seulement. Plus un tronçon de queue de Rhinoceros.

8. Une tête d'Hippopotame, garnie de fes <sup>2</sup> Grew, mus, dents; elle porte deux pieds de longueur<sup>2</sup>.

regal, foc. tab.

9. Une autre un peu moins grande.

10. Une grande tête de Vache-marine, avec fes défenses.

11. Une autre moins grande.

<sup>5</sup> Hist. de l'A. 12. Une tête de Lion <sup>3</sup>, & une d'une espéce cad. tom. <sup>3</sup>· de Sanglier des Moluques, nommé Baby-pars. 1. pl. 2. Roësa <sup>4</sup> ou Baby-Rousse <sup>5</sup>. <sup>4</sup> 55ba, tom.

r. pl. 50. f. 3.
Grew. muf.
reg. foc. tab.1.

13. Idem.

14. Une tête de Tigre ; deux de Renard du

Sénégal, & douze Défenses par pendans, donc deux de la Vache-marine de dix-huit pouces de long, six d'Hippopotame de différentes grosseur & longueur, deux de Phocas ou Loup-marin, & deux de Sanglier. Plus un morceau de peau de Sanglier avec son poil.

15. Un bois de Cerf à feize andouillers fur chaque perche, dont une à deux pieds neuf pouces de longueur, & l'autre un peu plus.

- 16. Un Refait de Cerf à huit andouillers, quatre sur chaque perche, revêtu de son écorce tuberculeuse, crevassée, & de la dureté du cuir. Il a dix-neus pouces de hauteur, & près de dix pouces de circonférence au-dessus des meules \*; \*Busson.Hist. & la moitié d'un bois de cerf monstrueux, pré-gén.& parc.du Cab. du Roi. cisément semblable, taut pour la forme que pour tous. 6. 20. 11.14. les dimensions, à celui dont il est parlé dans la Description du Cabinet du Roi, sous le N°. 588 \*.
- 17. Un très-beau bois d'Elan à dix fept an-21, f. 2. douillers, huit d'un côté, & neuf de l'autre, portant plus de deux pieds de hauteur, fur deux pieds dix pouces d'ouverture.

18. Un autre à peu près de même grandeur, mais à vingt andouillers, dix de chaque côté.

19. Un bois de Rhenne à vingt-huit andouillers, quatorze de chaque côté; sa hauteur passe trois pieds, & chaque perche se divise en trois branches palmées, d'où naissent plus ou moins d'andouillers; & un bois de Daim de vingtdeux pouces de longueur.

20. Cinq bois de jeunes Cerfs, dont un tenant à la tête, & les autres à des portions de l'os du front: l'un de ceux-ci n'a point encore d'andouillers. Plus la moitié d'un petit bois de Cerf, bizarre en ce qu'il fort trois andouillers presque immédiatement au-dessus de la meule, & que la perche fait un coude en cet endroit; la partie palmée d'un Bois d'Elan, taillée en cœur, un pied d'Elan avec son ongle; & une moitié de bois d'Elan, sur les deux côtés de laquelle on a gravé une chasse.

21. Trois paires de Cornes : sçavoir celles d'un Buffle, du Cap de Bonne-Espérance, te-\*Buff. Hist. nant à l'os frontal \*; celles d'un Bouc, & celles gén. & part. d'un Bouquetin, adhérentes à la tête de ces

Roi, tom. 11. animaux.

22. Trois autres paires de Cornes: sçavoir, celles d'une espéce de Bœuf sauvage, nommé Bison: les autres sont de Chamois. Elles sont toutes montées sur des têtes possiches, sculptées en bois.

23. Deux Cornes rares, l'une d'un Bœuf sauvage de Buenos-Ayres: cette Corne, qui est d'une grosseur remarquable, a deux pieds neuf pouces de longueur sur six pouces de diametre à sa base. Celles de cette espèce sont sort recherchées au Pérou, où l'on s'en sert en

forme

forme d'outres pour porter le vin dans les voyages. L'autre d'un animal des Indes qui nous est inconnu, a deux pieds dix pouces de longueur sur quatre pouces de diametre à sa base. Elle est noire, presque droite & relevée jusqu'aux deux tiers de sa hauteur de deux plis en spirale, dont un très-saillant. Le reste, jusqu'à sa pointe, est lisse & un peu recourbé.

24. Deux paires de Cornes: fçavoir, une paire de l'efpéce de la derniere de l'article précédent, & une qui en différe en ce que les Cornes en font moins grandes, plus droites, & leur fpirale du bas moins faillante. Plus une Corne de Bouquetin, & une de trois pieds quatre pouces de long, courbée en arriere, & comprimée latéralement comme celles du Bouquetin, mais différente en ce qu'elle est comme garnie d'anneaux un peu onduleux jusqu'à huit pouces de distance de sa pointe.

25. Quatre Cornes de Gazelles des Indes, dont deux un peu courbes de deux pieds dix pouces de longueur, & deux droites un peu moins grandes: les unes & les autres font garnies d'anneaux depuis la base jusqu'à la moitié de leur longueur, ou environ.

26. Seize autres Cornes: sçavoir, deux de la Gazelle des Indes, l'une courbe, l'autre droite; deux de la Gazelle d'Afrique, annuleuses preque jusqu'au sommet, & courbées en arc vers le

Tome I.

haut; quatre de la Gazelle du Bézoard, dont une paire adhére à une portion de l'os frontal; deux d'une Gazelle d'Arabie, adhérentes à la tête entiere de l'animal; deux petites de Chamois; deux de Bizon, & deux d'un animal des Indes: ces dernieres font contournées en spirale, & adhérent, ainsi que les quatre précédentes, à des portions de l'os frontal.

27. Un Pangolin ou Diable de Java, detrois

\* Buff. tom. pieds de longueur \*.

Te. pl. 34.
Siba, tom. r. 28. Un Tatou ou Armadille de Cayenne, de
Pr. 54. ft. deux pieds trois pouces de long, & de l'espèce

\*Buff. tom. nommée Cachicame ou Tatou à neuf bandes \*; ro. pl. 37. & deux peaux, l'une d'Hermine, l'autre d'Ecu-pl. 29. f. 1. reuil des Indes.

29. Un Cachicame femelle, moins grand que le précédent, & parfaitement conservé dans l'esprit-de-vin. Plus, un Fœtus de Cachicame dans la même liqueur.

30. Un Philandre d'Amérique, ou Marmose semelle, avec douze de ses petits, adhérens à

\* Buff. tom. fes mammelles \* : tous font très-bien confervés

Séba, tom. 1. dans l'elprit-de-vin.

rl. 31. f. 2. 31. Une Rougette ou Chien-volant à cou Merian insec. fusin, pl. 66, rouge de l'Isle de Sainte-Hélene, dans l'esprit-

\* Buff. tom. de-vin \*.

32. Le Squelette & la peau séparée d'un Hérisson, garnie de ses piquans; une jambe du Chevrotain des Indes: elle est de la grosseur d'une plume à écrire. Plus, quatre Squelettes, dont un de Taupe, un de Rat, un de Souris, & un de Chat monstrueux nouveau né. Ce dernier, outre les quatre pattes qui y sont dans leur position naturelle, en offre encore quatre autres, deux desquelles sont placées au dessous de la premiere vertebre du cou, & deux sous le sternum.

3 3. Un Chat monstrueux nouveau né, dans l'esprit-de-vin: il est composé de deux corps joints par la poitrine, de maniere que chacun a quatre jambes & une queue, quoiqu'il n'y ait qu'un cou & qu'une tête pour les deux. Cette tête n'a rien de monstrueux que sa position par rapport aux deux corps, le museau se trouvant placé entre l'épaule droite de l'un & l'épaule gauche de l'autre.

34. Un Cochon monstrueux nouveau né ; aussi dans l'esprit-de-vin: il n'a qu'un œil au milieu du front, trois dents incisives à la mâchoire supérieure, & il est privé de mâchoire inferieure.





## DIXIEME PARTIE.

#### L'HOMME.

#### PIÉCES D'ANATOMIE.

De E Squelette d'une tête humaine dans une boëte vitrée: cette tête est parsaitement conservée, & a toutes ses dents: elle a été coupée en dissérens sens, & montée avec des vis & charnieres d'argent, pour en faire la démonstration. On trouve dans la même boëte l'explication détaillée de ce qu'on doit observer dans l'intérieur de la tête par les diverses coupes qu'on y a pratiquées.

2. Les Tégumens d'une tête humaine injectés & féchés: il est aisé de remarquer les plus petites ramifications artérielles, & on y a conservé les parties externes des oreilles, les cils & les sourcils.

3. Un Cœur humain injecté, & une Ratte préparée.


4. Un Fœtus mâle, d'environ dix pouces de hauteur, dans l'esprit-de-vin.

J. Un Fœtus mâle de Négresse un peu moins grand.

6. Deux Fœtus, l'un mâle de quatre pouces de hauteur, l'autre femelle à-peu-près de même grandeur, tous deux dans l'esprit-de-vin; le premier est de trois mois.

7. Deux Squelettes de fœtus de près de trois pouces de hauteur. Plus, deux Fœtus, l'un d'un pouce & demi, l'autre un peu moins grand; & un Embrion de fix lignes, n'ayant encore aucune de ses parties bien distinctes. Ces trois derniers sont dans l'esprit-de-vin.

8. Une tête & un pied gauche de Momie d'Egypte.



BÉZOARDS, CALCULS, &c.

N Bézoard de Rhinoceros, de forme ovoide un peu applatie, ayant près de deux pouces & demi dans son plus grand diametre, sur environ deux pouces dans le petit. Sa surface est presque entiérement recouverte de protubérances tortueuses comme les replis du cerveau humain. Personne n'ignore la rareté de ce Bézoard.

2. Un Bézord de Porc ou Piedra del Porco 5

de près de deux pouces de diametre, monté en vermeil.

- 3. Un Bézoard oriental monté en or.
- 4. Un Bézoard de Cerf du Pérou, de deux pouces de diametre, monté en or dans le pays: cette monture est enrichie de quatre grosses perles & de neuf éméraudes.
- 5. Un Bézoard d'*Eléphant*, de forme sphéroidale un peu comprimée, pesant près de deux livres & demie.
- 6. Un Bézoard de Porc-épic sauvage, & un Bézoard oriental de Bornéo.
- 7. Quatre Bézoards orientaux, dont deux de Singe.
- 8. Trois Bézoards, dont un de Singe, un Bézoard verd de la côte Coromandel, & un blanc de Guinée, coupé en deux, pour en faire voir les couches & le noyau intérieur.
- 9. Quatre Bézoards, dont un de Porc-épic, un de la Vigogne du Pérou, & deux orientaux.
- 10. Deux gros Bézoards, l'un de Cayman des Indes, l'autre d'un animal du Paraguai, nommé Anta.
- 11. Un gros Bézoard de la côte Coromandel; & deux Pierres rares: l'une est de la vessicule du fiel de la plus grande espéce de Tortue de terre de l'Isse de Bourbon: elle est de

forme sphéroidale irréguliere, épaisse de trois pouces dans son plus grand diametre, & fort légere rélativement à sa grosseur : l'autre Pierre, qui est d'un blanc-jaunâtre, & fort pesante, se trouve dans le poisson Belluga, espéce d'Esturgeon du fleuve Wolga, dont on fait la colle de poisson. M. Collinson a donné, dans les Tranfactions philosophiques \*, un Mémoire sur cette \* phil. trapforte de Bézoard-

fact Angi.vol. 44. nº. 483.

- 12. Deux Bézoards des Indes, l'un de forme P. 451. ovoide un peu comprimée, pesant onze onces; l'autre aussi de forme ovoïde, mais dont l'applatissement se trouve en trois endroits également éloignés les uns des autres, de maniere que l'ovoïde a trois faces dont les plans sont paralleles à fon grand diametre, & trois côtes arrondies.
- 13. Quatre Bézoards de moyenne groffeur: sçavoir, un de l'Abyssinie, coupé en deux, & dont le centre est occupé par une petite pelotte filamenteuse; un de la côte Coromandel; & deux orientaux, l'un desquels a la forme d'une amande, & en contient effectivement une, dont l'enveloppe desséchée est un peu entr'ouverte.
- 14. Trois Bézoards, dont un de Tenasserim, un de Cayman du Pérou, & un Bézoard blanc de Guinée, coupé en deux pour montrer ses

504 CALCULS ET BEZOARDS.

couches concentriques, & le noyau qui lui sert de base.

- dont un de Sanglier, & un cassé en deux parties, duquel le noyau paroît être un fruit; un Bézoard de Cochon, & un Bézoard artissiel doré, ou Pierre de Goa.
  - 16. Un Bézoard oriental, & trois du Pérou.
- 17. Quatre autres Bézoards, dont un oriental, un de la côte Coromandel, un du Pérou, & un artificiel.
- 18. Huit Bézoards tant orientaux qu'occidentaux, dont un de Sanglier des Indes, &c. Plus trois prétendues Pierres de Serpents, dont une très-groffe: on croyoit autrefois que ces pierres fe trouvoient dans la tête d'une espéce de Serpent à lunettes des Indes orientales, nommé par les Portugais Cobra de Capelo; mais on est revenu de cette erreur. Un Brame nous a affurés dans le pays que cette pierre n'étoit autre chose qu'un morceau de corne de Cerf, taillé &c calciné ensuite comme nous le voyons: il s'en fait un grand débit à la côte Coromandel, où l'on croit cette pierre un reméde souverain contre la morsure des Couleuvres Capeles, & la piqure des Scorpions.
- 19. Douze Bézoards, dont un de Chien, & les autres des Indes ou de l'Amérique; plusieurs

desquels ont été usés ou cassés pour en voir l'intérieur. Plus, dix Noyaux de Bézoards oriencaux, & les fragmens d'un Bézoard occidental.

20. Sept autres Bézoards, dont trois Hippolithes, ou Bézoards de Chevaux.

21. Sept Egagropiles ou Bézoards de Poils, dont deux de forme sphéroïdale, un de forme ovoïde. & un cylindrique, revêtus d'une croûte mince & luisante; deux de Mouton, revêtus d'une croûte noire, & un formé de Poils roux affez longs & fans croûte. Plus, cinq Pierres du fiel des bœufs de Coromandel, & des Pierres du Castoreum. Ces Pierres sont celles que M. Geoffroy trouva dans les poches d'un Castor, & dont il donna la description à l'Académie des Sciences, dans la seconde partie de son Mémoire sur les Bézoards \*. Elles ont passé dans notre Cabinet avec la suite entiere l'Acad. des Sc. des autres Bézoards que M. M. Geoffroy pere 206 & 207. & fils avoient rassemblés : c'est cette même suite qui étoit sans contredit une des plus complettes que l'on pût voir en ce genre, que nous présentons aujourd'hui, augmentée de plusieurs autres Bézoards, particuliérement de ceux d'Amérique qui nous ont été envoyés du Pérou.

22. Deux Pierres humaines d'une groffeur. extraordinaire: elles font du genre de celles que l'on nomme Murales, de forme ovoïde appla-

tie, & pesent l'une dix onces & demie, l'autre fix onces & cinq gros.

23. Huit Pierres humaines, la plûpart de la vessie, & très - grosses, les unes de substance plâtreuse & friable, les autres compactes, dures & fort rabotteuses. Plus, une noirâtre dont le noyau joue en dedans, comme aux Pierres d'aigle, lorsqu'on la secoue:

24. Douze autres Pierres de vessies lumaines, remarquables les unes par leur grosseur, les autres par leur forme & la substance qui les compose: il y en a entr'autres trois assez grosses qui furent tirées du Pere Ange de Tréport après sa mort.

25. Douze Boëtes contenant plusieurs Calculs & Pierres humaines tant de la vessie que de la vessicule du fiel, avec une vésicule séchée, remplie de ces Pierres; un Spongia Veneris, & une suite de Graviers rendus par plusieurs personnes, à la suite de l'usage des pillules Angloises.

26. Vingt & une petites Boëtes qui contiennent une suite de Perles très-intéressante: sçavoir, deux Perles orientales rondes de la plus belle eau; une Boëte de Semences de Perles orientales; une de Perles occidentales du Pérou, aussi d'une belle eau; une de Perles d'Afrique plombées; strois de Perles d'Ecosse, les unes

blanc-mat, les autres grises, & les autres onices; une de Perles gris de lin, une de Perles en poire b'anc de lait, une de Perles hémisphériques, deux de Perles baroques, cinq de Perles de la Pinne-marine, dont une de rondes, rouge de Corail; une de Perles en poire de même couleur, une de grises, une de grises-verdâtres, & une groffe en poire, noire à zônes verdâtres; deux dont on a enlevé une partie de la couche extérieure, pour voir les intérieures; deux Loupes de Perles, dont une très-singuliere en ce qu'elle est semblable au gros mordant d'un Crabe: peut-être même en est-ce un, qui ayant été renfermé dans l'Huitre par quelque accident, aura été entiérement recouvert tant en dedans qu'en dehors, de la liqueur nacrée qui transfudoit du corps de l'animal; & une Coque de Perles.

27. Vingt & une boëtes de Perles de toutes les variétés de l'article précédent.

28. Un morceau d'Ambre-gris du poids de fix onces (\*).

<sup>[\*)</sup> Nous rangeons ici l'Ambre-gris, non comme un Bézoard, mais à cause de son origine qui est probablement dûe au regne animal. Il est constant, par le rapport de plusieurs Voyageurs instruits & bons Naturalistes , tels que Kempfer 1, Anderson 2, &c. que l'Am- 1Amcen. exobre-gris se trouve tout formé dans les intestins de quel-ticæ. fasc. 3.
Hist. de ques Cétacées. Nous avons eu plus d'une fois occasion de l'Islande & du nous assurer nous-mêmes que les prétendus becs d'oiseaux Groenland,

t. z. p. 128.

#### CATCITLS ET BEZOARDS 508

20. Deux autres qui pesent ensemble environtrois onces.

30. Trois Vessies de Muse du Tonquin dans une boëte de plomb.

que l'on y trouve presque toujours ; & souvent même en grande quantité, ne sont que des Becs de Seche ou du Polype, animaux qui servent souvent de proie à ceux qui produisent l'Ambre-gris. Si cette substance a donc été mise pat la plûpart des Naturalistes & des Chymistes au nombre des Bitumes, c'est, comme le remarque très bien M. Macquer \*, » plutôt d'après ses propriétés \*Diction. de » & à cause des principes qu'elle fournit lorsqu'on la 20 distille, que, par une connoissance certaine de son origine; car on ne connoît point d'Ambre-gris vérie

Chym. au mot Ambre.

02 tablement fossile.





### ONZIEME PARTIE.

### VÉGÉTAUX.

- rope & des deux Indes, dont quarante-quatre échantillons en petites tablettes polies & étiquettées. Plus un morceau de Bois rouge du Japon, & deux Bâtons des Indes, curieux par les nodofités & tubercules dont ils font revêtus dans toute leur longueur.
- 2. Deux morceaux de Bois, curieux: dans l'un, qui se sépare en deux, se trouve une espéce de Croix de Malte qui y a été comme imprimée par la nature; l'autre est une loupe d'arbre, creuse & mammelonée en dedans, mais dont l'extérieur est comme ciselé, à cause des sibres sans nombre qui y serpentent par ondes ou en forme de tourbillons.
  - 3. Cinq morceaux; sçavoir, un très-beau Bâton noueux des Indes, de cinq pieds de hauteur, & quatre variétés de cannes, dont une à sucre, une de Bambou, &c.

4. Deux morceaux curieux: l'un est le fameux Borametz ou Agneau de Scythie, que l'on a cru long-temps être un animal-plante, mais qui n'est dans le vrai que le collet d'une racine de fougere revêtu d'un duvet jaune rougeatre, & dont on a eu soin de retrancher les petites racines, tandis qu'avec les bouts des tiges, on a formé les prétendues pattes de cet Agneau. Cette espéce de fougere croît proche de Samara sur le Wolga: l'autre est un morceau de Bois rongé par les fourmis blanches connues aux Indes orientales sous le nom de Carias, & au Pérou sous celui de Comegen. On voit à la base de ce morceau, les trous par où se sont introduits ces insectes destructeurs. L'intérieur est évuidé presque en entier, & ne montre plus que des cloisons délicates paralleles les unes aux autres, striées suivant leur longueur, & qui ne tiennent ensemble que par des jambages latéraux & paralleles à la base, que ces insectes y ont laissés de distance en distance.

5. Différentes parties de végétaux; telles que racines, écorces, &c. entr'autres, une racine de la Chine qui imite un quadrupede; une qui repréfente la tête d'un oiseau à long bec; une racine de Manglier sur un granite; un agaric à longue tige; canelle blanche, canelle de la Province de Quito, avec la sleur

de l'arbre qui la produit; écorce de l'arbre du girofle de Maragnon; autre d'un arbre des Isles Malouines, laquelle réunit le goût de toutes les épices; écorce du Simarouba; écorce de l'arbre Aquila de la Havanne, dont on fait de la dentelle; avec un morceau de cette dentelle; deux bougies, l'une jaune, l'autre verte, faites de la cire de l'arbre de cire de la Louissane, cire végétale de la Chine, &c. en tout vingt-six morceaux.

6. Deux Cocos remplis: l'un de Baume de Tolu, l'autre de Baume du Pérou; plus une phiole de véritable Baume de la Meque.

7. Une suite de Baumes, gommes, résines, &c. tels que Baume de Sainte-Marie, Baume de Tolu, Gomme Copal, Laque en bâtons, Sang-dragon, Gomme Elemi, Oliban, Benjoin, Résine du pin, un morceau du bois qui donne la gomme Caragne, dans lequel on voit beaucoup de cette résine, &c. en tout trente morceaux, dont quelques-uns renserment des insectes.

8. Un Herbier contenant deux cent foixantedix plantes tant terrestres que marines. La collection des algues, fucus, mousses marines, est sur-tout intéressante par le nombre & la variété des espéces qu'elle réunit. Plus cinq Egagropiles de mer, composées de sibres végétales, entrelacées ensemble à peu près comme dans les Bézoards de poils. Deux sont ovoides, une sphérique, & deux très-grandes, caverneuses semblables pour la forme à certains Aleyons.

9. Un très-grand Coco de mer des Maldives, il est formé comme de deux lobes ovoïdes qui se réunissent par le milieu, de maniere à représenter une paire de fesses & les parties naturelles de la femme. Ces Cocos se trouvent sur le rivage des Isles Maldives, où ils sont jettés par les flots, sans que l'on sçache quelle est leur origine. Ils font très-recherchés des Indiens, qui les regardent comme un reméde universel, & qui les payent au poids de l'or.

10. Six fruits des Indes & de l'Amérique; sçavoir, deux grandes Calebasses, un Pain de singe, fruit du Baobab, arbre du Sénégal; trois grands Cocos revêtus de leur écorce, dont un entier, un coupé suivant sa longueur, & un coupé transversalement pour faire voir l'épaisfeur & la nature de l'enveloppe extérieure. Plus un Coco des montagnes d'Andos au Pérou. avec son couvercle, & un faisceau de branches à fruit du Palmiste.

11. Vingt - deux variétés de Cocos de moyenne grandeur, & petits, tant de terre que de mer : il y en a des Indes orientales, du Brésil, du Chili, du Mexique, du Choco au Pérou, &c. & plusieurs noix d'Areque, dont une avec son enveloppe.

12. Un tiroir contenant divers fruits d'Europe & des deux Indes, tels que Cocos, Pommes de Pin, de Cedre, de Cyprès, Coloquintes, Calebasses, Courbaris, Huras, Pain de singe, Figue banane, Coton du fromager avec son enveloppe, seuilles de Coca, que les Amériquains mangent, comme les Indiens le Bétel, &c. en tout soixante morceaux.


13. Trois cent variétés de graines, filiques, amandes, noyaux, &c. d'Europe & des Indes. Plus vingt-quatre échantillons de Thé, avec les différentes préparations de cette feuille; ce qui forme une fuite complette de tous les états par où elle passe avant de nous être apportée.

14. Un bocal & un flacon qui contiennent, l'un deux fruits de Muscade entiers, l'autre une Ate ou Pomme de Canelle d'Amérique; cette derniere, qui avoit été mise petite dans la liqueur, y a pris tout son accroissement, comme il est aisé d'en juger par son diamètre, qui est du double plus grand que le goulot du flacon qui la renserme.

15. Deux bocaux contenant, l'un des Citrons de la Chine, de l'espèce nommée vulgairement le Monstre, l'autre trois racines en forme de mains.

Fin du premier volume.

Tome I.



# TABLE

## ALPHABÉTIQUE

#### DES CURIOSITÉS NATURELLES

Contenues dans le premier Volume.

### A.

A contract of the contract of	
Page Page	485
l'Abricot,	.336
Acétabule,	. 58
Agaric. Voy. Alcyons, Astroites, Epon	2-
ges, Madrépores & Rétépores.	
l'Agate,	269
l'Agatine,	150
Agneau de Scythie,	. 510
l'Aigle (Poisson);	476
l'Aigrette,	163
l'Aiguille,	223
à coudre	220
en vis de tambour,	223
de mer (Poisson)	,
l'Aile d'Ange,	477
de Chauvesouris femelle,	
	191
de Chauvesouris mâle,	ibid.
de Papillon (corner)	234

TABLE ALPHABÉTIQUE	315
l'Aîle de Papillon (telline),	370
es Aîlées,	179
l'Aîle large,	ibid.
Alcyons,	66
en agaric,	68
en cornes de daim,	67
en figue,	ibid.
en poire,	ibid.
en vesse de loup,	89
l'Aléne,	220
Algues,	511
l'Amadis,	234
l'Amande,	.340
à cils,	345
rôtie,	357
Ambre gris	507
l'Amiral,	233
à deux bandes,	ibid.
d'Angleterre,	234
d'Orange,	232
malqué,	233
Ammonies,	101
Amphibies,	478
Amphisbene. Voyez Double Marchen	r.
l'Anémone de mer,	469
l'Ane rayé,	134
Anomies, 9,10,14	
Antales,	9.8
l'Antenne d'écrevisse,	57
l'Apan,	390
Araignée (infecte),	484
l'Araignée. Vovez Bécasse évineuse.	
femelle (murex)	189
mâle s (murex)	188
Kk ii	

1.0	
l'Arche de Noé,	359
	357
	270
l'Argus fascié (Buccin),	143
l'Argus aveugle (Papillon)	489
	bid
5204 (	bid.
Didi (their)	bid
4014 (1001)	486
	270
	-/-
Armadille. Voyez Tatou,	· A=
	97
2 2222	414 180
A AATT THE OTHER STREET,	
Aftroites,	21
Astroite à étoiles anguleuses, 22,	
2001100 1011110 3	bid.
agaric,	2 2
globuleux, 22,	
tête de more,	2.2
l'Astrolépas,	86
Astrophite. Voyez Tête de Méduse.	
	5 I 3
	244
	489
	bid
В.	
70	
BABY-ROESA	
	594
Baby-Rouffe )	
Shidillo (Shiring)	477
(membre),	476
(nageoire),	477

	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ALPHABÉTIQUE	317
	Baleine (os de l'ouie),	ibid.
	(vertebre)	476
	Baliste scolopax,	ibid.
a	Barbe de mer,	57
	Barillets. Voyez Cœurs marins.	
	Barnacle. Voyez Conque anatifere.	
	Basilic factice,	476
	Bateau (cœur en)	349
,	Bateau (lépas en)	82
	Baume de la Méque,	511
	de Sainte-Marie,	ibid.
	de Tölu,	ibid.
	du Pérou,	ibid.
a	Bécasse. Voyez Tête de Bécasse.	
	épineuse,	203
	Bec de Becharu,	49.I
	de Canard (coquille),	377
	de Casouar,	491
	de Colao,	ibid.
	d'Espatule,	49 I
	de Jabiru,	ibid.
	de Lancette,	ibid.
	de Pélican,	ibid.
	de Perroquet (coquille),	311
	de Toucan,	49 I
	Becharu. Voyez Phanicoptere.	1
	Becune (machoire de),	476
	Beignets, 423,	
	Belle Dame,	488
е	Benitier (cœur),	368
e	Benitier (peigne), Bézoard, Voyez casques.	317
	Bézoard d'Anta,	502.

Kk iij

Bézoard de Bœuf,	505
de Cayman,	502
de Cerf du Pérou,	ibid.
de Cheval,	505
de Chien,	504
d'Éléphant,	502
de Mouton,	505
de Poil, Voyez Egagropiles.	
de Porc,	SOL
de Porc épic,	50.2
de Rhinocéros,	501
de Sanglier,	504
de Singe,	502
de Tortue de terre	ibid.
de Vigogne,	ibid.
du poisson Belluga,	503
factice. Voyez Pierre de Goa.	
la Bille d'ivoire,	336
Bison (cornes de),	496
la Bistournée,	285
Bivalves. Voyez Coquilles.	
Blatta bisantia. Voyez Ongle odoran	t.
Blatte,	485
Bœuf de Buenos-Ayres (cornes de)	496
Bois de Cerf,	495
le Bois de Cerf. V. Madrépores & Mill	epores.
le Bois de Cerf. Voyez Patte de Crapat	id.
Bois de Daim,	496
d'Elan,	495
de Rhenne,	ibid.
Bois (échantillons de)	509
figuré,	ibid
rongé par le Carias,	510

ALPHABÉTIQUE.	519
Bois rouge du Japon,	509
le Bois veiné,	160
le Bonnet Chinois,	90
	, 87
de Fou. Voyez Cœur de bœuf.	, , ,
de Matelot,	92
de Neptune (éponge),	62
de Neptune (fongipore),	38
de Pologne,	,
Borametz. Voyez Agneau de Scythie.	174
la Bossue,	265
	ibid.
Bouc (tête de)	496
Boucarde. Voyez Cœur de bœuf.	470
la Bouche à droite. Voyez Contre-unique.	
à gauche. Voyez Unique.	
d'argent,	1.1.2
de lait,	145
d'or,	112
double, 120,	
	, 86
les Boucliers (Ourfins)	42 I
la Bouée,	222
Bouquetin (tête de),	496
la Bourse,	321
le Bout de Chandelle,	234
le Bouton de Camifole,	123
de la Chine,	125
le Brocard de foie,	-
la Brocatelle,	256
le Bronzé,	489
la Brulée,	
la Brunette,	195
	254
K k iv	

520 LABLE.	
les Buccins,	Tar
à bouche entiere,	133
à bouche échancrée,	136
à longue queue,	155
à petite queue,	143
fluviatiles,	430
terrestres,	- 445
le Buccin crenelé,	147
de la Mer Rouge,	181
feuilleté,	144
Buffle (cornes de)	496
la Bugle Coralline,	57
la Bulle d'Eau,	200
Buprestes,	-486
dorés,	ibid
les Burgaux,	IIC
le Burgau perlé,	111
Bysfus de la Pinne-marine,	389
Dyfrus de la Pillite-liatille,	
Byssus (bas & gands faits de)	390
1-0	
le CABESTAN,	144
Cabochon. Voyez Lepas.	

le	(ABESTAN,		14	4
	Cabochon. Voyez Lépas.		·	ľ
	Cachalot (dentde)		47	7
	Cachicame femelle,		49	8
	mâle,	ż	bic	1.
le.	Cadran,		12	3
	Cacilia. Voyez Serpent aveugle.			
le.	Caffé au lait,		27	1
	Calcul humain, 50	5,	50	G
	Calemar,		46	0
le	Calice, Vovez Madrepores.			

1.0	
ALPHABÉTIQUE.	521
la Calotte,	60
les Cames,	328
à bases ovales irrégulieres,	344
à bases ovales régulieres,	339
à bases rondes irrégulieres,	335
à bases rondes régulières,	329
d'Eau douce,	433
la Came coupée,	360
coupée en bec de flute,	361
feuille,	340
luifante,	34I
Pholade,	375
radiée,	362
truitée,	340
tronquée,	360
violette,	343
Caméléon,	481
Canard (squelette de)	49 I
Cancres,	474
le Cancre des moluques,	ibid.
ours,	47 I
fquinade,	474
velu,	ibid.
Canelle blanche,	510
du Pérou,	ibid.
Cantharides,	487
Caouanne,	482
Carapaces de Tortue,	ibid.
le Cardinal (oiseau)	49 I
la Cardinale (coquille)	141
Carret,	482
la Carre géographique,	267
Caryophilloïdes,	37

- 22	Z 11 10 , La, 100	
	Casouar (bec de)	491
le	Casque Bézoard,	173
	en baudrier,	174
	pavé ou truité,	172
	plume,	171
	rayé,	174
	triangulaire,	177
	tricotté,	17.8
la	Castagnette,	299
	Cauris. Voyez Kauris.	
le	Cedo Nulli,	339
	Cérébrites,	27
	Cerf (bois de)	495
	Cerf-volant,	486
la	Chagrinée 7	
	ou }	346
	Chagrin,	
la	Chaloupe. Voyez Oscabrion,	2
	Chamois (cornes de),	496
	Chapeau de Neptune,	5.9
la	Chappe verte,	489
le	Char de Neptune. Voyez Madrépore.	5.
le	Chardon,	414
	de mer,	) 68
	Charensons,	487
-	Chat monstrueux,	499
la	Chausserrape,	164
	de M. Dargenville,	1194
12	Chauvesouris. Voyez Foudre.	
	Chenille (insecte),	484
	à tiges,	ibid.
1	a Chenille bariolée,	226
	blanche,	.1229

	ALPHABÉTIQUE.	.523
la	Chenille blanche réticulée,	227
	de mer. Voyez Oscabrion.	1 17
1 10	de mer. Voyez Taupe marine.	
	granuleuse,	227
	noire,	226
le ·	Cheval de frise,	194
	marin (petit),	476
le:	Cheveu de mer,	56
,	Chevrette,	471
	Chevrotain des Indes (jambe du),	498
da .	Chicorée,	199
1 7, 2	Chien de mer,	475
	(sa gueule),	476
	Chien volant,	498
le	Chou,	366
	de mer,	38
	Chou-fleur. Voyez Madrépores.	
	Chrysalides,	484
	Chryfomeles,	487
le.	Cierge (Cornet),	247
	Blanc,	ibid.
4	Jaune,	ibid.
	Cierge (éponge),	61
le.	Cierge (tuyau de mer),	98
1.	Cigale,	485
	Cigne, Voyez Cierge blanc.	
1e	Clocher Chinois,	226
1.	Gothique,	228
	Clockette, Voyez Glands de mer.	
1a ,	Cloniffe,	333
. 10	Cloporte (infecte),	484
le	Cloporte (porcelaine).	276
16.	Ciobonie i Doiteianie i.	2.70

S24 TABLE	
le Cloud,	219
Coccinelle,	487
Cochon monstrueux,	499
Coco des Maldives,	512
des montagnes d'Andos,	ibid.
Cocons de Chenille,	485
les Cœurs,	348
marins,	418
nommés Arches,	357
ou Conques de Venus,	360
proprement dits,	349
le Cœur allongé,	354
de Bœuf,	355
de l'Homme,	353 ibid.
de Pigeon,	
de Venus,	349
en bateau,	353
en foufflet,	355
épineux, triangulaire,	353
tuilé,	ibid.
Colao, ou oiseau trompette,	491
Colibri,	ibid
la Colique,	273
la Comete digitée miliaire, 456	, 458
épineuse,	450
Concha exotica,	3.5.1
Concha veneris à pointes,	.36
Concha veneris à rézeau,	ibid
Concha veneris sans pointes, V. la Créo	le.
la Conchiliologie, Voyez La Fripiere.	
le Concho-Lepas,	. 8-
Concombre marin,	469

ALPHABÉTIQUE.	525
a Conque de Triton,	149
éxotique,	351
persique,	214
Conques Anatiferes,	405
de Venus,	360
sphériques, Voyez Tonnes.	7
la Contre-unique (limaçon),	443
la Contre-unique (porcelaine),	266
la Contre-unique (vis-buccin),	448
le Coq de mer,	473
le Coq & la Poule,	312
Coque de perles,	507
le Coqueluchon de Moine,	358
Coquilles,	71
Bivalves d'eau douce,	433
Bivalves de mer,	277
fluviatiles,	427
Multivalves de mer,	39 I
terrestres,	436
Univalves d'eau douce,	428
Univalves de mer,	
Corail,	75
articule, Voyez faux Corail.	5
blanc,	8,9
blanc oculé, Voyez Madrépore	
noir, Voyez keratophites.	5.
	, 10
	8,9
rouge & blanc, violet, Voyez <i>Madrépores</i> .	, 9
a Coralline,	710
Corallines, 9, 14,56	319
Corallines, 9, 14, 56	
	ST;

320	
Corallines à lentes,	ibid.
à rouffe couleur d'ivoire,	ibid.
Coralline bugle,	57
commune,	ibid.
rampante,	ibid.
tubuleuse de Malte,	104
la Corbeille (came),	339
la Corbeille (cœur),	358
la Corbeille (huitre),	289
la Cordeliere,	ISI.
le Cordon bleu,	117.
la Corne d'abondance,	289
Corne de Rhinocéros double,	493
Corne de Rhinocéros simple,	492
Cornes de Bœuf de Buenos-Ayres,	496
de Bison,	496
de Bouc,	ibid.
de Bouquetin,	ibid.
de Chamois,	ibid.
de Daim,	ibid.
de Daim. Voyez Frondipores	5 ,
'Alcyons, Éponges, Madrépores.	
de Gazelle,	497
d'Elan,	495
de Rhenne,	ibid.
le Corner de chasseur,	44 I
de postillon,	101
de S. Hubert	439
ponctué,	24I
les Cornets,	232
la Cornue,	399
le Courlis, Voyez tête de Becasse.	
Couronne de serpens,	406

ALPHABÉTIQUE.	,
	527:
la Couronne d'Ethiopie,	210
Impériale,	247
Papale, Voyez Thiare.	
Courtilliere,	484
Cousins,	485
le Coutelier, Voyez manches de coutea	u.
le Contil, Voyez toile à matelas.	
le Crabe à nœuds ou gouteux,	191.
commun,	189
porte-croix,	472
faxatile,	472
fillonné,	473
la Command (manual in )	ibid.
le Crapaud (rocher), la Créole.	273
la Créole,	170
la Crête de Coq,	363
Crocodile, Crimer Comment	287 481.
Croix naturellement empreinte dans i	-401·
morceau de bois,	
Crustacées,	470
à corps allongé,	471
à corps arrondi,	474
à corps large,	472
la Cuiller de Neptune,	212
à pot,	223
la Cuisse,	286
la Culotte de Suisse,	169
les Culs de lampe,	125
le Cyprès de mer,	57
marin,	49

### D.

T	
DAIM (bois de),	496
Damier (oiseau),	490
le Damier (coquille),	245
à bandes jaunes,	ibid.
Dattes (coquilles),	386
Dauphin (tête de)	476
le Dauphin (coquille)	110
Décempede de Cornouaille,	465
Défense d'Elephant,	492
d'Espadon,	476
d'Hippopotame,	495
de Narwal,	476
de Phocas,	495
du poisson scie;	476
de Sanglier,	495
de Vache marine,	ibid.
le Demi-argus,	489
le Demi-deuil (coquille),	112
le Demi-deuil (papillon),	489
Demoiselles,	485
Dentales,	98
Dentelle de l'arbre Aquila,	511
Dents de Cachalot,	47.7
d'Elephant,	492
d'Hippopotame,	147 3
de Loup marin, V. Defe	inses.
de Sangtier,	3
de Vache marine,	i
Dermestes,	387
le Devidoir. Voyez la Bistournée.	0
le Deuil,	489
	Diable

ALPHABÉTIQUE.	529.
Diable de Java,	498
de mer,	- 475
Ditiques,	487
le Dofan,	103
Dorade de la Chine,	476
le Dotel. Voyez Gueule de Souris.	
Double marcheur,	479
Dragon aîlé. Vozez Lézard volant.	
le Dragon, (coquille),	168
le Drap d'argent,	254
d'or,	251
d'or à fond bleu,	252
d'or fascié,	251
d'or piqueté,	253
d'or de la Chine,	252
mortuaire,	258
orangé,	252
Drap-marin, 151, 333	359
E.	
The same of the sa	
l'H CAILLE martre,	489
l'Ecorchée,	255
Ecrevisse d'eau douce,	471
de mer,	ibid.
l'Ecriture Arabique,	
l'Écriture Chinoise,	344
Ecureuil des Indes (peau d')	
Egagropiles,	498
Egagropiles de mer,	505
Elan (bois d'),	511
Elan (pied d'),	495
Elephant (dent d'),	496
Tome I.	492

ya , · ;	
l'Enclume, Voyez la cuisse.	
l'Enfant au maillot, de mer.	222
terrestre,	448
l'Enfumée,	195
l'Entonnoir, 80	86
l'Éperon,	123
Ephémeres,	4.85
l'Epi de bled,	15
l'Episcopale,	186
	:59
	, 64
commune,	59
des Frotteurs,	60
	61
en cornes de Daim,	64
	bid.
	64
Oursin,	63
l'Equerre, l'Escalier. Voyez Scalata & Cadran.	286
	.0.
	487
	57
Espatule (bec d'),	31
	49 I 248
l'Ethiopienne,	150
	452
	455
	465
	ibid.
	462
à grains de miller, 455,	
à grains de petite vérole, 454,	
0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	

ALPHABÉTIQUE	Ė,	33.1
Étoiles à quatre rayons,		454
à queue de Lézard,		464
à rayons entiers,		bid.
à rayons fendus,		454
arborescentes,		466
à sept rayons,		462
à six rayons;		46I
à treize rayons;		463
à treme-huit rayons,		ibid.
à trente-sept rayons,	,	462
chevelues,		464
coriacées,	4550	458
cruciformes,		454
digitées	458,	
	459,	
étoilées,	4540	
falciformes,		454
jaune vulgaire de Luid,		460
pectinées, réticulées lentigineuses,		455
rofacées,		458
vermiformes,	J .	465
l'Éventail (éponge),		464
l'Éventail, Voyez la Sole.		60
des Mennonites;		33 I
de Thétis, Voy. panache	de met	
F		
a MAITIERE, Voyez la Tuilée.		
e Falier,		266
a Fausse aîle de Papillon,		244
Arlequine,		271
Gourgandine,		364
Ī.	l ii	

1.	7 - 1 - 1	
la	Fausse oreille de Midas,	13.
	Scalata, "	22
le	Faux Amiral, Voyez le Navet.	
	Faux Amiral de Guinée,	23
	Argus,	27
	Faux Corail,	. 4
	Blanc articulé,	45 5 40
	géniculé ou	40
	noueux,	ibia
	rouge articulé,	ibia
·la	Féverolle,	340
la	Feuille (came),	340
la	Feuille (huître),	287
la	Feuille ambulante,	480
	de chou,	366
	de chou. Voyez Millepore.	
	morte (phalene),	489
la	Figue blanche,	2, 1 6
31	violette,	217
	Fileuse,	249
la	Flamboyante,	236
la	Flute de Pan,	60
		00,501
	Fongipores,	. 36
.1	en bouquet,	36,37
	Foret,	225
le	Fort Pentagone,	457
	Fou (oiseau),	490
le.	Foudre,	160
le	Four ardent. Voyez Bouche d'or.	.0.
	Fourmis aîlées,	485
-	fans aîles,	ibid.
la	Fraise (coquille),	353

	ALPHABÉTIQUE.	533
a	Fraise de Saint-Domingue (insecte),	485
	de Veau, Voyez Millepores.	
	Frêlons,	485
a	Fripiere,	124
	Fromage verd,	239
		), 3 I
	en cornes de Daim,	3 I
	Fucus,	SII
3	Furie,	33:1
	Fufeau,	
C	ruicau,	ibid.
	à dents,	tota.
	G.	
	GALÉOTES (Lézard),	481
		401
	Galles de chêne,	
	d'églantier,	
	de genêr,	486
	de hêtre,	
	d'orme,	
é	Gamma,	489
e	Gâteau feuilleté,	293
	Gâteaux de Frêlons,	485
es	Gâteaux (ourfins),	423
	Gaufre	145
	Gazé,	489
-	Gazelle d'Afrique (cornes de)	497
	d'Arabie (cornes de)	498
	des Indes (cornes de),	
		497
	du Bézoard (cornes de)	498
a	Géographique. Voy. Carte géographique	le.
a	Gibeciere. Voyez la Bourse.	
	Glands de mer,	401
	à côte de melon,	404
	Lliii	

percent.

1111

33.	4 F F F	
	Glands de mer clochette,	404
	couleur de rose,	ibid.
	épineux,	402
	rayés,	ibid.
	tulipe,	ibid.
	turban,	ibid.
le	Gochet.	120
	Gomme caragne,	120
	copal,	
	élemi,	5 1 E
	laque,	
là.	Gondole;	212
200	mammillaire,	210
12	Gourgandine,	353
44	(fauste)	
1,	Gousse de féves,	364
	Grain d'avoine,	378
	Grain d'orge,	ibid.
10	Grappe marine. Voy. Raisin de mer.	eviu.
	Grenouille d'Afrique,	482
	de Virginie,	ibid.
12	Griblette,	
	Griffe du Diable,	373 188
200	Grillons,	487
10	Grimace,	
266	Grive des Indes (oifeau)	490
12	Grive (coquille),	117
34	Guêpes,	485
	Guêpier de Cayenne	ibid.
	de mer,	66
	Gueule de Lamie,	
12	Gueule de Loup,	476
報		447
	de Souris,	384

ALPHABET IQUE.	535
la Gueule noire,	182
la Guillochée,	337
H.	
la HALLEBARDE,	191
rannetons,	487
la Harpe,	213
noble,	ibid.
l'Hébraïque,	240
l'Hébraïque. Voy. Bois-veine.	200
Hérisson (squelette de),	498
le Hérisson (coquille),	498
Hermine (peau d'), l'Hermine (coquille),	249
Hippocampe,	476
Hippolites,	595
Hippoporame (tête d'),	494
l'Hirondelle,	283
de mer,	476
Holothuries,	469
Huîtres,	278
à feuilles de persil,	304
à talon,	298
de la mer rouge,	297
épineuses,	298
feuille, Voyez feuille.	
feuilletées,	293
proprement dites 2	280
Humantin,	47.6
$J_{i}$	
JABIRU (bec de) 2	49¦I
la Jamaique	3.3.6
I liv	

the second of the second of the second	
TABLE	
le Jambon,	
le Jambonneau, Voyez Pinne marin	ze.
le Jatou,	198
le Jaune d'œuf,	117
applati,	ibid.
Ichneumons,	485
l'Idole,	430
l'If,	227
Iguana,	482
Infectes,	484
l'Ifabelle,	272
l'Ivoire. Voyez Mitre jaune.	2.7.2
1 Ivone. Voyez mine junie.	
K.	
KAKERLAC,	485
le Kaman. Voyez Conque exotique.	
Kauris,	273
Kératophites, 9, 13	, 47
plume de mer,	49
romarin,	- 50
L.	
***	
le LAMBDA,	489
le Lambis,	185
Lamie (gueule de),	476
la Lampe antique,	442
Lancette, (bec de)	491
Langouste,	471
la Langue,	346
de Chat, Voyez chagrinée.	
d'or,	372
la Lanterne,	377
d'Aristote, 416;	426

	ALPHABÉTIQUE.	537
le	Lapin, A. C. S. C. S. C.	268
	Lard,	162
	Léopard,	. 269
	Lépas ou Patelles,	77
	à appendice en demi corner,	91
		37,91
	chambrés,	89
	de Magellan,	79,80
	en bateau,	82
	en gondole,	. 86
	entiers,	78
	fluviatiles,	428
	percés au fommet,	88
la	Levantine (grande),	365
la	Levantine (perite),	ibid.
	Lézard,	481
	Galeotes,	ibid.
	Téjuguacu,	482
_	volant,	480
la	Licorne (coquille),	137
	de mer (grandė), V. Naru	al.
	de mer (petite),	475
le	Lievre,	270
	à gouttes de suif,	ibid.
	Likénée rouge,	489
la		40
	Limaçons à bouche demi-ronde, V	oy.
	Nérites.	
	à bouche ovale, Voyez Sabot	s.
	à bouche ronde,	110
	de mer,	109
	fluviatiles,	429
	terrestres,	436

en buisson,

en choux fleurs,

15, 17, 19

16

ALPHABETIQUE.	539
Madrépore en cornes de Daim,	18
épi de bled,	15
grisâtre, 13, 15	-
jaunâtre, 14, 16	, 17
A	, 16
violet,	12
Magna Vetula,	365
Main de mer,	469
de Sirene,	476
Malarmat,	ibid.
le Mammelon blanc,	-117
jaune,	118
Manches de conteau,	378
1 3 / 1 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	, 31
le Manchon de Neptune,	59
Mante (squille),	471
Mante (insecte),	485
le Manteau blanc, Voyez bourse.	
ducal ou royal,	320
le Mantelet,	266
la Mappemonde, V. Carte géographique	e.
le Marbre,	153
Marmole & fes petits,	498
le Maron épineux,	356
roti,	113
le Marteau (coquille),	286
le Marteau (poisson), Voyez Zigêne.	
la Martelée. Voyez Vis.	
Martin-pêcheur,	490
la Massue d'Hercule,	204
Matrices de coquillages,	. 69
Méandrites,	32
en priapolite.	.23

la	Médaille,	424
	Méduse. Voyez Tête de Méduse.	
la	Mennonite. Voyez Cierge blanc.	
	Mere-perle,	282
	stérile. Voyez Pintade.	
le	Millepieds (insecte),	484
	mâle (coquille),	191
	femelle (coquille),	192
	Millepore à feuilles de chou,	26
	bois de Cerf	29
	digité,	27
		22, 28
	en fraise de Veau,	27
le	Minaret,	142
	Minime (Buccin.) Voyez Cordelie	
la	Minime (corner),	242
	bleue (idem.)	ibid.
	à bandes (phalene),	489
12	Mitre,	140
200	jaune,	· ibid.
	Polonoise. V. Bonnet de Ne	
	Moineau de Bengale,	490
10	Moire,	256
100	Mollusques,	469
	Momie d'Egypte,	501
1.	Monnoie de Guinée,	266
	Moresque. Voyez la Négresse.	200
	Morille,	63,64
		488
	Morio,	60
16	Mortier,	
	Mouches,	.485
	à deux aîles,	:4:1
	à quatre aîles,	ibid.
	à fcie,	

ALPHABÉTIQUI	E. 541
Moules,	379
cylindriques. Voyez Datte	S. 217
fluviatiles. Voyez Ténilles.	
proprement dites,	380
triangulaires. V. Pinnes me	
la Moule arborifée,	386
d'Alger,	384
de la Plata,	383
des Papous,	382
double,	381
magellanique,	. 380
Mouffes marines.	11.2
Multivalves. Voyez Coquilles.	
la Muré,	165
de Dargenville,	214
de hayes,	136
Murex. Voyez Rochers.	-,-
à dents de chien,	164
Musc.	508
la Muscade,	206
la Musique,	160
bâtarde. Voyez Bois-veiné.	• ,
couleur de rose,	161
verte,	ibid.
N.	
t mail see	
NACELLE (la) (Lépas),	. 90
la Nacelle. Voyez Oscabrion.	
le Nacré,	489
Nageoires de Baleine,	477
Narwal (sa défense)	476
la Natte de jonc. Voy. Ecriture arabiq	ue.
d'Italie,	239
le Naver,	2.43

la Navette de Tisserand,	264
Nautiles;	106
épais & chambrés,	. 107.
papyracés, non chambrés,	801
Nauriloides,	100
la Nébuleuse. Voyez les Nuages.	
la Négresse,	259
la Neigeuse,	268
Nérites de mer,	116
	1, 430
fluviatiles,	429
Nid d'Alcyon,	491
d'Araignée, singulier,	484
de Colibri,	ibid.
pensile des Indes,	206
la Noix de mer,	116
le Nombril de Vénus,	254
les Nuages;	- 2)4
-	
l'OBÉLISQUE Chinois. V. Clocher C	hinois.
l'Œil de Bœuf,	438
de Bouc radié,	82,83
de Rubis radié,	83, 84
l'Œillet de mer,	36-38
l'Œuf (coquille),	264
papyracé (idem.)	ibid.
Œufs marins (Oursins),	418
d'Autruche,	491
de Crocodile,	481
l'Oignon blanc,	443
Oifeaux,	490
l'Oiseau. Voyez l'Hirondelle.	
trompette. Voyez Colao.	

ALPHABÉTIQUE.	543
l'Olearia,	IIO
l'Olive de Panama,	258
les Olives,	257
l'Omelette,	254
Ongle du pied d'Élan,	496
l'Ongle odorant,	153
l'Onix. Voyez Cierge blanc.	,,
Opercules de Bouche d'or,	IIS
de Buccins,	153
d'Olearia,	115
l'Orbis à tête de lievre,	475
Oreilles de mer.,	92
à trous,	93
fans trous,	95
l'Oreille d'Ane,	187
de Cochon	
ou	184
déchirée,	
de Cochon. Voy. Crête de Coq	•
de Midas,	132
de Vénus,	95
l'Orpheline,	33 I
Ortie de mer,	469
Orvert,	480
Oscabrion,	392
Ostreum tortuosum,	285
Ovaires de coquillages;	69
de Raie,	477
l'Oublie,	206
Ovoïdes (Oursins). V. Œuss marins.	
Ourfins,	408
l'Oursin à soyes,	412
digité,	414
folaire,	225

P.

la	PAGODE,	125
	Paille-en-cul,	490
le	Pain de bougie,	101
-	d'épice,	423
le	Palmier marin,	466
20	Pangolin. Voyez Diable de Java.	
le.	Pannache de mer,	54, 55
	Paon de nuit, (le grand),	488
	Paon de jour (le petit),	ibid
	de la Martinique,	- 489
1ë	Papier de la Chine,	254
10	marbré,	250
	roulé,	206
	Papillon à queue du fenouil,	488
	de la riviere des Amazones	
	porte-queue,	489
la	Papyracée, Voyez la lanterne.	• (
le	Parasol Chinois,	78
Ie	Pas de Poulain,	418
	Pastenaque,	475
le		57, 46
7	(petit),	- 458
	Patelles, Voyez Lépas.	, ,,
la	Patte de Crapaud,	200
	d'oye,	191
le	Pavillon d'Hollande,	448
	d'orange,	130
	du prince,	440
	Pavois angulaire,	421
	applati,	4.2
la	Peau d'Ane,	27
	de chagrin,	230
		d

ALPHABÉTIQUE.	545
la Peau de serpent,	113
de Tigre,	267
les Peignes,	314
à oreilles égales,	316
à oreilles inégales;	319
fans oreilles,	3.27
la Pélerine,	316
tuilée,	320
Pélican (bec de),	491
la Pelotte de beurre, V. Tine de beurre.	
Pelottes marines, Voy. Égagropiles	de
mer.	. 0
la Pelure d'oignon,	281
le Perçoir,	225
la Perdrix,	209
rouge,	134
Perles d'Afrique,	ibid.
de la Pinne marine	507
du Pérou,	506
Occidentales,	ibid.
Orientales,	ibid.
le Perron,	144
le Perroquet perlé, kii	
Perruche:	49 E
la Perruque à l'Angloise,	22
la Perspective, Voyez l'Escalier.	
la Petaloïde,	45.5
velue	456
le Petit Ane,	273
Argus,	272
Cheval marin	476
deuil,	112
Tome I. Mm	

546 TABLE	
le Petit Paon,	489
la Petite Tortue,	489
vérole,	276
Pétoncles, V. Peignes à oreilles inégales.	
fans oreilles,	327
Phalenes,	487
la Phalene carmin	489
	ibid.
couleur de rose,	488
vitrée de la Chine,	ibid.
Philandre,	498
Phocas, Voyez Loup marin.	495
Phonicoptere (bec de),	491
Pholades bivalves, Voyez Dattes.	.,
multivalves,	395
quintivalves,	397
fextivalves,	396
la Pie,	112
Pieces d'Anatomie,	500
Voyez squélettes.	
le Pied d'Ane,	302
Pied d'Elan,	496
Piedra del Porco,	502
Pierre-de Goa,	504
	ibid.
de Tortue,	503
	505
du poisson Belluga,	503
humaines, 505,	506
murales,	505
Pierrot tacheté,	490
le Pigeonneau, Voyez la Tourterelle.	
la Pince de Chirurgien,	373

	ALPHABÉTIQUE.	547
le	Pinceau de mer,	58
le	Pinceau de mer, Voyez arrosoir.	3.
le	Pinceau de mer, Voyez scolopendre.	
	Pinnes marines,	388
	Pintade,	282
la	Piqure de Mouches, V. Drap d'argent.	
la	Pirogue,	29 I
la	Pistache,	207
le	Pitar,	333
	Plan-orbes,	429
	Plein-chant,	161
	Plomb,	152
la	Plume de mer, Voyez Kératophites.	
	marine,	469
	Poinçon,	220
le	Point d'Hongrie,	332
le	Pois de mer,	122
	Poissons,	475
	armés,	ibid.
	coffre,	ibid.
	dorés de la Chine,	476
	trompette,	ibid.
	volans,	ibid.
	Polypes de mer,	469
	du corail;	10
	Polypiers, moux ou flexibles,	E
	folides ou pierreux;	43
10	Pomme d'Acajou,	5
200	folle de mer,	186
	Porcelaines,	469
	à bouche moins étroite,	263
	à bouche plus étroite,	264
i	Mm ij	267
	117 117 13	

, .		
la	Porcelaine à tête de Serpent	268
	de M. Adanson,	135
	tigrée, Voyez peau de Tigre.	- , ,
le	Porc-épic de mer,	475
	Porc marin,	ibid.
	Porphyre,	258
	Potan,	266
	Pot verd,	IIO
	Poucepieds,	405
le	Pou de Baleine	404
	de mer,	275
	Poulette,	3.1.2
le	Poumon marin,	469
	Poupart,	473
	Pourpres,	192
	à longue queue,	202
	à petite queue,	194
la	Pourpre de Panama. V. Conque persique	
	Pourpres épineules,	199
	rameuses triangulaires,	194
	triangulaires,	197
	triangulaires aîlées,	198
Te	Prépuce,	211
20	Priapolite. Voyez Méandrites.	
10	Princesse,	110
100	Proscarabées,	487
10	Prérophore,	489
1C	Pucelages,	273
	Pucerons ,	487
	Punaise aîlée	486
	aquatique j	485
	de mer. Voyez Oscabrion.	,-,
	terrefire,	485
	entravera 3	21 21

	ALPHABÉTIQUE	549
la	Pyramide,	1.59
	Pyramidale pectinée,	458
		• •
	Q.	
	QUADRUPEDES,	492
la	Quenouille,	1.5:5
	Quenotte saignante,	117
	Queue d'Ecureuil,	e.6.
-7/	d'Hermine,	248
	Queue de Rhinoceros,	494
	R.	
	<b>N</b> <sub>0.</sub>	
la	RACINE de Brione	1.90
la	Raccrocheuse,	1.70
	Radiée (cœur)	3.62
	Radiće (telline),	3.7 1
	Radix	216
	à pointes noires	2,0 I
le	Raisin de mer,	469
, ,	Ranapiscatrix,	476
la	Rape,	3.26.
	Rastellum 7	
	ou \$	288
le	Rateau,	
	Rat (squélette de)	498
la	Ratissoire. Voyez la Rape.	17
	Rave,	153
	Raye en forme de Basilic	476
	(mâchoire de)	477
	(ovaires de) 2	ibid.
le	Rayon de miel	3.35.
	Rayonnée	3.42
.0.7-	The state of the s	0.

Mm iij

le Romarin. Voyez Kératophites.
la Rosette d'Epinette. Voyez Cadran.
les Rotules, 425
Rouger, 476
Rougette, 498

les Rouleaux, 251
le Ruban (limaçon), 112
le Ruban (vis-buccin), 448

#### ALPHABÉTIQUE. 558 les SABOTS, 123 Salamandre aquatique, 481 terrestre, ibid. la Sandale, 90 Sanglier (défenses de), 495 des Moluques. V. Baby roësa. le Sapin de mer, 57 la Sapotille, 297 le Satyre, 489 Sauterelles, 486 la Scalata, 99 le Scarabée (coquille), 313 palmiste, 487 pillulaire, ibid. ibid. porc, la Scie, 36 E 48 I Scinc, Scolopendre de mer, 104, 469, 484 Scolopendroides 50, 465 le Scorpion aquatique, 486 femelle, } (coquilles), IOI mâle, ibid. le Scorpion (insecte), 484 marin, 476 orangé (coquille), 191

Sénembi, Serpents, Mm iv 469

280

506

482

478

Seche,

la Selle Polonoise,

Semence de perles,

Company V. January	
Serpent à deux têtes,	480
aveugle,	479
d'Esculape,	ibid.
javelor,	478
marin,	476
fonnette (sa queue),	480
le Silene,	489
la Sole,	317
de la rare espece,	318
marquetée,	ibid.
le Soleil. Voyez l'Éperon.	
à treillis épineux,	456
digité d'Aldrovande,	462
levant,	376
plat coriacé,	460
le Solen du sable,	97
Serpent,	100
la Sorciere,	123
le Souci,	489
Souris (fquélette de),	499
la Souris (coquille),	271
le Spectre (coquille),	242
le Spectre (insecte),	485
la Spéculation,	244
le Sphinx du Troesne,	488
Spondiles,	298
Spongia Veneris,	506
Squélette de Canard,	491
de Chat monstrueux,	499
de fœrus humain,	102
de Hérisson,	498
de la tête d'une Tortue	482
de Souris	499
ar a way	3000

4.0	
ALPHA BÉTIQU	E. 353
Squélette de Rat,	499
de tête humaine,	500
de Taupe,	499
Squille large,	471
fabloneuse;	ibid.
Staphilins,	487
Sucet. Voyez Rémore:	**
$\mathbf{T}_{i}$	
le ABAC d'Espagne,	488
le Taffetas,	256
le Tamaris de mer,	57
Tangara du Pérou	490
le Tapis de Perse,	. 154
Tarentule,	484
le Taret,	400
la Tarriere,	220
la Tasse. Voyez Calice.	
de Neptune	212
Tatou ou Armadille,	498
à neuf bandes,	ibid.
Taupe (squelette de)	ibid.
Taupe-grillon,	484
la Taupe (coquille),	271
marine (fongipore),	41
marine (mollusque), Taupins,	469
le Taureau volant,	487. 486.
Tecuixim (Lézard)	482
Teigne aquatique,	429,485
Tejuguacu (Lézard);	482
de Télescope	222
33 X - 277 4 7 4 .	Come.

1) 7	
Tellines,	369
béantes à une extrêmité,	370
béantes aux deux bouts,	375
fluviatiles,	434
improprement dites. Voy. Man	2-
ches de couteau.	
radiées,	. 3.7 E
la Telline de la Chine,	374
feuille. Voyez Langue d'or.	
Tenilles. Voyez Tellines.	
fluviatiles,	434
Térébratules. Voyez Anomies.	
les Testicules,	117
Tête de Baby-rousse,	494
de Bouc,	496
de Bouquetin,	ibid.
d'Hippopotame,	494
de Lion,	ibid.
de Renard,	ibid.
de Tigre,	494
de Vache marine,	ibid.
la Têre de Becasse,	202
de Méduse,	467
de Méduse à côtes,	ibid.
de Méduse à écusson,	ibid.
de Méduse brune,	466
de More,	22
de Mort,	419
de Serpent,	184
Thé (échantillons de);	513
la Thiare,	140
à trous,	141
bâtarde ,	140

ALPHIEBÉTIQU	E. 555
la Thiare fluviatile,	432
le Thorax,	273
Tigre (tête de),	494
le Tigre jaune,	246
noir,	24%
rouge,	246
la Tine de beurre,	241
Tipules,	486
le Tire-bourre,	99
la Toile à matelas. Voyez Lard.	
d'araignée. V. l'Esplana	lian.
le Toit Chinois,	91, 92
le Toit Chinois. Voyez la Pagode	•
Tonnes,	205
à bouche échancrée,	208
à bouche entiere,	206
à queue,	216
fluviatiles,	431
Tortue de mer,	482
de terre,	ibid.
la Tortue (coquille),	276
la Tortue (Papillon),	488, 489
Toucan, (bec de),	. 491
Toupies, Voyez culs de lampe.	
la Tour de Babel,	156
le Tournesol à douze rayons,	462
à treize rayons,	463
à trente-sept rayons,	462
à trente-huit rayons,	463
la Tourterelle,	179
la Transparente,	280
la Tricottée,	33.9
la Trompe marine,	148

de mer univalves,

simples ou isolés.

groupés. Voyez Vermiculaires.

d'orgue,

Auviatiles,

non testacés,

frompette,

95

103

428

104

9.7

102

#### ALPHABÉTIQUE 559 V VACHE marine (membre de), 477 (tête de), 494 Végétaux, 509 Velette, 469 le Verd doré, 488 Verge ailée. Voyez plume marine. marine. . . . 469 Vermets. 102 , 103 Vermiculaires, 102 Vers mangeurs de Chenille; 485 palmistes, 484 Vertebres de Baleine 477 la Veuve TY2, IIS perlée ; III le Vice Amiral, 233 de Rumphius 3 234 la Vieille ridée, 364 le Villebrequin 3. IOO Vipere, 480 Wis 3 218 à tête tronquée ; 222 Buccins, 447 fluviatiles. 432 liffes, 219 ftriées. 224 terrestres; 247 > 450 tuberculeuses! 226 la Vis à caracteres, 219 de pressoir; 223

feuilletée.

martelée,

228

220

558 TABLE ALPHABÉTIQUE.	
la Vis tigrée,	219
la Virre Chinoise (coquille),	280
la Vitrée de la Chine (phalene),	488
l'Unique (Buccin),	
l'Unique (Limaçon),	443
l'Unique (porcelaine),	266
l'Unique (Vis Buccin),	447
Univalves. Voyez coquilles.	777
la Voile roulée. V. l'artimon entortillé.	
le Volant doré,	489
Volutes,	231
coniques. Voyez cornets.	-,-
cylindriques. Voyez rouleaux.	
échancrées Voyez olives.	
la Volute de Guinée. Voyes aîle de Pa-	
pillon.	
le Vulcain,	488
	400
Z.	
le ZEBRE. Voyez l'Ane rayé.	
10 7 care (cognilla)	
le Zig-zag (coquille),	340
le Zig-zag (phalene),	489
Zoophites,	451
Zygene, (machoire de),	476

Fin de la Table du premier Volume.

# FAUTES

# A corriger dans ce Volume.

PAG. 11, lig. 18, lisses, lis. lisses.

20, I, prolongent, lif. se prolongent.

48, 28, Rétépores dentellés, lis. Rétépores-dentelle.

69, 23, de, effacez ce mot.

146, 20, premieres, lif. premiers.

172, 27, 184, lif. 284.

ibid. 27, 185, lif. 285.

292, 9, de lif. des.

349, 14, fommet, lif. fommets

512, 3, Aleyons, lif. Alcyons.

## Fautes à corriger dans les Citations.

Pag. 16, Gualt. ind. test. no. 27, lif. no. 122.

48, Seba, pl. 114, n°. 3, *lif.* Rumph. herb. Amb. tom. 6, tab. 78, litt. a, b, c.

56, Voyez l'essai de, lis. l'essai sur.

104, Ellis, pl. 34, mar. tab. 1, f. 4, efface? mar. tab. 1, f. 4.

125, Rumph. tab. 21, litt. A, lif. litt. D.

136, List. tab. 56, lif. List. tab. 656.

137, Seba, pl. 37, lif. Seba, pl. 39.

idem. ibid. tab. 830, f. ajouter 52.

152, List. tab. 47, list. List. tab. 892.

166, Arg. pl. 10, lif. Arg. pl. 14.

171, Rumph. tab. 22, lit. B, *lif.* Rumph. tab. 23, lit. C.

188, Seba, pl. 81, lif. Seba, pl. 82

Page 211, Seba, pl. 66, no. 13 &, ajoutel 143 222, Seba, pl. 59, lif. Seba, pl. 55. 233, Arg. pl. 11, lif. Arg. pl. 12. 240, ibid. f. 26, lif. ibid. tab 779, f. 26. 245, Seba, pl. 46, nº. 3 & 4, lif. nº. 1 & 17 275, 1 litt. A bid. lif. ibid. litt. A A. 285, Rumph. tab. 47, litt. R, lif. litt. K. 288, Gualt. tab. 103, ajoutez litt. C. 293, Rumph. tab. 43, lif. Rumph. tab. 48. 331, Bonan. Cl. 2, nº 60 & 62, lif. 60 & 61 353, Gualt. tab. 38, lif. Gualt. tab. 83. 376, List. tab. 422, f. 226, lif. f. 266. 416, Seba, pl. 87, no. 11, lis. pl. 13. 4335 List. tab. 150, ajouter fig. 5. 445, Arg. pl. 24. 28, fig. 4 & 8, effacer 24. 481, ibid. pl. 93, no. ajouter 1.

Fin de l'Errata.



## EXPLICATION DES FIGURES

#### DU TOME PREMIER.

### PLANCHE I.

MILLEPORE à branches feuillues, formé sur une Pouteille pêchée à la Barbade. Il en est parlé à l'art. 73 des Polypiers, page 28.

# PLANCHE II.

La lettre A représente un Lépas du premier genre, auquel nous avons donné le nom de *Parasol Chinois*: il en est parlé aux articles i & des Coquilles, page 78.

Sous la lettre B est le Lépas Cabochon blanc de Saint-Domingue, du quatrieme genre de cette famille, vû par dehors. Il en est parlé à l'art. 42 des Coquilles, page 91. On voit, en b, la même Coquille renversee, avec son appendice intérieur en demi-cornet.

### PLANCHE III.

La lettre C offre un Lépas de Magellan, à Tome I. Nn

coquille percée en-dessus, (ce qui caractérise le second genre de cette samille:) c'est celui de l'art. 37 des Coquilles, page 88. Il ne différe que par de légers accidens de celui qui est décrit à l'art. 36.

Le Lépas de la lettre D est aussi de Magellan: c'est un Lépas papyracé du premier genre, qui sé trouve décrit à l'art. 8 des Coquilles, page 79.

# PLANCHE IV.

On voit, à la lettre E, un groupe très-gracieux de Tuyaux de mer de l'espéce des Tire-bourres, dont il est parlé à l'art. 37 des Coquilles, page 99.

Le Tuyau de mer, représenté à la lettre F, est un de ceux auxquels nous avons donné le nom de *Pains de bougie*: il en est parlé à l'art. 61 des Coquilles, pag. 100.

La lettre G montre un autre Tuyau de mer, nommé Vilebrequin: il en est parlé à l'are. 39 des Coquilles, page 100.

On voit, en H, trois Tuyaux de mer accolés ensemble & formant divers plis semblables à ceux des intessins. Ils sont compris dans l'article 60 des Coquilles, page 100.

# PLANCHE V.

On a représenté, à la lettre I, le premier des deux Burgaux de la Chine, décrits à l'art. 98 des Coquilles, page 111.

On voit, en K, l'un des deux Sabots de

l'art. 148 des Coquilles, page 125.

Le petit Buccin qui se voit en L, est un des deux décrits sous le nom de Perrons à l'art. 193 des Coquilles, pag. 144.

## PLANCHE VI.

On voit, en M, un Sabot d'Amérique, chargé d'autres coquillages; ce qui lui a fait donner le nom de *Fripiere*: c'est la premiere des trois dont il est parlé à l'article 147 des Coquilles, page 125. La même Coquille est vue en m du côté de la bouche.

La lettre N offre le Gland de mer épineux, adhérant à une valve de Conque anatifere, dont il est parlé à l'article 919 des Coquilles, page 402.

On a représenté, en O, un Piquant d'Ourfin, extrêmement rare & fingulier, décrit vers la fin de l'art. 961 des Coquilles, page 426.

Nn ij

#### PLANCHE VII.

Le Limaçon qui se voit en P, est une des deux Bouches d'argent d'espèce rare, décrites à l'article 106 des Coquilles, page 112.

On voit, en Q, le Buccin nommé Gaufre, dont il est parlé à l'article 197 des Coquilles,

page 144.

La lettre R offre la Coquille nommée Amande rôtie, décrite à l'article 823 des Coquilles, page 357.

#### PLANCHE VIII.

Le Buccin de Magellan, représenté en S, se trouve décrit à l'article 181 des Coquilles, page 140.

Autre Buccin Magellanique, représenté à la lettre T : c'est l'un des deux décrits à l'article

198 des Coquilles, page 143.

On voit, à la lettre V, le Buccin nommé Cabestan, décrit à l'article 192 des Coquilles,

page 143.

La lettre X fait voir un petit Buccin singulier, nommé Mûre de haie. Le même est vu en x du côté de la bouche. Il en est parlé à l'article 172 des Coquilles, page 136.

# PLANCHE IX.

La lettre A offre un Buccin très-rare, nommé le Buccin crénelé: il est décrit à l'art. 202 des Coquilles, page 146.

On voit, en B, un Buccin de Magellan, nommé la Licorne. Le même se voit en b du côté de la bouche, pour en saire voir la dent saillante. Il en est parlé à l'article 174 des Coquilles, page 136.

On a représenté, en C, une Coralline rare, à longue tige, nommée le Pinceau de mer. Le restant de sa tige se voit à la lettre e. Ce morceau est décrit à l'article 149 des Polypiers, page 38.

#### PLANCHE X.

La lettre B offre un beau Buccin Magellanique, nommé le Buccin feuilleté. Le même est vu en d du côté de la bouche. Il est décrit à l'article 194 des Coquilles, page 144.

# PLANCHE XI.

On voit, en E, le Rocher de la Chine, dont Nn iij il est parlé à l'article 231 des Coquilles, page 161. Le même est représenté en e du côté de la bouche.

# PLANCHE XII.

La Coquille qu'offre cette planche est nommée par Klein Racine de Brione, & se trouve gravée dans Lister. Nous ne l'avons fair représenter que pour faire voir les divers changemens d'état de cette Coquille, qui est ici dépourvue d'aîle. Il en est parlé à l'article 341 des Coquilles, page 190.

#### PLANCHE XIII.

La même Coquille de la planche précédente, mais plus avancée en âge, & garnie de son aîle. Elle est aussi décrite à l'art. 341 des Coquilles, page 190.

#### PLANCHE XIV.

La même Coquille représentée dans son dernier âge, avec ses pattes. C'est l'une des deux de même espéce dont il est parlé à l'art. 340 des Coquilles, page 190.

#### PLANCHE XV.

On voit, en F, une rare & belle Olive dont il est parlé à l'article 342 des Coquilles, page 257.

La lettre G représente un Rocher blanc de lait : c'est le premier des trois qui sont décrits à

l'article 255 des Coquilles, page 162.

La lettre H offre une Pourpre épineuse trèsrare, nommée le Radix à pointes noires. Elle se trouve décrite à l'article 374 des Coquilles, page 201.

La Porcelaine de la lettre I se nomme la Tortue, & est décrite dans l'article 381 des Co-

quilles, pages 275 & 276.

#### PLANCHE XVI.

On a représenté, en K, une très-belle Pourpre triangulaire aîlée, décrite à l'article 366 des Coquilles, page 198.

Autre Pourpre aîlée représentée en L, & décrite à l'article 367 des Coquilles, page 198.

Troisieme Pourpre ailée, représentée en M: elle est décrite à l'article 368 des Coquilles, page 199.

On voit, en N, une Pourpre triangulaire

des Indes, blanche, à taches peu nombreuses: une autre de même espéce, entiérement blanche, à la lettre O; & une petite blanche du Sénégal, à queue sermée comme un tuyau, à lettre P. Ces trois Pourpres, qui toutes ont un commencement d'aîle, sont partie de l'article 365 des Coquilles, page 198.

La Vis qui se voit à la lettre Q, est une des Vis seuilletées blanches qui sont partie de l'arti-

cle 442 des Coquilles, page 229.

## PLANCHE XVII.

La lettre R offre un Casque des Indes, décrit à l'article 283 des Coquilles, page 172.

Le Casque qui est en S, est le dernier de ceux qui sont décrits à l'article 289 des Co-

quilles, page 173.

On voit, en T, une Coquille du genre des Cœurs, nommée Marron épineux, & décrite à l'article 28 i des Coquilles, page 356. La lettre t fait voir la même Coquille dans une autre position.

## PLANCHE XVIII.

La lettre V représente un grand Cœur trèsrare, nommé le Coqueluchon de Moine : il se trouve décrit à l'article 824 des Coquilles, page 357. L'intérieur de l'une des valves de cette Coquille est représenté en  $\nu$ , pour en faire voir le large appendice en forme d'oreille.

## PLANCHE XIX.

Le groupe de deux Huitres, qui est représenté à la lettre X, est une espéce de Crète de coq d'une variété rare. Voyez ce qui en est dit à l'art. 606 des Coquilles, page 288.

On voit, en Y, une autre Huitre nommée Corne d'abondance; elle appartient à l'article 610 des Coquilles, & est de l'espèce décrite dans l'article 608, pages 288 & 289.

La lettre Z représente une des deux Moules arborisées, décrites à l'article 898 des Coquilles, page 386.

## PLANCHE XX.

Cette planche réunit toutes les variétés d'Anomies que nous possédons, décrites aux pages 311, 312 & 313.

La lettre A représente la grande Anomie Magellanique striée de l'article 696. On a mis, en a, la valve supérieure d'une Coquille de cette espéce, renversée, pour faire voir la forme singuliere de ses appendices.

B est l'Anomie verd - noirâtre des Indes, connue sous le nom de Bec de Perroquet, & décrite à l'article 692. La même représentée de profil en b, pour faire voir l'avance de son bec.

C est l'Anomie lisse de Mahon, décrite à

l'article 694.

- D. Petite Anomie jaune-blond & transparente de Mahon; c'est une des deux premieres qui se trouvent décrites à l'article 699: elle est représentée un peu plus grande qu'elle ne l'est en esset.
- E. Autre petite Anomie à tuyaux latéraux, du même article, représentée de grandeur naturelle.
  - e. La même grossie de plus de moirié.
- F. Anomie striée, de forme ovale, décrite dans le même arricle.
- G. Autre Anomie différente, du même article.
  - g. La même, vûe par dessous.

### PLANCHE XXI.

Le Tuyau de mer, représenté à la lettre H, est le Taret rongeur de bois de M. Adanson, fermé, par le bout le plus large, d'une espéce

d'opercule hémisphérique : il est décrit à l'article 916 des Coquilles, page 399.

On voit, en I, une autre variété de Taret coupé depuis a jusqu'en b, pour en faire voir la construction intérieure. La piéce qui en a été enlevée se voit en i. Il est parlé de ce Tuyau multivalve vers la fin de l'article 916 ci-dessus.


Autre Tuyau de mer, représenté en K, dont l'extrémité c est fermée par une demifphère lisse & luisante. Il est décrit à l'article 31 des Coquilles, page 97.

La lettre L offre un Tuyau de mer chambré, dont on a mis les cloisons à découvert depuis d jusques en e. Il est parlé de ce Tuyau à l'article 62 des Coquilles, page 101.

## PLANCHE XXII.

Palais d'une espéce de Raie de la Chine, contourné de maniere à imiter deux Buccins. Il en est parlé à l'art. 14 des Poissons, page 477.


De l'Imprimerie de MICHEL LAMBERT, rue des Cordeliers, au Collége de Bourgogne, 1767.






Peint et Grave par Marie Therese Reboul









C.Brese det et soul 1766.





C. Brojer tal il Soul. 1786






Brefe del. et Scul. 2766.





Brefedel et Sail 1766.






Bresse bel. et Seul. 1766.






Bresse bel. et Sevl. 1766.






C.Bresse Del. et Sevl. 1766.





C: Briefe del et Seul 1766






C. Bresse Let. et Sent. 1766






C.Bresse Del. et Sevl. 1766.






T. Bresse Delet Sevl 1768.






C. Bresse Dei et Sevt. 1766.






CBresse bel et Sev 1.1766.
















C.BresseD. Ches vl. 1766.






C.Bresse . Del . et Sevl . 1766





زدرا، المار التي التي





Bresse del. et Sent 1766











